

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE



Union-Discipline-Travail



# CÔTE D'IVOIRE (2021) : ETUDE TRAC PF POUR LE SUIVI DE L'UTILISATION DE METHODES CONTRACEPTIVES MODERNES CHEZ LES FEMMES EN UNION DE 25-35 ANS DANS LES ZONES D'INTERVENTION DE L'AIMAS

Étude financée par la  
Coopération financière Ivoirio-Allemande :  
Planification Familiale et Prévention du VIH VI



Juillet 2021

Rapport final

Réalisée par le Cabinet SIADES

**CÔTE D'IVOIRE (2021) : ETUDE TRaC-PF POUR LE SUIVI DE L'UTILISATION DE  
METHODES CONTRACEPTIVES MODERNES CHEZ LES FEMMES EN UNION DE 25 – 35  
ANS DANS LES ZONES D'INTERVENTION DE L'AIMAS**

*Cette étude commanditée par l'AIMAS a été réalisée avec le financement de la KFW en collaboration avec le Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle à travers la DC-PNSME. Elle a été mise en œuvre par SIADES qui a assuré la collecte, le traitement des données, et la production du présent rapport.*

**CONTACTS**

**AIMAS**

Agence Ivoirienne de Marketing Social  
06 BP 1724 ABIDJAN 06.  
Tél : (225) 27 22 52 77 95/ 27 22 52 77 95  
Fax: (225) 27 22 52 77 94- Site web [www.aimas.org](http://www.aimas.org)

Nom et prénoms	Fonction	Email
<b>Goussou Koudou Lazare</b>	Directeur Exécutif	<a href="mailto:koudoul@aimas.org">koudoul@aimas.org</a>
<b>Amessan Jean Baptiste</b>	Responsable de la Recherche et du Suivi-Évaluation	<a href="mailto:jbamesan@aimas.org">jbamesan@aimas.org</a>
<b>Abbo Moussa</b>	Conseiller Technique GFA	<a href="mailto:moussa.abbo@gmail.com">moussa.abbo@gmail.com</a>
<b>Kassegne Sethson</b>	Consultant Technique GFA	<a href="mailto:ksethson@gmail.com">ksethson@gmail.com</a>
<b>Nguessan Reine</b>	Responsable marketing et communication	<a href="mailto:reinenguessan@aimas.org">reinenguessan@aimas.org</a>
<b>Ogoa Goa Prisca</b>	Assistante Recherche et Suivi-Évaluation	<a href="mailto:prisca@aimas.org">prisca@aimas.org</a>

**SIADE**

Port Bouët Boulevard de Bassam, en face de 43<sup>ème</sup> BIMA, BP 73 Abidjan Cidex 5  
Tél : (225) 27 21 27 09 96/ 01 01 17 89 15/01 40 24 14 67, Fax : (225) 27 21 27 69 46  
Email : [siades2006@yahoo.fr](mailto:siades2006@yahoo.fr), représenté par Monsieur SAWIRI YAO YEBOUA agissant en qualité de Directeur Général

Nom et prénoms	Fonction	Email
<b>SAWIRI Yao Yeboua</b>	Directeur Général	<a href="mailto:siades2006@yahoo.fr">siades2006@yahoo.fr</a>
<b>Dr. YAO Kouakou Albert</b>	Chef de Mission	<a href="mailto:ykalbert@yahoo.fr">ykalbert@yahoo.fr</a>
<b>DOHO Latif Kane</b>	Statisticien Spécialiste de la collecte et du traitement des données	<a href="mailto:latifdoho@gmail.com">latifdoho@gmail.com</a>
<b>KONAN Jean François</b>	Responsable de la collecte de données	<a href="mailto:jfk.kouadio@yahoo.com">jfk.kouadio@yahoo.com</a>
<b>Dr. N'DA-Ezoa Michel</b>	Sociologue	<a href="mailto:ezoa.michel@gmail.com">ezoa.michel@gmail.com</a>

---

---

## TABLE DES MATIERES

---

---

TABLE DES MATIERES .....	3
LISTE DES TABLEAUX.....	6
SIGLES, ABBREVIATIONS ET ACRONYMES .....	8
RESUME EXECUTIF .....	9
TABLEAU DES INDICATEURS DE SUIVI.....	13
<b>CHAPITRE 1 : INTRODUCTION .....</b>	<b>15</b>
1.1. Contexte et justification de l'étude .....	15
1.2. Objectifs de l'étude.....	16
1.3. Principaux indicateurs de suivi .....	17
1.3.1. Indicateurs de comportement.....	17
1.3.2. Déterminants d'opportunité .....	17
1.3.3. Déterminants de capacité.....	17
1.3.4. Déterminants de motivation .....	18
<b>CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE DE L'ETUDE.....</b>	<b>19</b>
2.1. Cadre théorique de l'étude.....	19
2.2. Population cible et échantillonnage.....	19
2.2.1. Population cible .....	19
2.2.2. Échantillonnage .....	19
2.3. Outils de collecte .....	21
2.4. Formation des agents et travail sur le terrain.....	21
2.5. Calcul des pondérations et traitement des données.....	22
2.5.1. Calcul des pondérations.....	22
2.5.2. Traitement des données.....	23
2.6. Limites de l'étude.....	23
2.7. Résultats de la collecte de données.....	23
<b>CHAPITRE 3 : CARACTERISTIQUES SOCIO DEMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION CIBLE .....</b>	<b>25</b>
3.1. Âge.....	25
3.2. Niveau d'études .....	25
3.3. Situation matrimoniale.....	26
3.4. Activités économiques .....	27
3.5. Équipements du ménage .....	28
<b>CHAPITRE 4 : EVOLUTION DES INDICATEURS DE SUIVI.....</b>	<b>29</b>
4.1. Indicateurs de comportements .....	29
4.2. Déterminants d'opportunité .....	29

4.3.	Déterminants de capacité.....	30
4.4.	Déterminants de motivation .....	31
<b>CHAPITRE 5 : ANTECEDENTS DE FERTILITE ET PREFERENCES DES FEMMES .....</b>		<b>33</b>
5.1.	Naissances vivantes.....	33
5.2.	Grossesses interrompues (avortements, fausses couches ou enfants mort-nés) .....	33
5.3.	Statut actuel de fertilité .....	34
<b>CHAPITRE 6 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION .....</b>		<b>35</b>
6.1.	Connaissance des méthodes de contraception .....	35
6.1.1.	Chez les femmes de 25 à 35 ans en union .....	35
6.1.2.	Chez leurs conjoints .....	38
6.2.	Méthodes de contraception utilisées actuellement .....	40
6.2.1.	Chez les femmes de 25 à 35 ans en union .....	40
6.2.2.	Chez leurs conjoints .....	43
6.3.	Informations complémentaires sur l'utilisation actuelles des méthodes contraceptives modernes .....	45
6.3.1.	Source d'approvisionnement.....	45
6.3.2.	Coût d'acquisition.....	47
6.3.3.	Informations sur les effets secondaires et l'utilisation d'autres méthodes .. .....	49
6.3.4.	Marques les plus utilisées .....	52
6.3.5.	Autres prestations reçues .....	54
6.4.	Méthodes de contraception utilisées dans le passé .....	55
6.4.1.	Chez les femmes de 25 à 35 ans en union .....	55
6.4.2.	Chez leurs conjoints .....	56
6.5.	Raisons de non utilisation des méthodes contraceptives.....	57
6.5.1.	Chez les femmes de 25 à 35 ans en union .....	57
6.5.2.	Chez leurs conjoints .....	59
6.6.	Intentions d'utilisation des méthodes contraceptives dans le futur.....	60
6.6.1.	Chez les femmes de 25 à 35 ans en union .....	60
6.6.2.	Chez leurs conjoints .....	61
6.7.	Derniers rapports sexuels chez les hommes et utilisation de préservatifs .....	62
<b>CHAPITRE 7 : OPPORTUNITES, CAPACITES ET MOTIVATIONS EN MATIERE D'UTILISATION DE CONTRACEPTIFS.....</b>		<b>64</b>
7.1.	Facteurs d'opportunités et disponibilité.....	64
7.2.	Connaissances en matière d'utilisation des méthodes contraceptives .....	66
7.3.	Facteurs de Capacité .....	69
7.3.1.	Connaissance approfondie des moyens de contraception.....	69

7.3.2.	Connaissance des avantages liés à l'assistance d'agent de santé qualifié...	72
7.3.3.	Efficacité personnelle .....	74
7.3.4.	Soutien social.....	75
7.4.	Facteurs de motivation .....	77
7.4.1.	Menace .....	77
7.4.2.	Croyances .....	79
7.4.3.	Attentes et susceptibilités.....	82
7.4.4.	Motivations d'achat des produits contraceptifs AIMAS.....	84
<b>CHAPITRE 8 : EXPOSITION AUX MEDIAS ET AUX ACTIVITES DE L'AIMAS .....</b>		<b>89</b>
8.1.	Femmes de 25-35 ans en union .....	89
8.1.1.	Presse écrite .....	89
8.1.2.	Radio.....	89
8.1.3.	Télévision .....	90
8.1.4.	Portée des actions publicitaires.....	91
8.1.5.	Portée des actions de sensibilisation.....	91
8.2.	Conjoints des femmes de 25-35 ans en union .....	92
8.2.1.	Presse écrite .....	92
8.2.2.	Radio.....	93
8.2.3.	Télévision .....	93
8.2.4.	Portée des actions publicitaires.....	94
8.2.5.	Portée des actions de sensibilisation.....	95
<b>CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS.....</b>		<b>96</b>
<b>REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....</b>		<b>99</b>
<b>ANNEXES.....</b>		<b>100</b>
<i>ETUDE SUR L'UTILISATION DE METHODES CONTRACEPTIVES MODERNES CHEZ LES FEMMES EN UNION EN CÔTE D'IVOIRE.....</i>		<i>100</i>
<i>ETUDE SUR L'UTILISATION DE METHODES CONTRACEPTIVES MODERNES CHEZ LES HOMMES EN UNION EN CÔTE D'IVOIRE.....</i>		<i>122</i>

## LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Résultats de la collecte de données .....	23
Tableau 2: Répartition des femmes de 25 à 35 ans en union par tranche d'âge selon le milieu de résidence.....	25
Tableau 3: Répartition des conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union par tranche d'âge selon le milieu de résidence	25
Tableau 4: Répartition des femmes de 25 à 35 ans en union par niveau d'étude selon le milieu de résidence .....	25
Tableau 5: Répartition des conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union par niveau d'étude selon le milieu de résidence .....	26
Tableau 6: Répartition des femmes de 25 à 35 ans en union par situation matrimoniale selon le milieu de résidence.....	26
Tableau 7: Répartition des femmes de 25 à 35 ans en union par statut d'occupation et par secteurs d'activité selon le milieu de résidence .....	27
Tableau 8: Répartition des conjoints femmes de 25 à 35 ans en union par statut d'occupation et par secteurs d'activité selon le milieu de résidence .....	27
Tableau 9: Répartition des femmes de 25 à 35 ans en union par équipement des ménages selon le milieu de résidence ...	28
Tableau 10: Évolution des indicateurs de comportement entre 2016 et 2021 .....	29
Tableau 11: Évolution des déterminants d'opportunité entre 2016 et 2021 .....	29
Tableau 12: Évolution des déterminants de capacité entre 2016 et 2021.....	31
Tableau 13: Évolution des déterminants de motivation entre 2016 et 2021 .....	32
Tableau 14: Naissances vivantes des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence.....	33
Tableau 15: Grossesses interrompues des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence.....	33
Tableau 16: Statut de fertilité des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	34
Tableau 17: Niveau de connaissance des méthodes contraceptives des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	35
Tableau 18: Niveau de connaissance des méthodes contraceptives des femmes de 25 à 35 ans en union par ville .....	37
Tableau 19: Niveau de connaissance des méthodes contraceptives des conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	38
Tableau 20: Niveau de connaissance des méthodes contraceptives des conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon les villes .....	39
Tableau 21: Niveau d'utilisation actuelle des méthodes contraceptives des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	40
Tableau 22: Niveau d'utilisation actuelle des méthodes contraceptives des femmes de 25 à 35 ans en union selon les villes .....	42
Tableau 23: Niveau d'utilisation actuelle des méthodes contraceptives chez les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	43
Tableau 24: Niveau d'utilisation actuelle des méthodes contraceptives chez les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	44
Tableau 25: Sources d'approvisionnement en moyens de contraception modernes des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	45
Tableau 26: Coût d'acquisition des moyens de contraception modernes des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	47
Tableau 27: Information sur les effets secondaires et sur d'autres méthodes contraceptives aux femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	50
Tableau 28: Marques de contraceptifs modernes les plus souvent utilisées par les femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence.....	53
Tableau 29: Marques de contraceptifs d'urgence les plus souvent utilisées par les femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	54
Tableau 30: Autres prestations reçues par les femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence, utilisatrices de méthodes contraceptives modernes.....	54
Tableau 31: Méthodes de contraception utilisées dans le passé par les femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	56
Tableau 32: Méthodes de contraception utilisées dans le passé dans le couple par les femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	57
Tableau 33: Raisons de non utilisation des méthodes contraceptives chez les femmes de 25 à 35 ans en union qui ne souhaitent pas avoir un enfant dans un futur proche selon le milieu de résidence .....	58
Tableau 34: Raisons de non utilisation des méthodes contraceptives dans le couple selon les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union qui ne souhaitent pas avoir un enfant dans un futur proche selon le milieu de résidence.....	59
Tableau 35: Intention d'utilisation des méthodes contraceptives chez les femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence dans le futur .....	60
Tableau 36: Intention d'utilisation des méthodes contraceptives dans le couple chez les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence dans le futur .....	61
Tableau 37: Dernier rapport au cours des 12 derniers mois chez les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	62
Tableau 38: Avant dernier rapport au cours des 12 derniers mois chez les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	63
Tableau 39: Disponibilité des méthodes contraceptives selon les femmes de 25 à 35 ans en union et selon le milieu de résidence .....	65
Tableau 40: Connaissance en matière d'utilisation des méthodes contraceptives des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	66

Tableau 41: Connaissance en matière d'utilisation des méthodes contraceptives des femmes de 25 à 35 ans en union par ville.....	68
Tableau 42: Connaissance approfondie des méthodes contraceptives par les femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	70
Tableau 43: Connaissance approfondie des méthodes contraceptives par les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence .....	72
Tableau 44: Connaissance par les femmes de 25 à 35 ans en union des avantages de l'assistance par un agent de santé qualifié pendant la grossesse et l'accouchement selon le milieu de résidence .....	73
Tableau 45: Connaissance par les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union des avantages de l'assistance par un agent de santé qualifié pendant la grossesse et l'accouchement selon le milieu de résidence .....	74
Tableau 46: Capacité des femmes de 25 à 35 ans en union à utiliser les moyens contraceptifs et à en parler avec leurs conjoints selon le milieu de résidence .....	75
Tableau 47: Proportion des femmes de 25 à 35 ans en union recevant le soutien de leurs conjoints selon le milieu de résidence .....	75
Tableau 48: Implication des conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union dans la planification familiale selon le milieu de résidence .....	76
Tableau 49: Proportion des femmes de 25 à 35 ans en union ayant une conscience des risques liés aux grossesses non désirées selon le milieu de résidence .....	77
Tableau 50: Proportion des conjoints des femmes de 25 à 35 ans ayant une conscience des risques liés aux grossesses non désirées selon le milieu de résidence .....	78
Tableau 51: Croyances des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence.....	79
Tableau 52: Croyances des conjoints des femmes de 25 à 35 ans selon le milieu de résidence.....	81
Tableau 53: Susceptibilité des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence.....	83
Tableau 54: Susceptibilité des conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence.....	84
Tableau 55: Connaissance et perceptions des prix de Confiance par les femmes de 25-35 ans selon le milieu de résidence .....	85
Tableau 56: Connaissance et perceptions des prix de Harmonia par les femmes de 25-35 ans selon le milieu de résidence .....	87
Tableau 57: Presse écrite lue par les Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence.....	89
Tableau 58: Moments d'écoute de la radio par les Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence.....	89
Tableau 59: Chaînes de télévision regardées par les Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence .....	90
Tableau 60: Les actions publicitaires de l'AIMAS suivies par les Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence .....	91
Tableau 61: Participation des Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence aux actions de sensibilisation de l'AIMAS .....	92
Tableau 62: Presse écrite lue par conjoints des Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence.....	92
Tableau 63: Moments d'écoute de la radio par les conjoints des Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence .....	93
Tableau 64: Chaînes de télévision regardées par les conjoints des Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence .....	93
Tableau 65: Les actions publicitaires de l'AIMAS suivies par les conjoints des femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence .....	94
Tableau 66: Participation des conjoints des femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence aux actions de sensibilisation de l'AIMAS.....	95

---

---

## SIGLES, ABBREVIATIONS ET ACRONYMES

---

---

<b>AIMAS</b>	Agence Ivoirienne de Marketing Social
<b>CCC</b>	Communication pour le changement de comportement
<b>CIPD</b>	Conférence Internationale sur la Population et le Développement Durable
<b>CPN</b>	Consultation pré natale
<b>CPoN</b>	Consultation post natale
<b>EDSCI</b>	Enquête Démographique de la Santé, Côte d'Ivoire
<b>IST</b>	Infections Sexuellement Transmissibles
<b>MICS</b>	Multiple Indicators Cluster Survey
<b>N.V.</b>	Naissances Vivantes
<b>OCM</b>	Opportunité, Capacité et Motivation
<b>OMD</b>	Objectifs du Millénaire pour le Développement
<b>PCA</b>	Paquet Complémentaire d'Activités
<b>PF</b>	Planification Familiale
<b>PMA</b>	Paquet Minimum d'Activités
<b>PNSR</b>	Programme National de Santé de la Reproduction
<b>PNTS</b>	Programme National de Transfusion Sanguine
<b>PPTE</b>	Pays Pauvre Très Endetté
<b>DEF</b>	Développement de la Femme
<b>PROMA</b>	Procréation médicalement assistée
<b>PTME</b>	Prévention de la Transmission Mère et Enfant
<b>SIDA</b>	Syndrome d'Immunodéficience Acquise
<b>SR</b>	Santé de la Reproduction
<b>SRSS</b>	Stratégie de Renforcement du Système de la Santé
<b>TPI</b>	Traitement Préventif Intermittent
<b>UNFPA</b>	United Nations Fund for Population Activities (Fonds de Nations Unies pour la Population)
<b>VIH</b>	Virus d'Immunodéficience Humaine
<b>SSP</b>	Soins de Santé Primaires

---

---

## RESUME EXECUTIF

---

---

L'Agence Ivoirienne de Marketing Social (AIMAS) est une Organisation Non Gouvernementale dont la mission est l'amélioration du bien-être sanitaire des populations vulnérables et/ou à faibles niveaux de revenu. Depuis 2002, elle exécute, un programme dénommé « Planification familiale et prévention du VIH/sida » financé par la KfW dans le cadre de la coopération ivoiro-allemande, avec pour but de contribuer à la stabilisation du niveau de la santé reproductive et sexuelle en Côte d'Ivoire. Durant la mise en œuvre de ce programme, elle a réalisé une étude TRAC de base qui a mesuré les principaux indicateurs du programme et une étude de suivi qui a permis d'apprécier les progrès réalisés par le programme en termes d'utilisation des moyens de contraception modernes.

Au terme de la phase VI du programme, elle a envisagé une autre étude TRAC qui a permis, par la mesure des principaux indicateurs relatifs au volet planification familiale de son programme, d'apprécier le recours aux méthodes contraceptives modernes chez les femmes dans la tranche d'âge 25-35 ans.

Cette étude a visé d'une manière générale à fournir des informations sur les niveaux de l'utilisation des méthodes contraceptives et des facteurs d'opportunité, de capacité et de motivation (OCM) liés à l'utilisation des méthodes modernes de contraceptives chez les femmes en union de 25-35 ans vivant en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS.

Cette étude a porté sur un échantillon total de 3 329 individus dont 2 024 femmes en union de 25-35 ans et 1 305 hommes, conjoints de ces femmes. Les répondants ont été sélectionnés selon la méthode de sondage par grappe à deux degrés.

Elle permet d'avancer les informations suivantes sur les principaux indicateurs :

### **Indicateurs de comportements**

On note une évolution sensible de la proportion des femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention utilisant une méthode contraceptive moderne. Cette proportion est de 34,8% en 2021 contre 29,2% en 2016.

Concernant les conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain, 16,2% d'entre eux ayant eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois ont déclaré avoir utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels contre 21,7% en 2016. On note une baisse de 05,5 points.

### **Déterminants d'opportunité**

En 2021, 74,6% des femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS, affirment qu'on peut trouver facilement les pilules contre 74,5% qui soutenait cette affirmation en 2016.

71,4% des femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS affirment qu'on peut trouver facilement les injectables contre 66,3% en 2016.

65,6% des femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirment qu'on peut trouver facilement les DIU.

## **Déterminants de capacité**

### **Connaissance**

Les femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS, connaissent les méthodes modernes de contraception comme la pilule, le condom, l'injectable et le DIU. Dans ce groupe de femmes, 92,8% ont entendu parler de Pilule contre 91,4 % en 2016 ; 84,8% de l'Injectable contre 79,4% en 2016. Seulement 28,9% ont entendu parler du DIU contre 25,8% en 2016 et 93,4% du Condom.

Les femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention ont une connaissance approfondie des méthodes modernes de contraception : pilule, condom, injectable et DIU. Nous avons 49,8% qui ont une connaissance approfondie de la pilule et 74,1% qui ont une connaissance approfondie du condom. Les femmes ayant une connaissance approfondie de l'injectable représentent 29,8% des répondants et pour le DIU, ce sont 27,3% qui en ont une connaissance approfondie.

### **Efficacité personnelle**

83,9% des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirment qu'elles sont capables d'utiliser une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée. Cette proportion se situait à 80,8% en 2016.

82,3% des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'elles peuvent parler de l'utilisation d'une méthode moderne de planification familiale à leur conjoint pour éviter une grossesse non désirée. Cette proportion se situait à 80% en 2016.

On note ici, une hausse des taux d'efficacité personnelle des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention AIMAS par rapport à 2016 qui se situaient aux alentours de 80%.

### **Soutien Social**

Le taux de conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et périurbain dans les zones d'intervention qui sont d'accord pour encourager leurs épouses dans la décision d'adopter une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée a sensiblement baissé passant de 82% en 2016 à 65% en 2021 ;

57,9% des conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS discutent de la planification familiale dans leur couple contre 71,8% en 2016.

## **Déterminants de motivation**

### **Menace**

Les femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS, ont une conscience des risques liés aux grossesses non désirées :

- 88,6% (86,1% en 2016) des femmes interrogées reconnaissent que les femmes qui ont des grossesses trop rapprochées souffrent habituellement de problèmes de santé.
- 87,3% (90,8% en 2016) des femmes de 25-35 ans en milieu rural et périurbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS reconnaissent que le risque de décès maternel est plus élevé si la femme a des grossesses chaque année.
- 84% (81,8% en 2016) de ces femmes reconnaissent que la non utilisation de méthodes contraceptives moderne peut favoriser la survenue d'une grossesse.

## Évolution des indicateurs clés entre 2016 et 2021

En somme, on note une baisse significative de 06 indicateurs sur 15 soit un score de 40%. Ces indicateurs sont :

- *Utiliser un condom au cours des derniers rapports sexuels : -05,5 points ;*
- *Capable d'utiliser une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée : -03,8 points ;*
- *Peuvent parler de l'utilisation d'une méthode moderne de planification familiale à leur conjoint pour éviter une grossesse non désirée : -02,9 points ;*
- *D'accord pour encourager leurs épouses dans la décision d'adopter une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée : -16,3 points ;*
- *Le risque de décès maternel est plus élevé si la femme a des grossesses chaque année : -6 points ;*
- *Si je n'utilise pas de méthode contraceptive moderne, je vais tomber enceinte : -09,2 points.*

Cependant, une hausse est observée concernant 09 indicateurs sur 15 soit un score de 60%.

L'exposition aux médias peut être décrite de la façon suivante :

- 90% des femmes de 25-35 en union en zone périurbaine et 95,7% en zone urbaine ne lisent pas de journaux ;
- 60,5% des femmes de 25-35 en union en zone périurbaine et 61% en zone urbaine n'écoutent pas du tout la radio ;
- Les chaînes de radio locales (34,3%) en zone rurale et Nostalgie (34,8%) en zone périurbaine sont les plus écoutées par les femmes de 25-35 en union.

Les autres chaînes de télévision ivoiriennes (32,8%) sont les chaînes les plus regardées par les enquêtées.

## Recommandations

Au terme de cette étude, des recommandations peuvent être formulées concernant les deux principales tendances d'évolution des indicateurs de suivi des actions de l'AIMAS :

1. Rendre toujours disponibles les contraceptifs injectables et le DIU pour augmenter encore et/ou maintenir le taux d'utilisation actuel ;
2. Intensifier la sensibilisation en vue de maintenir le niveau de connaissance et l'opportunité d'utilisation des contraceptifs, à la hausse ;
3. Sensibiliser d'avantage les époux à l'utilisation de condom au cours des rapports sexuels dans un contexte de multi partenariat sexuel ;
4. Renforcer les capacités des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain afin qu'elles puissent parler de l'utilisation d'une méthode moderne de planification familiale à leur conjoint pour éviter une grossesse non désirée ;
5. Faire des campagnes de sensibilisation à l'intention des hommes en vue d'accroître leur implication et leur soutien dans la décision d'adopter une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée chez leurs épouses ;
6. Intensifier la sensibilisation des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain sur les risques des grossesses rapprochés en vue de réduire les décès maternels ;

7. Élaborer de nouvelles stratégies de communication en vue de réduire les Menace et accroître la motivation des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain à l'utilisation des contraceptifs ;
8. Accroître la capacité personnelle des femmes par la réalisation de film-documentaires sur le concept "*si je n'utilise pas de méthode contraceptive moderne, je vais tomber régulièrement enceinte et je peux ainsi perdre la vie*" ;
9. Favoriser l'utilisation de la télévision pour les actions publicitaires à l'endroit des femmes et le couple télévision/radio pour les actions en faveur des hommes en tenant compte des heures de fortes audiences c'est-à-dire soit entre 6h et 10h ou entre 20h et 22h.

## TABLEAU DES INDICATEURS DE SUIVI

INDICATEURS	2016 N=2215	2021 N=2024	Significativité	Évolution
<b>COMPORTEMENT</b>	%	%		
Femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention utilisant une méthode contraceptive moderne	29,2	34,8	*	+
Conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain ayant eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois qui ont déclaré avoir utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels	21,7	16,2	*	-
<b>OPPORTUNITE</b>	%	%		
Femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'on peut trouver facilement les pilules	74,5	74,6	ns	
Femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'on peut trouver facilement les injectables	66,3	71,4	*	+
Femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'on peut trouver facilement les DIU	48,2	65,6	*	+
Femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'on peut trouver facilement Confiance	72,2	70,8	ns	
Femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'on peut trouver facilement Harmonia	60,7	60,3	ns	
<b>CAPACITE</b>				
<b>Connaissance</b>	%	%		
Femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention connaissant les méthodes moderne de contraception : pilule, condom, injectable et DIU				
Avez-vous entendu parler de Pilule	91,4	92,8	ns	
Avez-vous entendu parler de l'Injectable	79,4	84,8	*	+
Avez-vous entendu parler du DIU	25,8	28,9	*	+
Femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention qui ont une connaissance approfondie des méthodes moderne de contraception : pilule, condom, injectable et DIU				
Connaissance approfondie de la Pilule	20,9	49,8	*	+
Connaissance approfondie de Condom	44	74,1	*	+
Connaissance approfondie de l'Injectable	29,3	29,8	ns	
Connaissance approfondie du DIU	20,9	27,3	*	+
<b>Efficacité personnelle</b>	%	%		

Femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'elles sont capables d'utiliser une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée	80,8	83,9	*	+
Femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'elles peuvent parler de l'utilisation d'une méthode moderne de planification familiale à leur conjoint pour éviter une grossesse non désirée	79,9	82,3	*	+
<b>Soutien Social</b>	<b>%</b>	<b>%</b>		
Femmes de 25-35 ans affirmant que leurs conjoints les encouragent à avoir recours à une méthode moderne de PF	71,1	60,4	***	-
Femmes de 25-35 ans en union affirmant que leurs conjoints discutent de la planification familiale avec elles	71,8	67,4	***	-
Conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et périurbain dans les zones d'intervention qui sont d'accord pour encourager leurs épouses dans la décision d'adopter une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée	82	65,7	*	-
Conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention qui discutent de la planification familiale dans leur couple		57,9		
<b>MOTIVATION</b>				
<b>Menace</b>				
Femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention ayant une conscience des risques liés aux grossesses non désirées				
Gravité : Les femmes qui ont des grossesses trop rapprochées souffrent habituellement de problèmes de santé	86,1	88,6	ns	
Gravité : Le risque de décès maternel est plus élevé si la femme a des grossesses chaque année	90,8	87,3	*	-
Susceptibilité : Si je n'utilise pas de méthode contraceptive moderne, je vais tomber enceinte	81,8	84	*	+

Légende : (\*) = Significativité de l'indicateur entre 2013 et 2016 au seuil de 5%

+ = Hausse significative

- = Baisse significative

ns = non significatif

---

---

## CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

---

---

### 1.1. Contexte et justification de l'étude

La santé de la reproduction est une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire en raison du ratio de la mortalité maternelle qui s'élève à 614 décès pour 100.000 naissances vivantes (EDSCI III, 2012). Bien que la pratique de la planification familiale permette de réduire les décès maternels de 25-40% selon l'OMS, l'on déplore la faible utilisation de méthodes contraceptives modernes par les femmes en âge de procréer (22,7% selon l'estimation FP2020 en 2018). Les besoins non satisfaits en matière de Planification familiale (PF) de ces femmes sont élevés (29,3%). Au cours des 5 dernières années, environ 24% des naissances (y compris la dernière grossesse) étaient voulues plus tard ou non désirées.

La fécondité est élevée et précoce et se traduit par un taux brut de natalité (TBN) de 35,1‰ et un indice synthétique de fécondité (ISF) de 4,6 enfants par femme en 2016 (MICS 2016). Ces tendances sont relativement plus élevées en milieu rural comparativement au milieu urbain tant au niveau de TBN (39,3‰ contre 30‰) que de l'ISF (6 contre 3,4). La proportion des femmes ayant une grossesse avant l'âge de 18 ans est de 27,9%.

Au plan économique, bien qu'une réduction légère du taux de pauvreté soit constatée en 2015 la situation des ménages reste précaire avec une proportion de 46,3% en 2015 contre 48,9% en 2008 vivant en dessous du seuil de pauvreté (INS, 2008 et 2015). La majorité (85 à 90%) de la population ne bénéficie d'aucune couverture sociale (PNDS, 2008).

Afin de réduire la mortalité maternelle et parvenir à la capture du dividende démographique, la Côte d'Ivoire a opté pour un repositionnement de la PF comme stratégie prioritaire.

On note au plan national des efforts en vue d'améliorer l'état de santé de la population par la promotion de la planification. Cette volonté de la Côte d'Ivoire s'est traduite par son adhésion à plusieurs plateformes sous régionales et internationales pour la PF dont le Partenariat de Ouaga et l'initiative FP2020 qui offrent des possibilités d'appuis techniques et financiers. La Côte d'Ivoire s'est également engagée en 2012 lors du sommet de Londres à améliorer l'accès à la contraception moderne. Cette promotion de la PF transparaît dans ses documents d'orientation stratégique dont le PNDS 2016-2020 et le PANB-PF 2015-2020 avec un objectif de TPCm à 36%.

En appui aux efforts du gouvernement pour l'amélioration de la santé de la population, l'AIMAS exécute depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 un programme de marketing social dénommé "*planification familiale et prévention du VIH/Sida*". Ce programme est financé par la KFW dans le cadre de la coopération ivoiro-allemande.

Dans ce contexte, plusieurs activités de promotion de la planification familiale et de prévention de l'infection à VIH sont menées sur toute l'étendue du territoire national d'une manière générale et de manière spécifique dans des zones d'intervention tant rurales que péri-urbaines des

départements de Abengourou, Divo, Bouaké, Daloa, Séguéla, Korhogo et Yamoussoukro, ainsi que dans les communes de Koumassi et d'Abobo dans le district d'Abidjan.

Après la réalisation d'une étude TRaC PF de base qui a fourni une situation de référence de mesure des principaux indicateurs du programme, une étude de suivi a été réalisée en 2016. Celle-ci a permis d'apprécier les progrès réalisés par le programme. Sur la base des résultats et recommandations de cette étude, l'AIMAS a poursuivi et renforcé ses interventions dans les zones ciblées durant la phase de IV du programme et les a étendues à d'autres localités non encore touchées de la zone d'intervention. La stratégie d'intervention de l'AIMAS a impliqué à la fois les hommes et les leaders communautaires et a consisté en l'organisation de consultations foraines d'offre de services de PF gratuits dans plusieurs localités entre 2017 et 2020. Ces consultations foraines ont été soutenues par des activités de sensibilisation de masse et la distribution et la promotion des produits contraceptifs (qui ont continué d'être mis en œuvre entre 2016 et 2020).

Au terme de la mise en œuvre de la phase VI du programme, dans l'optique d'orienter ses stratégies sur la base d'évidences, il y a nécessité pour l'AIMAS de disposer d'informations en matière de planification familiale sur les principaux indicateurs pour le suivi des progrès de ses interventions.

C'est pourquoi l'AIMAS a envisagé une étude pour mesurer les principaux indicateurs relatifs au volet planification familiale de son programme.

## **1.2. Objectifs de l'étude**

Cette étude a visé d'une manière générale à fournir des informations sur les niveaux de l'utilisation des méthodes contraceptives et des facteurs d'opportunité, de capacité et de motivation (OCM) liés à l'utilisation des méthodes modernes de contraceptions chez les femmes en union de 25-35 ans vivant en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS.

De manière spécifique, il s'est agi à travers cette recherche, de déterminer dans les zones d'intervention de l'AIMAS :

- Le niveau de l'utilisation des méthodes modernes de PF par des femmes en union de 25-35 ans vivant en milieu rural et péri-urbain ;
- Le niveau de connaissance des femmes en union de 25-35ans vivant en milieu rural et péri-urbain en matière de planification familiale ;
- L'efficacité personnelle en matière d'utilisation de méthode moderne de PF des femmes en union de 25-35 ans vivant en milieu rural et péri-urbain en matière de planification familiale ;
- Le niveau de la conscience des risques liés aux grossesses non désirées chez les femmes vivant en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain ;
- L'adhésion des conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain à la planification familiale ;
- Le niveau d'exposition des femmes et des hommes aux activités de l'AIMAS.

### 1.3. Principaux indicateurs de suivi

Ces indicateurs regroupent à la fois ceux du cadre logique de la phase V et de la phase III du programme KFW qui ont fait l'objet de l'étude de base. Les indicateurs de la phase VI sont indiqués avec la mention « Phase VI ».

#### 1.3.1. Indicateurs de comportement

- [1] % des femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et peri-urbain dans les zones d'intervention utilisant une méthode contraceptive moderne ;
- [2] % des conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain ayant eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois qui ont déclaré avoir utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels.

#### 1.3.2. Déterminants d'opportunité

- **Disponibilité**

- [1] % des femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et peri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'on peut trouver facilement les pilules ;
- [2] % des femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et peri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'on peut trouver facilement les injectables ;
- [3] % des femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et peri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'on peut trouver facilement les DIU .

#### 1.3.3. Déterminants de capacité

- **Connaissance**

- [1] % des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et peri-urbain dans les zones d'intervention connaissant les méthodes moderne de contraception: pilule, condom, injectable et DIU ;
- [2] % des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et peri-urbain dans les zones d'intervention qui ont une connaissance approfondie des méthodes moderne de contraception: pilule, condom, injectable et DIU;
- [3] % des femmes dans les régions du projet (PRSS) connaissant les avantages d'être assisté par un agent qualifié pendant la grossesse et l'accouchement ;
- [4] % des hommes dans les régions du projet (PRSS) connaissant les avantages d'une assistance professionnelle pendant la grossesse et l'accouchement.

- **Efficacité personnelle**

- [1] % des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et peri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'elles sont capables d'utiliser une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée
- [2] % des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et peri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'elles peuvent parler de l'utilisation d'une méthode moderne de planification familiale à leur conjoint pour éviter une grossesse non désirée.

- **Soutien social**

- [1] % des conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et périurbain dans les zones d'intervention qui sont d'accord pour encourager leurs épouses dans la décision

d'adopter une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée ;

[2] % des conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et périurbain dans les zones d'intervention qui discutent de la planification familiale dans leur couple ;

[3] % des femmes dans les régions du projet (PRSS) qui affirme que leur conjoint les encourageraient si elles décident de se faire suivre par un agent de santé qualifié au centre de santé pendant leur grossesse et leur accouchement.

#### **1.3.4. Déterminants de motivation**

- **Menace**

[1] Pourcentage des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et peri-urbain dans les zones d'intervention ayant une conscience des risques liés aux grossesses non désirées.

---

---

## CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE DE L'ETUDE

---

---

### 2.1. Cadre théorique de l'étude

Les enquêtes TRaC (Tracking Results Continuously) développées par Population Services International (PSI) sont des études quantitatives transversales qui fournissent aux responsables de programme des informations facilement utilisables pour une prise de décision en matière de marketing social basée sur l'évidence. Ce sont des enquêtes à plusieurs passages basées sur une approche de recherche utilisée pour recueillir des informations sur un échantillon représentatif de population cible. Les données recueillies à partir des études TRaC permettent de comprendre les caractéristiques des populations cibles avec lesquelles l'AIMAS travaille.

Plus spécifiquement, cette étude TRaC permettra à l'AIMAS de disposer d'informations sur les caractéristiques socio-démographiques et sur les facteurs d'opportunité, de capacité et de motivation (OCM) de l'utilisation de méthodes modernes de contraception chez les femmes. Elle fournira ainsi au programme, une mesure des principaux indicateurs de suivi et des informations très utiles pour comprendre la meilleure façon de concevoir ses programmes de marketing. Il s'agit donc d'une étude TRaC de suivi (de 3<sup>e</sup> passage) après celles réalisées en 2013 et 2016.

### 2.2. Population cible et échantillonnage

#### 2.2.1. Population cible

Les données ont été collectées auprès des unités statistiques constituées des cibles suivantes :

- Femmes en union âgées de 25-35 ans vivant en milieu rural et péri-urbain
- Hommes en union (conjoints de femmes de 25-35 ans) vivant en milieu rural et péri-urbain

Les critères d'éligibilité sont résumés comme suit :

#### ***Pour les femmes***

1. Femmes en union de 25-35 ans ;
2. Vivre dans les milieux ruraux et péri-urbains des sites du projet ;
3. Consentir à participer volontairement à l'étude ;
4. Ne pas être un visiteur.

#### ***Pour les hommes***

1. Hommes en union conjoints des femmes de 25-35 ans ;
2. Vivre dans les milieux ruraux et péri-urbains des sites du projet ;
3. Consentir à participer volontairement à l'étude ;
4. Ne pas être un visiteur.

#### 2.2.2. Échantillonnage

Il s'est agi d'une méthode de sondage aléatoire à deux degrés avec stratification des unités primaires. Le milieu rural et le milieu péri-urbain des zones d'intervention ont représenté les strates de l'étude. Les unités primaires ont été constituées des districts de recensement (DR) ou Zone de Dénombrement (ZD) tandis que les ménages dans les DR/ZD ont constitué les unités secondaires. À l'intérieur de chaque ménage sélectionné toutes les femmes en union de 25-35 ans ont été interrogées. De même, un certain nombre de ménages a été sélectionné par DR pour l'interview des hommes conjoints des femmes de 25-35 ans.

La taille totale de l'échantillon des femmes en union âgées de 25-35 ans est de 1813 et celle des hommes est de 1416. Ces objectifs quantitatifs sont les effectifs minimaux pour produire le tableau de suivi pour les femmes et pour les hommes au niveau de l'ensemble des populations cibles.

La taille de l'échantillon requise pour chaque indicateur clé est calculée et l'échantillon de plus grande taille est retenu. Les calculs sont basés sur les hypothèses et considérations suivantes :

Pour l'échantillon des femmes :

- ✓ Seuil de significativité  $\alpha$  de 5% et puissance de test  $\beta$  de 20% ;
- ✓ Taux de réponse de 90% ;
- ✓ Effet de grappe égale à 1,5 ;
- ✓ Le taux de prévalence contraceptive des femmes en union de 25-35 ans est de 29,2% (TRaC 2016) ;
- ✓ Une augmentation d'au moins 6% de la prévalence contraceptive est espérée dans les zones d'intervention ;
- ✓ 80% des femmes en union âgées de 25-35 ans affirment qu'elles peuvent parler de l'utilisation d'une méthode moderne de planification familiale avec leur conjoint pour éviter une grossesse non désirée (TRaC 2016) ;
- ✓ Une augmentation d'au moins 6% de la proportion des femmes en union de 25-35 ans affirmant qu'elles peuvent parler de l'utilisation d'une méthode moderne de planification familiale avec leur conjoint pour éviter une grossesse non désirée est à détecter au fil du temps ;

Pour l'échantillon des hommes

- ✓ Seuil de significativité  $\alpha$  de 5% et puissance de test  $\beta$  de 20% ;
- ✓ Taux de réponse de 90% ;
- ✓ Effet de grappe égale 1,5 ;
- ✓ 22% des hommes en union ayant eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois ont déclaré avoir utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels (TRaC 2016) ; et 25,7% des hommes en union ont eu au moins 2 partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois (population à risque) ;
- ✓ Une différence d'au moins 6% est à détecter au niveau de la proportion d'hommes en union ayant eu deux partenaires ou plus qui ont déclaré avoir utilisée un condom lors des derniers rapports sexuels au fil du temps ;
- ✓ 82% des hommes en union sont d'accord pour encourager leurs épouses dans la décision d'adopter une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée (TRaC 2016) ;
- ✓ Une augmentation d'au moins 6% du niveau de la proportion des hommes en union qui sont d'accord pour encourager leurs épouses dans la décision d'adopter une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée est à détecter au fil du temps ;

La sélection des ménages dans le DR a été faite selon un tirage systématique avec probabilité égale. Un total de 25 ménages contenant au moins une femme en union âgée de 25-35 ans a été sélectionné par DR.

À l'intérieur des ménages sélectionnés, toutes les femmes en union âgées de 25-35 ans ont été enquêtées.

Parmi les 25 ménages sélectionnés par DR pour l'interview des femmes, les conjoints de ces femmes en union de 25-35 ans ont été aussi enquêtés. Un conjoint, dans 3 sur 4 ménages enquêtés contenant des femmes, a été interrogé.

### **2.3. Outils de collecte**

Il s'agit de deux questionnaires développés pour collecter les données respectivement auprès des femmes et des hommes de manière électronique. Les deux questionnaires ont les sections portant sur le ménage et les caractéristiques socioéconomiques en commun.

Le questionnaire femme contient les sections relatives à la fécondité, à l'utilisation de méthode contraceptive, à l'exposition aux activités de sensibilisation de l'AIMAS et aux facteurs d'opportunité, de capacité et de motivation (OCM).

Quant au questionnaire homme, en plus des caractéristiques sociodémographiques et de l'exposition aux activités de sensibilisation, il contient également une section sur l'utilisation de méthode contraceptive et l'adhésion à la PF.

Une fiche de consentement éclairé a été élaborée et intégrée à chaque questionnaire.

Un manuel d'enquêteur ainsi qu'un manuel de dénombrement ont été élaborés pour servir de support à la formation des agents de collecte et de guide tout au long de la collecte de données.

Le questionnaire femmes de manière spécifique contient les sections suivantes :

- Antécédents de fertilité et préférences
- Utilisation de la contraception
- Opportunité
- Capacité
- Motivation
- Exposition aux médias et aux activités de l'AIMAS

Le questionnaire hommes de manière spécifique contient les sections suivantes :

- Utilisation de la contraception
- Utilisation de préservatifs aux derniers rapports sexuels
- Capacité et motivation
- Exposition aux médias et aux activités de l'aimas

### **2.4. Formation des agents et travail sur le terrain**

La formation s'est effectuée au Centre de Perfectionnement aux Métiers de l'Automobile (CPMA) de Vridi du 25 au 30 janvier 2021. Au total 21 auditeurs ont pris part à la formation dont 20 ont été retenus pour prendre part à la collecte des données.

La formation s'est faite en deux étapes. La première, sur papier a commencé par l'examen des questionnaires en relation avec le manuel.

La seconde étape a porté sur les aspects pratiques, avec d'une part le mode opératoire pour le dénombrement des ménages éligibles et le choix des ménages à interviewer. D'autre part, Elle a consisté en la présentation de la tablette, la configuration et l'utilisation de celle-ci. A la suite, l'outil de collecte a été présenté. Ainsi, les agents ont été formés sur les principes de base de Survey Solutions nécessaire à la réalisation de la collecte.

La collecte des données s'est faite avec quatre équipes de cinq personnes chacune, dont un chef d'équipe. Après la réinitialisation des tablettes, la distribution des kits de collecte, la collecte a démarré le 31 janvier pour s'achever le 27 février 2021. Au total, chaque équipe avait à travailler dans 10 ZD soit environ 250 ménages.

La supervision technique de l'étude a été assurée par l'équipe technique du cabinet constituée par trois superviseurs et le chef de mission ainsi que par la département Suivi-Évaluation de l'AIMAS qui a effectué une mission de suivi du 6 au 20 février 2021 auprès des équipes de collecte. Ces missions ont mis en exergue certaines insuffisances qui ont été corrigées par la suite et portaient notamment sur le remplacement des ZD qui auraient dues être en milieu rural mais se sont retrouvées en milieu urbain sur le terrain.

Aussi, en raison du faible taux de réponse des conjoints (environ 72%), une phase de Tracking a été organisée du 21 mars au 31 mars 2021 et a permis de faire passer ce taux à plus de 90%.

## 2.5. Calcul des pondérations et traitement des données

### 2.5.1. Calcul des pondérations

Le plan de sondage permet de calculer des coefficients d'extrapolation qui représentent le poids absolu ou relatif du ménage tiré (nombre de ménages représentés) dans l'échantillon.

Les probabilités de sondage brutes sont calculées pour chaque degré de tirage et dans chaque strate. Dans chaque strate  $h$ , les notations sont les suivantes :

- $P_{1hi}$  : probabilité de sondage au premier degré de la ZD  $i$  de la strate  $h$  ;
- $P_{2hi}$  : probabilité de sondage au deuxième degré des ménages  $i$  dans la ZD  $i$  de la strate  $h$  ;
- $a_h$  le nombre de ZD tirées dans la strate  $h$  ;
- $M_{hi}$  le nombre de ménages de la ZD  $i$  ;
- $M_h$  le nombre total de ménages de la strate  $h$ .

Au premier degré, la probabilité d'inclusion de cette grappe  $i$  dans l'échantillon est donnée par :

$$P_{1hi} = \frac{a_h \times M_{hi}}{M_h}$$

Au deuxième degré, un nombre  $b_{hi}$  de ménages sont initialement tirés à partir des  $L_{hi}$  ménages nouvellement dénombrés dans la grappe  $i$  de la strate  $h$  lors de l'opération de mise à jour de la liste des ménages dans cette unité primaire, soit :

$$P_{2hi} = \frac{b_{hi}}{L_{hi}}$$

Finalement la probabilité  $P_{hi}$  de tirer effectivement un ménage  $i$  dans une strate  $h$  s'exprime comme suit :

$$P_{hi} = (P_{1hi} \times P_{2hi})$$

On en déduit la valeur du coefficient de pondération final (Pond)  $W_{hi}$  comme suit :

$$W_{hi} = \text{Pond}_{hi} = \frac{1}{P_{hi}}$$

## 2.5.2. Traitement des données

En ce qui concerne le traitement des données, il s'est fait à deux niveaux. Dans un premier temps des contrôles de vraisemblance ont été opérés. Ainsi, des tris à plats ont été effectués sur les variables quantitatives. Les queues de distribution, ont été examinées afin de détecter les valeurs aberrantes, et apporter les corrections nécessaires. Les cas manquants ont également fait l'objet de traitement. Dans un second temps, des programmes d'apurement élaborés ont permis de sortir les incohérences entre les variables et dans les différents modules, lesquelles ont été corrigées. Des programmes de calcul des indicateurs ont également été produits.

## 2.6. Limites de l'étude

Comme dans toutes les enquêtes par sondage, les résultats de cette enquête seront sujets à des erreurs d'échantillonnage. Les erreurs d'échantillonnage apparaissent car l'enquête ne couvre pas toute la population mais seulement une partie de celle-ci.

Bien que la supervision ait été faite sur l'ensemble des équipes, il est à noter qu'elle ne s'est pas faite dans toutes les localités de l'étude, il est donc possible que par moment les agents aient pu commettre quelques erreurs d'observations lors de la collecte. De plus, la collecte des données s'est faite dans des zones rurales parfois difficilement accessibles, à cela s'ajoutent les cas de refus. Il a donc fallu, par moment, procéder à des remplacements de ménages ou de grappes, qui ne reflètent pas forcément l'échantillon initial. Les ménages de remplacement au nombre de 5 par ZD, ont été préalablement tirés, après le retrait des 25 ménages échantillons de la grappe (les tirages étant sans remises).

Par ailleurs, après le traitement des micro-données, la mauvaise formulation de certaines questions ou encore la possibilité que l'enquêté n'ait pas bien compris la question durant les interviews a pu affecter certains indicateurs. Il convient toutefois de noter que cela n'a pas affecté la qualité des informations contenues dans la base de données.

## 2.7. Résultats de la collecte de données

Le tableau 1 nous présente les résultats de la collecte de données effectuées. Il ressort que pour les femmes, dans l'ensemble les résultats obtenus sont au-delà des réalisations, soit un taux de réalisation de 111,6% (2024 sur 1813). Par contre, au niveau des conjoints le taux réalisation est relativement plus faible et se situe à 92,2% (1305 sur 1416). Comme il est donné de constater dans le tableau suivant, les résultats attendus ont été majorés pour permettre d'atteindre les tailles d'échantillon fixés pour les deux cibles.

Le faible résultat obtenu au niveau des hommes s'explique par les cas de refus ou d'indisponibilité qui ont pu être réduits avec le Tracking.

Tableau 1: Résultats de la collecte de données

Villes	Hommes		Femmes	
	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations
DIVO	188	201	250	255
BOUAKE	188	135	250	253
KORHOGO	188	163	250	258

SEGUELA	188	246	250	248
ABENGOUROU	188	84	250	252
KOUMASSI	94	60	125	127
ABOBO	94	51	125	126
YAMO USSOUKRO	188	156	250	258
DALOA	188	209	250	247
<b>Ensemble</b>	<b>1500</b>	<b>1305</b>	<b>2000</b>	<b>2024</b>

---

## CHAPITRE 3 : CARACTERISTIQUES SOCIO DEMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION CIBLE

Ce chapitre présente quelques caractéristiques sociodémographiques des femmes de 25 à 35 ans en union dans les zones d'intervention de l'AIMAS ainsi que de leurs conjoints. Il s'agit entre autres de l'âge, du niveau d'étude, de la situation matrimoniale et des activités économiques.

### 3.1. Âge

Au regard des données sociodémographiques, l'on est en mesure de dire que la majorité des femmes interrogées est jeune, soit 62,20% et se situe dans la tranche d'âge de 25 à 30 ans. Cette tranche d'âge est majoritaire quel que soit le milieu de résidence (rural et péri-urbain).

Concernant les conjoints de ces femmes, il ressort qu'ils sont relativement plus âgés. En particulier, plus de deux tiers d'entre eux ont plus de 36 ans. Dans l'ensemble, l'âge des conjoints des femmes varie entre 25 et 82 ans.

**Tableau 2: Répartition des femmes de 25 à 35 ans en union par tranche d'âge selon le milieu de résidence**

	Milieu de résidence				Ensemble	
	Périurbain		Rural		Nombre	(%)
	Nombre	(%)	Nombre	(%)		
<b>Groupe d'âge</b>						
25 à 30 ans	788	61,40	470	63,60	1258	62,20
31 à 35 ans	496	38,60	269	36,40	765	37,80
<b>Total</b>	<b>1284</b>	<b>100,00</b>	<b>739</b>	<b>100,00</b>	<b>2023</b>	<b>100,00</b>

**Tableau 3: Répartition des conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union par tranche d'âge selon le milieu de résidence**

	Milieu de résidence		Ensemble (N=1 305)
	Péri-urbain (N=699)	Rural (N=606)	
	Groupes d'âge		
25 à 30 ans	11,2%	15,9%	12,7%
31 à 35 ans	21,0%	20,1%	20,8%
36 à 40 ans	31,8%	30,3%	31,3%
41 à 50 ans	31,3%	29,5%	30,8%
51 ans et plus	4,7%	4,1%	4,5%

### 3.2. Niveau d'études

En termes d'instruction, 40,1% des femmes interrogées n'ont pas de niveau d'étude. En milieu rural, c'est plus de la moitié (54,2%) des femmes qui n'a pas été à l'école. En milieu péri-urbain, ce taux se situe aux alentours de 32%.

La situation est similaire au niveau de leurs conjoints où la majorité (30,9%) n'a aucun niveau d'études.

En outre le niveau supérieur est atteint par une faible proportion de la population soit 7,9% chez les femmes de 25 à 35 ans en union et 12,2% chez leurs conjoints.

**Tableau 4: Répartition des femmes de 25 à 35 ans en union par niveau d'étude selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural			
		Nombre	(%)	Nombre	(%)	Nombre	(%)
Quel est le niveau d'instruction le plus élevé que vous avez atteint ?	Aucun	410	32,00	401	54,20	811	40,10
	Primaire	309	24,10	200	27,00	508	25,10
	Secondaire 1er cycle	238	18,50	92	12,50	330	16,30
	Secondaire 2nd cycle	180	14,00	34	4,60	213	10,50
	Supérieur	146	11,40	13	1,70	159	7,90
	Ne sait pas	1	0,10	0	0,00	1	0,00
<b>Total</b>		<b>1284</b>	<b>100,00</b>	<b>739</b>	<b>100,00</b>	<b>2023</b>	<b>100,00</b>

**Tableau 5: Répartition des conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union par niveau d'étude selon le milieu de résidence**

	Milieu de résidence		Ensemble (1 305)
	Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
	Niveau d'études		
Aucun	29,3%	34,3%	30,9%
Primaire	16,4%	26,6%	19,7%
Secondaire 1er cycle	20,8%	23,6%	21,7%
Secondaire 2nd cycle	17,6%	11,0%	15,5%
Supérieur	15,8%	4,6%	12,2%
Ne sait pas	0,0%	0,0%	0,0%

### 3.3. Situation matrimoniale

Sur l'ensemble des femmes de 25 à 35 ans en union, 34,4% sont mariées tandis que 65,6% sont en concubinage. C'est approximativement la même proportion en milieu rural et en milieu périurbain. Concernant la situation de leur foyer, dans l'ensemble, 10,6% des femmes ont affirmé être dans un foyer polygamique contre 84,9% des femmes qui sont dans un foyer monogamique. Aussi, 4,5% des femmes interrogées ne savent pas si leur conjoint à une autre conjointe. La quasi-totalité des femmes qui ont déclaré être dans un foyer polygamique ont une seule coépouse.

**Tableau 6: Répartition des femmes de 25 à 35 ans en union par situation matrimoniale selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural			
		Nombre	(%)	Nombre	(%)	Nombre	(%)
Êtes-vous actuellement mariée ou vivez-vous avec un homme comme si vous étiez mariés ?	Mariée	452	35,20	244	33,00	696	34,40
	Concubinage	832	64,80	495	67,00	1327	65,60
	Célibataire	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Divorcée/Séparée	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Veuve	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	S/O	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1284</b>	<b>100,00</b>	<b>739</b>	<b>100,00</b>	<b>2023</b>	<b>100,00</b>
Polygamie du couple	Polygame	95	7,40	120	16,20	215	10,60
	Monogame	1123	87,40	594	80,40	1717	84,90
	Ne sait pas	66	5,20	25	3,40	91	4,50
Au total, combien a-t-il de femmes	2	88	92,80	114	94,80	202	93,90
	3	3	3,40	6	5,00	9	4,30

ou de partenaires avec qui il vit, en vous incluant ?	4	1	0,70	0	0,20	1	0,40
	5	2	1,70	0	0,00	2	0,80
	6	1	1,40	0	0,00	1	0,60

### 3.4. Activités économiques

Dans l'ensemble, concernant l'activité économique, il faut noter que plus de deux tiers des femmes de 25 à 35 ans en union, soit 68,8% exercent une activité. 3,9% de l'ensemble d'entre elles sont en cours de scolarité quand 27,2% sont soit ménagères ou sans activité. Parmi celles qui exercent une activité, 52,5% exercent le commerce. Pour l'agriculture, ce sont 14,8% des femmes en activité qui l'exercent. La coiffure est exercée dans une moindre proportion ; environ 10% de femmes.

En milieu rural, les femmes de la population cible exercent en majorité l'agriculture et le commerce (respectivement 40% et 34,6%). En milieu péri-urbain, l'activité majoritairement exercée par les femmes de 25 à 35 ans en union est le commerce à plus de 62,7%.

En ce qui concerne leurs conjoints, une très faible proportion n'est pas économiquement active, soit 2,3%. Pour ceux qui sont en activité, ils exercent essentiellement dans le secteur des services (57,6%) et dans l'agriculture (27,8%). En milieu rural l'agriculture occupe la majorité des conjoints des femmes de 25 à 35 ans (71,6%) tandis qu'en milieu péri-urbain la majorité de ceux-ci exerce dans le secteur des services (74,4%).

Tableau 7: Répartition des femmes de 25 à 35 ans en union par statut d'occupation et par secteurs d'activité selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
Occupation	Sans Activité/Ménagère	328	25,60	222	30,10	550	27,20
	Élève/Étudiante	67	5,20	13	1,70	80	3,90
	Exerce une activité	886	69,20	504	68,20	1390	68,80
	Total	1281	100,00	739	100,00	2019	100,00
Secteur d'activité	Agriculture	4	0,40	202	40,00	206	14,80
	BTP	0	0,00	2	0,40	2	0,10
	Coiffure	112	12,70	34	6,80	147	10,60
	Couture	66	7,40	33	6,60	99	7,10
	Commerce	555	62,70	175	34,60	730	52,50
	Autres industries	7	0,80	14	2,70	21	1,50
	Autres services	75	8,40	11	2,20	86	6,20
	Éducation	18	2,10	6	1,20	24	1,80
	Élevage	2	0,20	0	0,00	2	0,10
	Restauration/Hôtellerie	41	4,60	21	4,10	62	4,40
	Santé	6	0,70	7	1,30	13	0,90
Transport	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Tableau 8: Répartition des conjoints femmes de 25 à 35 ans en union par statut d'occupation et par secteurs d'activité selon le milieu de résidence

	Milieu de résidence		Ensemble (N=1 305)
	Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
<b>Statut d'occupation</b>			
Sans activité	2,6%	1,6%	2,3%
Occupé	97,4%	98,4%	97,7%
<b>Secteurs d'activité</b>			
	Périurbain (N=681)	Rural (N=596)	Ensemble (N=1 277)
Agriculture	6,9%	71,6%	27,8%
Commerce	17,4%	5,7%	13,6%
Industrie	1,2%	0,4%	0,9%
Service	74,4%	22,4%	57,6%

### 3.5. Équipements du ménage

L'analyse des données montre que dans l'ensemble, 94,6% des ménages où vivent les femmes en union de 25-35 ans sont dotés d'électricité. En milieu péri-urbain, sur l'ensemble des ménages, 99,3% disposent de l'électricité tandis qu'en milieu rural, la proportion est de 86,4%. 76,3% des ménages des femmes qui ont été interrogées possèdent une télévision. Cette proportion est de 89,2% en milieu péri-urbain et de plus de la moitié (53,8%) en milieu rural. La quasi-totalité des ménages dispose de téléphone portable (plus de 90% des ménages). Sur l'ensemble des ménages, plus de la moitié possède la radio. La proportion de ménages disposant d'un ordinateur ou du téléphone fixe est faible et se situe respectivement à 9,6% et 3,1%.

Tableau 9: Répartition des femmes de 25 à 35 ans en union par équipement des ménages selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
Électricité	Non	9	0,70	101	13,60	110	5,40
	Oui	1275	99,30	638	86,40	1913	94,60
	Total	1284	100,00	739	100,00	2023	100,00
Radio	Non	586	45,60	383	51,90	969	47,90
	Oui	698	54,40	356	48,10	1054	52,10
Télévision	Non	138	10,80	341	46,20	480	23,70
	Oui	1146	89,20	397	53,80	1543	76,30
Téléphone portable	Non	55	4,30	57	7,70	112	5,50
	Oui	1229	95,70	682	92,30	1911	94,50
Téléphone fixe	Non	1225	95,40	734	99,40	1959	96,90
	Oui	59	4,60	4	0,60	63	3,10
Lecteur VCD/DVD	Non	957	74,50	695	94,00	1652	81,70
	Oui	327	25,50	44	6,00	371	18,30
Ordinateur	Non	1108	86,30	721	97,60	1830	90,40
	Oui	176	13,70	18	2,40	193	9,60
Aucun	Non	1284	100,00	732	99,10	2016	99,70
	Oui	0	0,00	6	0,90	6	0,30

## CHAPITRE 4 : ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE SUIVI

Dans ce chapitre, il est question d'analyser l'évolution des principaux indicateurs de suivi de l'étude TRaC PF entre 2016 et 2021. Il s'agit notamment des indicateurs de comportements, des déterminants d'opportunité, des déterminants de capacité et des déterminants de motivation.

### 4.1. Indicateurs de comportements

Entre 2016 et 2021, nous constatons une hausse de l'utilisation d'une méthode contraceptive moderne chez les femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain. Cette prévalence contraceptive qui était de 26,2% en 2013, est passée à 29,2% en 2016. Celle-ci est à 34,8% sur l'ensemble des sites de l'étude en 2021.

Par contre le pourcentage des conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain ayant eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois qui ont déclaré avoir utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels, a subi une baisse significative, passant de 21,7% en 2016 à 16,2% en 2021.

Tableau 10: Évolution des indicateurs de comportement entre 2016 et 2021

INDICATEURS	2016 N=2215	2021 N=2024	Significativité	Évolution
<b>COMPORTEMENT</b>	%	%		
Femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention utilisant une méthode contraceptive moderne	29,2	34,8	*	+
Conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain ayant eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois qui ont déclaré avoir utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels	21,7	16,2	*	-

Légende : (\*) = Significativité de l'indicateur entre 2016 et 2021 au seuil de 5%

+ = Hausse significative

- = Baisse significative

ns = non significatif

### 4.2. Déterminants d'opportunité

Au niveau des déterminants d'opportunité, il s'agissait de mesurer la perception de la disponibilité des contraceptifs modernes notamment les pilules, les injectables et les DIU.

De 2013 à 2016, la perception de la disponibilité des pilules est passée de 75,5% à 74,5%. Ce taux a connu une légère hausse non significative et s'établit à 74,6% en 2021.

Concernant la perception de la disponibilité des injectables, elle a connu une hausse, passant de 57,2% en 2013 à 66,3% en 2016. En 2021, cette proportion a augmenté significativement et se situe à 71,4%.

Pour les DIU, la proportion de femmes pensant qu'il est facile d'en trouver dans leur communauté, est passée de 15,4% à 48,2% entre 2013 et 2016 pour avoir une hausse significative de plus de 18 points en 2021 (65,6%).

Tableau 11: Évolution des déterminants d'opportunité entre 2016 et 2021

INDICATEURS	2016 N=2215	2021 N=2024	Significativité	Évolution
<b>OPPORTUNITE</b>	%	%		
Femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'on peut trouver facilement les pilules	74,5	74,6	ns	
Femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'on peut trouver facilement les injectables	66,3	71,4	*	+
Femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'on peut trouver facilement les DIU	48,2	65,6	*	+

Légende : (\*) = Significativité de l'indicateur entre 2016 et 2021 au seuil de 5%

+ = Hausse significative

- = Baisse significative

ns = non significatif

### 4.3. Déterminants de capacité

Les déterminants de capacité concernent les aspects suivants : la connaissance, l'efficacité personnelle et le soutien social.

Le niveau de connaissance des méthodes contraceptives modernes, a connu une baisse en 2016 comparativement à 2013. En 2021, on note une hausse significative du niveau de connaissance de ces méthodes contraceptives modernes. La proportion des femmes de 25-35 ayant entendu parler des pilules a augmenté de manière significative de 01 point par rapport à 2016 (91,4%) et se situe à 92,8%. Pour les injectables, la proportion est en hausse significative de plus de 05 points (84,8%) par rapport à 2016 (79,4%). La proportion des femmes de 25-35 ayant entendu parler des DIU se situe à 32,9% en 2021 contre 25,8% en 2016, soit une hausse significative de 07 points.

Pour certains contraceptifs modernes, le niveau de connaissance approfondie a connu une hausse significative. La connaissance approfondie des pilules a augmenté significativement, passant de 20,9% en 2016 à 49,8% en 2021. On note aussi une augmentation significative du niveau de connaissance approfondie du DIU qui est passé de 20,9% en 2016 à 27,3% en 2021. La connaissance approfondie des injectables n'a cependant pas évolué. De 2016 à 2021, la proportion de femmes ayant connaissance approfondie des injectables est demeurée autour de 29%.

Au niveau de l'efficacité personnelle, en 2021, 82,3% des femmes en union de 25-35 ans ont affirmé qu'elles peuvent parler avec leur conjoint de l'utilisation d'une méthode moderne de contraception pour éviter une grossesse non désirée, contre 79,9% en 2016. Cette proportion présente une hausse significative tout comme la proportion des femmes en union de 25 à 35 ans affirmant qu'elles sont capables d'utiliser une méthode moderne de contraception pour éviter une grossesse non désirée. Celle-ci est passée de 80,8% en 2016 à 83,9% en 2021.

Concernant les indicateurs relatifs au soutien social, il faut souligner que la proportion d'hommes affirmant qu'ils encourageraient leurs femmes si elles décidaient d'adopter une méthode moderne de PF est en baisse significative. Cette proportion est passée de 82% en 2016 à 65,7% en 2021.

**Tableau 12: Évolution des déterminants de capacité entre 2016 et 2021**

INDICATEURS	2016 N=2215	2021 N=2024	Significativité	Évolution
<b>CAPACITE</b>				
<b>Connaissance</b>	%	%		
Femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention connaissant les méthodes moderne de contraception : pilule, condom, injectable et DIU				
Avez-vous entendu parler de Pilule	91,4	92,8	*	+
Avez-vous entendu parler de l'Injectable	79,4	84,8	*	+
Avez-vous entendu parler du DIU	25,8	28,9	*	+
Avez-vous entendu parler du Condom		93,4		
Femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention qui ont une connaissance approfondie des méthodes moderne de contraception : pilule, condom, injectable et DIU				
Connaissance approfondie de la Pilule	20,9	49,8	*	+
Connaissance approfondie du Condom	44	74,1	*	+
Connaissance approfondie de l'Injectable	29,3	29,8	*	+
Connaissance approfondie du DIU	20,9	27,3	*	+
<b>Efficacité personnelle</b>	%	%		
Femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'elles sont capables d'utiliser une méthode moderne de contraception pour éviter une grossesse non désirée	80,8	83,9	*	+
Femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'elles peuvent parler de l'utilisation d'une méthode moderne de planification familiale à leur conjoint pour éviter une grossesse non désirée	79,9	82,3	*	+
<b>Soutien Social</b>	%	%		
Conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et périurbain dans les zones d'intervention qui sont d'accord pour encourager leurs épouses dans la décision d'adopter une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée	82	65,7	*	-
Conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention qui discutent de la planification familiale dans leur couple		57,9		

Légende : (\*) = Significativité de l'indicateur entre 2016 et 2021 au seuil de 5%

+ = Hausse significative

- = Baisse significative

ns = non significatif

#### 4.4. Déterminants de motivation

Dans les zones d'intervention, le niveau de perception des risques liés aux grossesses chez les femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain a sensiblement varié. Concernant la gravité des risques, 88,6% des femmes en 2021 pensent que les femmes qui ont des grossesses trop rapprochées souffrent habituellement de problèmes de santé contre 86,1% en 2016 (hausse non significative).

La proportion des femmes qui pensent que le risque de décès maternel est plus élevé si la femme a des grossesses chaque année est en baisse significative de plus de 03 points (87,3%) par rapport à celle de 2016 (90,8%). Par ailleurs, l'on constate une hausse significative de la

proportion de femmes qui pensent être susceptibles de contracter une grossesse si elles n'utilisent pas de méthode moderne de contraception de 2016 (81,8%) à 2021 (84%).

**Tableau 13: Évolution des déterminants de motivation entre 2016 et 2021**

INDICATEURS	2016 N=2215	2021 N=2024	Significativité	Évolution
<b>MOTIVATION</b>				
<b>Menace</b>	%	%		
Femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention ayant une conscience des risques liés aux grossesses non désirées				
Gravité : Les femmes qui ont des grossesses trop rapprochées souffrent habituellement de problèmes de santé	86,1	88,6	ns	
Gravité : Le risque de décès maternel est plus élevé si la femme a des grossesses chaque année	90,8	87,3	*	-
Susceptibilité : Si je n'utilise pas de méthode contraceptive moderne, je vais tomber enceinte	81,8	84	*	+

Légende : (\*) = Significativité de l'indicateur entre 2016 et 2021 au seuil de 5%

+ = Hausse significative

- = Baisse significative

ns = non significatif

## CHAPITRE 5 : ANTECEDENTS DE FERTILITE ET PREFERENCES DES FEMMES

Ce présent chapitre vise à présenter la situation de fertilité des femmes de 25 à 35 ans en union dans les zones d'intervention de l'AIMAS.

### 5.1. Naissances vivantes

Les résultats de la collecte de données permettent de dire que de manière générale 86,8% de femmes en union de 25-35 ans ont donné naissance à au moins un enfant. L'analyse par milieu de résidence indique que cette proportion est plus élevée en milieu rural (92,6%) relativement au milieu péri-urbain (83,4%).

Dans l'ensemble, près d'une femme sur deux (47,5%) dans notre population cible a au moins cinq enfants et le nombre moyen de naissance vivante par femme se situe à 4. Ces chiffres sont en cohérence avec l'indice synthétique de fécondité national qui est de 4,6 enfants par femme (MICS 2016).

Tableau 14: Naissances vivantes des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur toutes les fois que vous avez donné naissance à un enfant pendant votre vie. Avez-vous déjà eu un enfant ?	Non	212	16,60%	54	7,40%	267	13,20%
	Oui	1068	83,40%	684	92,60%	1753	86,80%
Nombre de naissance vivante	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	1	3	2,10%	1	0,80%	4	1,50%
	2	19	13,90%	12	9,70%	31	12,00%
	3	30	21,70%	17	14,20%	47	18,20%
	4	30	22,00%	24	19,70%	54	20,90%
	5 enfants et plus	56	40,30%	68	55,50%	124	47,50%
Nombre moyen de naissances vivantes		4,0		5,0		4,0	

### 5.2. Grossesses interrompues (avortements, fausses couches ou enfants mort-nés)

Dans l'ensemble, sur 100 femmes de 25 à 35 ans en union, on dénombre au moins 18 qui ont fait face à une interruption de grossesse. La proportion de femme de la population cible dans ce cas est relativement plus importante en milieu péri-urbain (18,5%) qu'en milieu rural (17,5%). On note en moyenne un cas d'interruption de grossesse chez les femmes de la population cible concernées par ces cas.

Tableau 15: Grossesses interrompues des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
Avez-vous déjà eu une grossesse qui s'est terminée par une fausse couche, un avortement ou par l'accouchement d'un enfant mort-né ?	Non	1044	81,50%	610	82,50%	1653	81,90%
	Oui	237	18,50%	129	17,50%	366	18,10%
	Total	1281	100,00%	739	100,00%	2019	100,00%

	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	1	160	67,50%	92	71,00%	252	68,70%
<b>Nombre de grossesses interrompues</b>	2	46	19,50%	29	22,40%	75	20,50%
	3	24	10,00%	7	5,70%	31	8,50%
	4	3	1,50%	1	0,70%	4	1,20%
	5 enfants et +	4	1,60%	0	0,30%	4	1,10%
<b>Nombre moyen de grossesses terminées par une fausse couche, un avortement ou par l'accouchement d'un enfant mort-né.</b>			2,0		1,0		1,0

### 5.3. Statut actuel de fertilité

Parmi les femmes de 25 à 35 ans en union qui ont au moins une naissance vivante, un peu plus du quart (27,7%) allaite actuellement. Cette proportion est relativement plus élevée en milieu rural (30%) qu'en milieu péri-urbain (26,2%).

De plus il faut noter que moins d'une femme sur dix de 25 à 35 ans en union est enceinte au moment de l'enquête soit 9,1%.

Parmi les femmes de 25 à 35 ans en union qui ont déjà été enceinte, il ressort une proportion de 63,6% dont la dernière grossesse était désirée. Cette proportion est relativement plus importante en milieu rural (70%) par rapport au milieu urbain (60%). En ce qui concerne celles dont la dernière grossesse n'était pas désirée, on note que pratiquement l'ensemble d'entre elles désire avoir un enfant plus tard soit plus de 89,8%.

**Tableau 16: Statut de fertilité des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
Allaitez-vous actuellement ?	Non	347	32,90%	230	33,70%	577	33,20%
	Oui	276	26,20%	204	30,00%	481	27,70%
	S/O	431	40,90%	247	36,30%	679	39,10%
	Total	1054	100,00%	682	100,00%	1736	100,00%
Êtes-vous enceinte maintenant ?	Non	1152	90,00%	661	89,50%	1813	89,80%
	Oui	109	8,50%	75	10,10%	184	9,10%
	Pas sûre	19	1,50%	3	0,40%	22	1,10%
	Total	1281	100,00%	739	100,00%	2019	100,00%
La dernière fois que vous êtes tombée enceinte, voulez-vous tomber enceinte à ce moment-là ?	Non	352	27,50%	184	24,90%	535	26,50%
	Oui	768	60,00%	517	70,00%	1285	63,60%
	S/O	161	12,60%	38	5,10%	199	9,90%
	Total	1281	100,00%	739	100,00%	2019	100,00%
Voulez-vous avoir un enfant plus tard ou ne voulez-vous pas/plus avoir d'enfants ?	Plus tard	468	91,20%	192	86,60%	660	89,80%
	Ne voulait plus	45	8,80%	30	13,40%	75	10,20%
	Total	513	100,00%	222	100,00%	735	100,00%

## CHAPITRE 6 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION

Il s'agit ici de mettre en exergue les indicateurs sur le niveau de connaissance, le niveau d'utilisation et les raisons qui poussent certains à ne pas utiliser les méthodes contraceptives.

### 6.1. Connaissance des méthodes de contraception

#### 6.1.1. Chez les femmes de 25 à 35 ans en union

Dans l'ensemble, une très faible proportion (2,4%) des femmes de 25 à 35 ans en union dans les zones d'intervention de l'AIMAS n'a aucune connaissance en matière de méthode de contraception.

Dans la même veine, une très faible proportion des femmes de 25 à 35 ans en union ne connaît aucune méthode moderne de contraception soit 2,5%. Aussi, 62,2% d'entre elles connaît au moins une méthode traditionnelle de contraception.

L'analyse des niveaux de connaissance des méthodes modernes de contraception fait ressortir trois groupes de méthodes : les méthodes à niveau de connaissance faible, les méthodes à niveau de connaissance moyen et les méthodes à niveau de connaissance élevé.

Les méthodes à niveau de connaissance faible concernent la Stérilisation féminine (22,6%) et la Stérilisation masculine (14,1%).

Les méthodes à niveau de connaissance moyen sont relatives aux méthodes suivantes : la méthode des jours fixes (27,5%), le DIU (28,9%), la contraception d'urgence (46,8%) et le préservatif féminin (62,2%).

Les méthodes à niveau de connaissance élevé renferment les injectables (84,8%), les implants (84%), les pilules (92,8%) et le préservatif masculin (93,4%).

Par ailleurs, il ressort que les niveaux de connaissance des méthodes contraceptives sont relativement plus élevés en milieu péri-urbain qu'en milieu rural.

Au niveau des différentes villes ciblées par l'étude, les tendances dégagées en termes de niveau de connaissance des méthodes chez les femmes sont les mêmes. (Voir tableau 18)

**Tableau 17: Niveau de connaissance des méthodes contraceptives des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural			
		Nombre	(%)	Nombre	(%)	Nombre	(%)
<b>Connaissance de n'importe quelle méthode de contraception</b>	Non	14	1,10%	35	4,70%	49	2,40%
	Oui	1270	98,90%	704	95,30%	1974	97,60%
<b>Connaissance d'une méthode moderne de contraception</b>	Non	14	1,10%	37	5,00%	51	2,50%
	Oui	1270	98,90%	702	95,00%	1972	97,50%
<b>Connaissance d'une méthode traditionnelle de contraception</b>	Non	357	27,80%	407	55,00%	764	37,80%
	Oui	927	72,20%	332	45,00%	1259	62,20%
<b>Avez-vous entendu parler de Stérilisation féminine (ligature) ?</b>	Non	935	72,80%	630	85,20%	1565	77,40%
	Oui	349	27,20%	109	14,80%	458	22,60%
<b>Avez-vous entendu parler de Stérilisation</b>	Non	1071	83,40%	667	90,30%	1738	85,90%
	Oui	213	16,60%	71	9,70%	285	14,10%

masculine  
(vasectomie) ?

Avez-vous entendu parler de DIU ?	Non	833	64,80%	605	81,90%	1437	71,10%
	Oui	451	35,20%	134	18,10%	586	28,90%
Avez-vous entendu parler de Injectables ?	Non	144	11,20%	164	22,20%	308	15,20%
	Oui	1141	88,80%	575	77,80%	1715	84,80%
Avez-vous entendu parler de Implants ?	Non	142	11,10%	181	24,50%	323	16,00%
	Oui	1142	88,90%	558	75,50%	1699	84,00%
Avez-vous entendu parler de Pilule ?	Non	49	3,80%	97	13,10%	146	7,20%
	Oui	1235	96,20%	642	86,90%	1876	92,80%
Avez-vous entendu parler de Préservatif masculin ?	Non	49	3,80%	84	11,40%	134	6,60%
	Oui	1235	96,20%	654	88,60%	1889	93,40%
Avez-vous entendu parler de Préservatif féminin ?	Non	387	30,20%	376	51,00%	764	37,80%
	Oui	897	69,80%	362	49,00%	1259	62,20%
Avez-vous entendu parler de Méthode des Jours Fixes (Collier du Cycle) ?	Non	835	65,00%	632	85,50%	1467	72,50%
	Oui	449	35,00%	107	14,50%	556	27,50%
Avez-vous entendu parler de Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée ?	Non	1008	78,50%	659	89,20%	1666	82,40%
	Oui	276	21,50%	80	10,80%	356	17,60%
Avez-vous entendu parler d'Abstinence périodique ?	Non	518	40,30%	483	65,40%	1001	49,50%
	Oui	766	59,70%	256	34,60%	1022	50,50%
Avez-vous entendu parler de Méthode de Retrait (coït interrompu) ?	Non	625	48,70%	548	74,10%	1173	58,00%
	Oui	659	51,30%	191	25,90%	850	42,00%
Avez-vous entendu parler de Méthode de Contraception d'urgence/Pilule du lendemain ?	Non	526	41,00%	550	74,50%	1076	53,20%
	Oui	758	59,00%	188	25,50%	946	46,80%
Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes ?	Non	1229	95,70%	712	96,40%	1941	96,00%
	Oui	55	4,30%	27	3,60%	81	4,00%

Tableau 18: Niveau de connaissance des méthodes contraceptives des femmes de 25 à 35 ans en union par ville

	DIVO	BOUAKE	KORHOGO	SEGUELA	ABENGOUROU	KOUMASSI	ABOBO	YAMOOUSSOUKRO	DALOA	Ensemble
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>Connaissance de n'importe quelle méthode de PF</b>	99,1%	97,9%	89,8%	94,5%	100,0%	97,1%	100,0%	99,6%	98,1%	97,6%
<b>Connaissance d'une méthode moderne de PF</b>	99,1%	97,9%	89,8%	93,9%	100,0%	97,1%	100,0%	99,6%	97,7%	97,5%
<b>Connaissance d'une méthode traditionnelle de PF</b>	73,2%	42,3%	44,4%	33,4%	73,3%	69,6%	84,3%	58,5%	66,8%	62,2%
<b>Stérilisation féminine (ligature)</b>	10,7%	16,3%	14,4%	7,7%	25,3%	32,0%	43,7%	31,7%	19,0%	22,6%
<b>Stérilisation masculine (vasectomie)</b>	8,2%	8,3%	13,0%	1,9%	13,8%	16,0%	30,3%	19,3%	11,8%	14,1%
<b>DIU</b>	9,6%	30,6%	24,2%	10,2%	33,7%	38,7%	48,8%	17,5%	25,1%	28,9%
<b>Injectables</b>	84,5%	83,1%	76,9%	76,8%	93,0%	80,4%	94,4%	86,4%	84,4%	84,8%
<b>Implants</b>	83,5%	78,4%	61,9%	81,2%	93,4%	87,4%	94,6%	84,5%	90,0%	84,0%
<b>Pilule</b>	89,1%	92,9%	81,3%	87,0%	98,8%	93,1%	98,4%	94,8%	95,6%	92,8%
<b>Préservatif masculin</b>	98,9%	90,3%	80,8%	89,9%	100,0%	88,6%	100,0%	97,6%	95,0%	93,4%
<b>Préservatif féminin</b>	78,6%	42,0%	30,2%	35,7%	94,0%	73,0%	87,2%	78,7%	52,4%	62,2%
<b>Méthode des Jours Fixes (Collier du Cycle)</b>	14,3%	26,8%	20,7%	2,2%	40,1%	46,2%	49,3%	19,1%	12,3%	27,5%
<b>Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée</b>	7,5%	13,1%	19,7%	5,9%	15,5%	13,3%	27,1%	12,9%	28,9%	17,6%
<b>Abstinence périodique</b>	70,0%	23,7%	28,2%	25,9%	67,9%	60,0%	78,7%	51,4%	47,6%	50,5%
<b>Méthode de Retrait (coït interrompu)</b>	43,7%	29,0%	32,7%	6,6%	66,1%	56,8%	74,9%	28,1%	23,4%	42,0%
<b>Méthode de Contraception d'urgence/Pilule du lendemain</b>	29,2%	44,2%	35,0%	13,5%	68,2%	58,6%	81,7%	33,4%	32,8%	46,8%
<b>Autre méthode</b>	2,3%	1,7%	1,0%	4,4%	6,5%	5,0%	5,4%	3,4%	7,3%	4,0%

### 6.1.2. Chez leurs conjoints

Dans l'ensemble, le niveau de connaissance des méthodes contraceptives chez les conjoints des femmes de 25 à 35 ans dans les zones d'intervention de l'AIMAS est légèrement plus élevé que chez leurs femmes avec 98,1% contre 97,6%.

Ici également, l'analyse des niveaux de connaissance des méthodes modernes de contraception fait ressortir trois groupes de méthodes : les méthodes à niveau de connaissance faible, les méthodes à niveau de connaissance moyen et les méthodes à niveau de connaissance élevé.

En plus de la Stérilisation féminine (26,2%) et de la Stérilisation masculine (30,1%) les méthodes à niveau de connaissance faible concernent aussi le DIU (23,4%) et la Méthode des Jours Fixes (27,9%).

Chez les conjoints, les méthodes à niveau de connaissance moyen sont les plus nombreuses et regroupent : les contraceptifs d'urgence (42,6%), les implants (63,4%), le préservatif féminin (63,8%) et les injectables (69,3%).

Les méthodes à niveau de connaissance élevé renferment les pilules (80,4%) et le préservatif masculin (97,1%).

Les niveaux de connaissance des méthodes contraceptives sont relativement plus élevés en milieu péri-urbain qu'en milieu rural.

L'analyse par ville des niveaux de connaissance des méthodes contraceptives chez les conjoints des femmes suit les mêmes tendances d'ensemble et les détails sont disponibles dans le tableau 20.

**Tableau 19: Niveau de connaissance des méthodes contraceptives des conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence**

	Milieu de résidence		Ensemble (N=1 305)
	Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
Connaissance de n'importe quelle méthode de contraception	98,70%	96,70%	98,10%
Connaissance d'une méthode moderne de contraception	98,70%	96,70%	98,10%
Stérilisation féminine	30,80%	16,60%	26,20%
Stérilisation masculine	36,20%	17,20%	30,10%
DIU	29,00%	11,40%	23,40%
Injectables	75,10%	57,20%	69,30%
Implants	67,90%	54,00%	63,40%
Pilule	83,60%	73,50%	80,40%
Préservatif masculin	97,70%	96,00%	97,10%
Préservatif féminin	67,60%	55,80%	63,80%
Méthode des Jours Fixes (Collier du Cycle)	31,90%	19,40%	27,90%
Méthode de Contraception d'urgence/Pilule du lendemain	53,60%	19,30%	42,60%
Connaissance d'une méthode traditionnelle de PF	72,00%	57,80%	67,50%
Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée	15,50%	11,70%	14,30%
Abstinence périodique	54,30%	44,40%	51,10%
Méthode de Retrait (coït interrompu)	63,80%	37,30%	55,30%
Autre méthode	5,20%	3,10%	4,50%
Aucune méthode	1,3%	3,3%	1,9%

**Tableau 20: Niveau de connaissance des méthodes contraceptives des conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon les villes**

	DIVO (N=201)	BOUAKE (N=135)	KORHOGO (N=163)	SEGUELA (N=246)	ABENGOUROU (N=84)	KOUMASSI (N=60)	ABOBO (N=51)	YAMOOUSSOUKRO (N=156)	DALOA (N=209)	Ensemble (N=1305)
<b>Connaissance de n'importe quelle méthode de contraception</b>	99,50%	97,10%	97,60%	95,50%	98,50%	99,20%	100,00%	98,50%	97,20%	98,10%
<b>Connaissance d'une méthode moderne de contraception</b>	99,50%	97,10%	97,60%	95,50%	98,50%	99,20%	100,00%	98,50%	97,20%	98,10%
<b>Stérilisation féminine</b>	24,10%	14,70%	25,20%	12,30%	30,10%	38,10%	49,50%	26,80%	14,70%	26,20%
<b>Stérilisation masculine</b>	25,10%	34,60%	26,40%	15,60%	24,90%	37,10%	54,00%	24,80%	18,60%	30,10%
<b>DIU</b>	8,10%	21,10%	22,50%	12,40%	25,30%	26,50%	59,80%	6,50%	13,00%	23,40%
<b>Injectables</b>	69,50%	64,80%	67,30%	49,80%	93,10%	77,80%	93,80%	71,30%	53,50%	69,30%
<b>Implants</b>	61,70%	51,90%	51,30%	40,80%	89,70%	74,70%	89,50%	54,80%	60,30%	63,40%
<b>Pilule</b>	79,20%	68,10%	82,50%	59,80%	96,40%	85,00%	93,60%	86,40%	78,50%	80,40%
<b>Préservatif masculin</b>	98,80%	97,40%	97,60%	93,80%	100,00%	98,20%	95,60%	98,90%	96,70%	97,10%
<b>Préservatif féminin</b>	78,80%	29,80%	46,20%	41,20%	99,10%	71,90%	93,50%	82,00%	63,80%	63,80%
<b>Méthode des Jours Fixes (Collier du Cycle)</b>	13,10%	22,50%	49,30%	16,70%	18,80%	33,00%	42,00%	10,20%	18,20%	27,90%
<b>Méthode de Contraception d'urgence/Pilule du lendemain</b>	22,20%	38,70%	41,10%	21,00%	63,90%	55,80%	82,50%	28,70%	25,60%	42,60%
<b>Connaissance d'une méthode traditionnelle de PF</b>	78,50%	70,20%	49,20%	46,10%	69,10%	70,60%	85,30%	67,40%	69,00%	67,50%
<b>Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée</b>	5,50%	4,30%	37,00%	10,70%	9,60%	6,90%	19,00%	7,10%	13,60%	14,30%
<b>Abstinence périodique</b>	72,60%	28,60%	36,10%	28,00%	66,90%	50,90%	81,00%	57,80%	52,10%	51,10%
<b>Méthode de Retrait (coït interrompu)</b>	51,40%	68,60%	34,70%	36,00%	68,90%	68,00%	80,90%	55,70%	42,40%	55,30%
<b>Autre méthode</b>	2,60%	1,40%	5,30%	2,30%	4,70%	4,20%	11,20%	7,30%	2,50%	4,50%
<b>Aucune méthode</b>	0,5%	2,9%	2,4%	4,5%	1,5%	0,8%	0,0%	1,5%	2,8%	1,9%

## 6.2. Méthodes de contraception utilisées actuellement

### 6.2.1. Chez les femmes de 25 à 35 ans en union

La section précédente a fait ressortir des niveaux de connaissance élevés des méthodes contraceptives en particulier les méthodes modernes chez les femmes de la population cible. Par contre l'analyse de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives révèle un niveau d'utilisation faible dans l'ensemble des méthodes (modernes et traditionnelles) soit 38,2%. L'utilisation actuelle des méthodes contraceptives est relativement plus élevée en milieu péri-urbain (43,4%) comparativement au milieu rural (29%).

L'utilisation des méthodes contraceptives modernes est fortement plus prisee chez les femmes de 25 à 35 ans en union soit 34,8% comparativement aux méthodes traditionnelles dont le niveau d'utilisation se situe à 3,9%.

Au niveau des méthodes contraceptives modernes, il ressort qu'aucune femme de la population cible n'utilise actuellement la stérilisation féminine, le diaphragme et la mousse ou gelée spermicide. En outre, les méthodes les plus utilisées actuellement par les femmes de notre population cible sont respectivement la pilule (23,5%), les injectables (23,6%) et les implants (24,8%).

Il convient de relever que les femmes de la population cible résidant en milieu rural présente un niveau élevé d'utilisation actuelle des implants (32,9%) et des injectables (29,9%) comparativement à celles du milieu péri-urbain.

L'analyse de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives au niveau des différentes villes de l'étude montre que les villes présentent des niveaux d'utilisation actuelle similaires variant entre 28% et 47% pour l'ensemble des méthodes contraceptives et tout comme pour les méthodes modernes de contraception. Cependant la ville de Korhogo (17,4%) présente un niveau d'utilisation actuelle faible des méthodes contraceptives modernes.

Tableau 21: Niveau d'utilisation actuelle des méthodes contraceptives des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
Utilisation de n'importe quelle méthode de contraception	Non	726	56,60%	524	71,00%	1251	61,80%
	Oui	558	43,40%	214	29,00%	772	38,20%
Utilisation d'une méthode moderne de contraception	Non	781	60,80%	538	72,90%	1320	65,20%
	Oui	503	39,20%	200	27,10%	703	34,80%
Utilisation d'une méthode traditionnelle de contraception	Non	1221	95,10%	722	97,70%	1943	96,10%
	Oui	63	4,90%	17	2,30%	80	3,90%
Quelles méthodes utilisez-vous ? Stérilisation Féminine	Non	560	100,00%	228	100,00%	788	100,00%
	Oui	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Quelles méthodes utilisez-vous ? Stérilisation Masculine	Non	560	100,00%	228	100,00%	788	100,00%
	Oui	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Quelles méthodes utilisez-vous ? DIU	Non	530	94,50%	226	99,20%	756	95,90%
	Oui	31	5,50%	2	0,80%	32	4,10%
Quelles méthodes utilisez-vous ? Implants	Non	440	78,50%	153	67,10%	593	75,20%
	Oui	120	21,50%	75	32,90%	195	24,80%

<b>Quelles méthodes utilisez-vous ?</b>	<b>Non</b>	442	78,90%	160	70,10%	602	76,40%
<b>Injectables</b>	<b>Oui</b>	118	21,10%	68	29,90%	186	23,60%
<b>Quelles méthodes utilisez-vous ?</b>	<b>Non</b>	417	74,50%	186	81,60%	603	76,50%
<b>Pilule</b>	<b>Oui</b>	143	25,50%	42	18,40%	185	23,50%
<b>Quelles méthodes utilisez-vous ?</b>	<b>Non</b>	521	93,00%	226	99,10%	747	94,80%
<b>Contraception d'urgence</b>	<b>Oui</b>	39	7,00%	2	0,90%	41	5,20%
<b>Quelles méthodes utilisez-vous ?</b>	<b>Non</b>	500	89,20%	226	99,10%	726	92,10%
<b>Préservatif masculin</b>	<b>Oui</b>	60	10,80%	2	0,90%	62	7,90%
<b>Quelles méthodes utilisez-vous ?</b>	<b>Non</b>	560	100,00%	227	99,70%	788	99,90%
<b>Préservatif féminin</b>	<b>Oui</b>	0	0,00%	1	0,30%	1	0,10%
<b>Quelles méthodes utilisez-vous ?</b>	<b>Non</b>	560	100,00%	228	100,00%	788	100,00%
<b>Diaphragme</b>	<b>Oui</b>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Quelles méthodes utilisez-vous ?</b>	<b>Non</b>	560	100,00%	228	100,00%	788	100,00%
<b>Mousse/gelée spermicide</b>	<b>Oui</b>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Quelles méthodes utilisez-vous ?</b>	<b>Non</b>	532	95,00%	218	95,60%	750	95,20%
<b>Méthode des jours fixes/collier du cycle</b>	<b>Oui</b>	28	5,00%	10	4,40%	38	4,80%
<b>Quelles méthodes utilisez-vous ?</b>	<b>Non</b>	560	100,00%	228	100,00%	788	100,00%
<b>MAMA</b>	<b>Oui</b>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Quelles méthodes utilisez-vous ?</b>	<b>Non</b>	518	92,60%	215	94,40%	734	93,10%
<b>Abstinence périodique (méthode rythmique)</b>	<b>Oui</b>	42	7,40%	13	5,60%	54	6,90%
<b>Quelles méthodes utilisez-vous ?</b>	<b>Non</b>	557	99,40%	227	99,50%	784	99,50%
<b>Retrait</b>	<b>Oui</b>	3	0,60%	1	0,50%	4	0,50%
<b>Quelles méthodes utilisez-vous ?</b>	<b>Non</b>	560	100,00%	227	99,40%	787	99,80%
<b>Autre méthode moderne</b>	<b>Oui</b>	0	0,00%	1	0,60%	1	0,20%



## 6.2.2. Chez leurs conjoints

Dans l'ensemble, il ressort une faible intention d'utilisation actuelle des méthodes contraceptives dans le couple par les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union, soit 22,1%. Cette valeur est plus élevée en milieu péri-urbain (23,2%) qu'en milieu rural (19,7%).

Concernant l'intention d'utilisation actuelle des méthodes contraceptives modernes par les conjoints, le niveau est également faible, soit 17,1% dans l'ensemble, avec une meilleure intention d'utilisation en milieu péri-urbain (19%).

L'analyse du désir d'utilisation actuelle des différentes méthodes contraceptives modernes par les conjoints dans leur couple met en exergue que ceux-ci sont actuellement favorables à l'utilisation des méthodes suivantes : préservatif masculin (34,9%), les injectables (21,4%) puis les implants (17,7%) et les pilules (14,8%).

Au niveau de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives par villes, plusieurs villes présentent des proportions de conjoints favorables à l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives modernes relativement très faibles. Il s'agit notamment d'Abobo (6,3%), Daloa (10,2%), Séguéla (10,8%) et Korhogo (11,8%).

**Tableau 23: Niveau d'utilisation actuelle des méthodes contraceptives d'après les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence**

	Milieu de résidence		Ensemble (N=1 305)
	Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
<b>Toute méthode</b>	23,2%	19,7%	22,1%
<b>Utilisation d'une méthode moderne de contraception</b>	19,0%	13,3%	17,1%
<b>Stérilisation Féminine</b>	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Stérilisation Masculine</b>	1,0%	0,0%	0,7%
<b>DIU</b>	3,9%	0,0%	2,8%
<b>Implants</b>	15,3%	23,9%	17,7%
<b>Injectables</b>	20,6%	23,4%	21,4%
<b>Pilule</b>	14,7%	15,1%	14,8%
<b>Contraception d'urgence</b>	3,8%	0,0%	2,7%
<b>Préservatif masculin</b>	43,2%	14,2%	34,9%
<b>Préservatif féminin</b>	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Mousse/gelée spermicide</b>	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Méthode des jours fixes/collier du cycle</b>	0,1%	0,5%	0,3%
<b>Autre méthode moderne</b>	0,9%	0,0%	0,6%
<b>Utilisation d'une méthode traditionnelle de PF</b>	3,2%	4,8%	3,7%
<b>MAMA</b>	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Abstinence périodique (méthode rythmique)</b>	8,5%	24,4%	13,1%
<b>Retrait</b>	5,6%	2,3%	4,7%
<b>Autre méthode traditionnelle</b>	1,0%	0,8%	1,0%
<b>Aucune Méthode</b>	<b>76,8%</b>	<b>80,3%</b>	<b>77,9%</b>

**Tableau 24: Niveau d'utilisation actuelle des méthodes contraceptives d'après les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence**

	DIVO (N=201)	BOUAKE (N=135)	KORHOGO (N=163)	SEGUELA (N=246)	ABENGOUROU (N=84)	KOUMASSI (N=60)	ABOBO (N=51)	YAMOOUSSOUKRO (N=156)	DALOA (N=209)	Ensemble (N=1305)
<b>Toute méthode</b>	37,4%	17,9%	13,3%	12,9%	20,6%	43,5%	10,2%	38,6%	16,1%	22,1%
<b>Utilisation d'une méthode moderne de PF</b>	19,5%	16,1%	11,8%	10,8%	16,0%	39,5%	6,3%	30,5%	10,2%	17,1%
<b>Stérilisation Féminine</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Stérilisation Masculine</b>	0,0%	7,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%
<b>DIU</b>	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	4,2%	24,0%	0,0%	0,0%	2,8%
<b>Implants</b>	18,9%	1,2%	44,2%	15,1%	17,1%	8,0%	24,3%	24,0%	27,3%	17,7%
<b>Injectables</b>	33,3%	54,1%	23,5%	16,8%	11,9%	12,8%	0,0%	35,1%	9,1%	21,4%
<b>Pilule</b>	9,8%	29,5%	5,0%	43,7%	16,6%	10,6%	0,0%	14,1%	20,9%	14,8%
<b>Contraception d'urgence</b>	0,0%	7,2%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%	24,3%	0,0%	0,0%	2,7%
<b>Préservatif masculin</b>	0,0%	13,8%	13,0%	14,1%	45,9%	81,4%	24,0%	11,6%	17,7%	34,9%
<b>Préservatif féminin</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Mousse/gelée spermicide</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Méthode des jours fixes/collier du cycle</b>	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	0,3%
<b>Autre méthode moderne</b>	0,0%	0,0%	7,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%
<b>Utilisation d'une méthode traditionnelle de PF</b>	11,9%	1,4%	0,7%	1,9%	2,5%	4,2%	2,4%	5,5%	4,9%	3,7%
<b>MAMA</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Abstinence périodique (méthode rythmique)</b>	36,5%	1,3%	0,0%	11,7%	14,3%	0,0%	27,7%	7,3%	34,3%	13,1%
<b>Retrait</b>	0,0%	7,2%	5,7%	0,0%	0,0%	10,6%	0,0%	1,4%	0,0%	4,7%
<b>Autre méthode traditionnelle</b>	1,4%	0,0%	0,0%	4,4%	0,0%	0,0%	0,0%	6,6%	0,0%	1,0%
<b>Aucune Méthode</b>	62,6%	82,1%	86,7%	87,1%	79,4%	56,5%	89,8%	61,4%	83,9%	77,9%

### 6.3. Informations complémentaires sur l'utilisation actuelles des méthodes contraceptives modernes

#### 6.3.1. Source d'approvisionnement

Globalement les femmes de la population cible s'approvisionnent en méthodes contraceptives modernes dans les centres de santé publics (63,8%) ou privés (20,4%) et les cliniques mobiles (15,8%).

Les sources d'approvisionnement les plus citées par les femmes pour le DIU, les injectables et les implants sont les centres de santé publics ou privés.

Les pharmacies et les centres de santé publics constituent les principales sources d'approvisionnement en pilule pour les femmes.

La grande majorité des femmes se procurent les contraceptifs d'urgence et les préservatifs féminins en pharmacie.

Au niveau des préservatifs masculins, il ressort deux principales sources d'approvisionnement à savoir la pharmacie (40,3%) et les magasins, boutiques ou kiosques (55,7%).

**Tableau 25: Sources d'approvisionnement en moyens de contraception modernes des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence**

	Milieu de résidence				Ensemble		
	Périurbain		Rural		Nombre	(%)	
	Nombre	(%)	Nombre	(%)			
<b>DIU</b>	Hôpital public/centre de santé/ Clinique de planning familial	19	61,70	2	100,00	21	63,80
	Clinique mobile	5	16,70	0	0,00	5	15,80
	Agent de santé	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Hôpital/clinique privé(e)	7	21,60	0	0,00	7	20,40
	Pharmacie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Clinique franchisée/du réseau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Agent de terrain de réseau ou de franchise	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Magasin/boutique/kiosque	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Église	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ami/parent	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Clinique d'une ONGC	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Autre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>IMPLANTS</b>	Hôpital public/centre de santé/ Clinique de planning familial	105	87,50	64	85,00	169	86,50
	Clinique mobile	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Agent de santé	3	2,40	2	3,00	5	2,60
	Hôpital/clinique privé(e)	5	4,10	5	6,10	9	4,90
	Pharmacie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Clinique franchisée/du réseau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Agent de terrain de réseau ou de franchise	1	0,80	1	1,00	2	0,90
	Magasin/boutique/kiosque	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Église	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ami/parent	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Clinique d'une ONGC	0	0,00	1	1,00	1	0,40
	Autre	7	5,20	3	3,90	9	4,70

INJECTABLES	Hôpital public/centre de santé/ Clinique de planning familial	97	82,20	54	78,80	151	80,90
	Clinique mobile	3	2,80	1	1,80	5	2,40
	Agent de santé	2	1,80	1	1,00	3	1,50
	Hôpital/clinique privé(e)	4	3,60	9	13,40	13	7,20
	Pharmacie	6	5,20	3	4,90	10	5,10
	Clinique franchisée/du réseau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Agent de terrain de réseau ou de franchise	4	3,10	0	0,00	4	2,00
	Magasin/boutique/kiosque	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Église	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ami/parent	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Clinique d'une ONGC	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Autre	1	1,20	0	0,00	1	0,80	
PILULES	Hôpital public/centre de santé/ Clinique de planning familial	54	37,50	23	55,60	77	41,60
	Clinique mobile	4	3,00	0	0,00	4	2,30
	Agent de santé	0	0,10	1	3,10	1	0,80
	Hôpital/clinique privé(e)	3	2,00	0	0,90	3	1,70
	Pharmacie	74	51,40	16	38,70	90	48,50
	Clinique franchisée/du réseau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Agent de terrain de réseau ou de franchise	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Magasin/boutique/kiosque	6	4,30	0	0,00	6	3,30
	Église	0	0,00	0	0,60	0	0,10
	Ami/parent	2	1,70	0	1,10	3	1,60
	Clinique d'une ONGC	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Autre	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
CONTRACEPTIONS D'URGENCE	Hôpital public/centre de santé/ Clinique de planning familial	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Clinique mobile	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Agent de santé	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Hôpital/clinique privé(e)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Pharmacie	36	92,50	2	100,00	38	92,90
	Clinique franchisée/du réseau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Agent de terrain de réseau ou de franchise	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Magasin/boutique/kiosque	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Église	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ami/parent	3	7,50	0	0,00	3	7,10
	Clinique d'une ONGC	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Autre	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
PRESERVATIF MASCULIN	Hôpital public/centre de santé/ Clinique de planning familial	0	0,50	1	100,0	1	2,20
	Clinique mobile	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Agent de santé	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Hôpital/clinique privé(e)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Pharmacie	25	40,90	0	0,00	25	40,30
	Clinique franchisée/du réseau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Agent de terrain de réseau ou de franchise	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Magasin/boutique/kiosque	35	57,50	0	0,00	35	55,70

	Église	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ami/parent	0	0,00	0	0,00	0	0,80
	Clinique d'une ONGC	1	1,10	0	0,00	1	1,00
	Autre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Hôpital public/centre de santé/ Clinique de planning familial	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Clinique mobile	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Agent de santé	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Hôpital/clinique privé(e)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Pharmacie	0	0,00	1	100,00	1	100,00
PRESERVATIF FEMININ	Clinique franchisée/du réseau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Agent de terrain de réseau ou de franchise	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Magasin/boutique/kiosque	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Église	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ami/parent	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Clinique d'une ONGC	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Autre	0	0,00	0	0,00	0	0,00

### 6.3.2. Coût d'acquisition

Au niveau du coût des moyens de contraception modernes, on note une certaine dispersion des prix pour une méthode donnée.

D'abord pour le DIU, plus de 37% des utilisatrices ne connaissent pas le coût de cette méthode et pour celles qui connaissent le coût, il varie de 1000 FCFA à 7000 FCFA.

Ensuite pour les implants, plus de 28% des utilisatrices ne connaissent pas le prix et pour celles qui le connaissent il varie de 1300 FCFA à 7500 FCFA.

Concernant les injectables, près de 6% des utilisatrices ne connaissent pas le prix et celui-ci varie entre 500 FCFA et 6000 FCFA pour celles qui le connaissent.

Pour la pilule, seulement 3% des utilisatrices ne connaissent pas le prix qui varie de 250 FCFA à 5000 FCFA selon celles qui le connaissent.

Le prix d'acquisition du contraceptif d'urgence varie entre 500 FCFA et 2000 FCFA selon plus de 99% des utilisatrices.

Le préservatif masculin quant à lui, varie entre 100 FCFA et 2000 FCFA pour plus de 77% des utilisatrices.

Tableau 26: Coût d'acquisition des moyens de contraception modernes des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence

	Milieu de résidence						
	Périurbain		Rural		Ensemble		
	Nombre	(%)	Nombre	(%)	Nombre	(%)	
DIU	Ne sait pas	12	39,90	0	0,00	12	37,70
	1000	0	1,30	0	0,00	0	1,20
	3000	5	16,70	1	37,20	6	17,90
	5000	5	15,60	1	62,80	6	18,20
	5500	4	14,70	0	0,00	4	13,90
	6500	1	4,70	0	0,00	1	4,40

	<b>7000</b>	2	7,20	0	0,00	2	6,80
	<b>Ne sait pas</b>	21	17,80	35	46,10	56	28,70
	<b>1300</b>	3	2,10	0	0,00	3	1,30
	<b>1500</b>	1	0,70	0	0,00	1	0,40
	<b>2000</b>	1	1,20	4	5,30	5	2,80
	<b>2500</b>	0	0,00	3	3,80	3	1,50
	<b>3000</b>	22	18,30	3	4,50	25	13,00
	<b>3500</b>	2	1,70	0	0,00	2	1,00
<b>IMPLANTS</b>	<b>4000</b>	4	3,00	8	11,20	12	6,20
	<b>5000</b>	49	40,80	19	24,80	68	34,70
	<b>5250</b>	2	1,30	0	0,00	2	0,80
	<b>5500</b>	2	1,90	0	0,00	2	1,10
	<b>6000</b>	8	6,30	1	1,80	9	4,60
	<b>6500</b>	0	0,00	1	0,70	1	0,30
	<b>7000</b>	6	4,90	1	1,10	7	3,40
	<b>7500</b>	0	0,00	1	0,70	1	0,30
	<b>Ne sait pas</b>	5	4,30	8	11,20	13	6,80
	<b>500</b>	1	0,80	1	1,00	2	0,90
	<b>700</b>	0	0,00	2	2,40	2	0,90
	<b>1000</b>	22	18,60	26	37,50	48	25,60
	<b>1035</b>	0	0,00	1	2,00	1	0,70
	<b>1100</b>	6	5,20	1	1,00	7	3,60
	<b>1150</b>	1	1,10	0	0,50	2	0,90
	<b>1200</b>	0	0,00	0	0,40	0	0,10
	<b>1300</b>	1	1,00	0	0,00	1	0,60
	<b>1500</b>	27	23,00	18	26,00	45	24,10
<b>INJECTABLES</b>	<b>1650</b>	0	0,20	0	0,00	0	0,10
	<b>2000</b>	12	9,80	2	2,60	13	7,20
	<b>2400</b>	0	0,00	1	2,00	1	0,70
	<b>2500</b>	0	0,30	5	6,60	5	2,60
	<b>3000</b>	17	14,50	1	1,40	18	9,70
	<b>3200</b>	1	1,30	0	0,00	1	0,80
	<b>3500</b>	6	5,20	1	0,70	7	3,60
	<b>4000</b>	2	1,40	0	0,00	2	0,90
	<b>4500</b>	2	1,90	0	0,00	2	1,20
	<b>5000</b>	13	10,70	3	4,70	16	8,50
	<b>6000</b>	1	0,80	0	0,00	1	0,50
	<b>Ne sait pas</b>	5	3,80	1	2,80	7	3,60
	<b>250</b>	1	0,40	0	0,90	1	0,50
	<b>450</b>	5	3,40	0	0,50	5	2,70
	<b>470</b>	1	0,60	1	3,20	2	1,20
<b>PILULE</b>	<b>475</b>	5	3,50	0	0,00	5	2,70
	<b>480</b>	2	1,70	0	0,00	2	1,30
	<b>500</b>	101	70,30	29	68,30	129	69,90
	<b>600</b>	12	8,70	1	2,70	14	7,30
	<b>620</b>	1	0,40	0	0,00	1	0,30

	750	0	0,00	0	0,70	0	0,20
	1000	8	5,40	6	13,20	13	7,20
	2500	0	0,00	3	6,60	3	1,50
	3460	2	1,70	0	0,00	2	1,30
	5000	0	0,00	0	1,10	0	0,30
	<b>Ne sait pas</b>	0	0,80	0	0,00	0	0,80
<b>CONTRACEPTION D'URGENCE</b>	500	1	3,70	0	0,00	1	3,50
	1000	1	1,90	0	0,00	1	1,80
	1050	10	26,40	0	0,00	10	25,10
	1100	22	55,30	2	100,00	24	57,50
	1200	2	4,30	0	0,00	2	4,10
	2000	3	7,50	0	0,00	3	7,10
	<b>Ne sait pas</b>	12	20,00	2	91,10	14	22,20
<b>PRESERVATIF MASCULIN</b>	100	3	5,60	0	8,90	4	5,70
	150	3	4,80	0	0,00	3	4,70
	200	21	35,00	0	0,00	21	33,80
	250	5	9,00	0	0,00	5	8,70
	300	1	2,50	0	0,00	1	2,40
	500	3	4,20	0	0,00	3	4,10
	600	3	5,60	0	0,00	3	5,40
	900	2	3,50	0	0,00	2	3,40
	1000	4	7,00	0	0,00	4	6,80
	2000	2	2,80	0	0,00	2	2,70
	<b>Ne sait pas</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PRESERVATIF FEMININ</b>	900	0	0,00	1	100,00	1	100,00

### 6.3.3. Informations sur les effets secondaires et l'utilisation d'autres méthodes

La proportion de femmes qui ont reçu des informations sur les effets secondaires de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes varie d'une méthode à une autre.

Pour les utilisatrices de DIU, une faible proportion (environ 20%) a reçu des informations sur les effets secondaires de son utilisation. Parmi celles-ci, plus de 84% ont été informées de ce qu'il fallait faire en cas de problème. Par ailleurs, plus de 21% des utilisatrices de DIU ont été entretenues sur d'autres méthodes de planification familiale qu'elles pourraient utiliser.

Près de la moitié des utilisatrices des implants ont reçu des informations sur les effets secondaires liés à cette méthode. De plus la majorité d'entre elles savent ce qu'il faut faire en cas de problème lors de l'utilisation de cette méthode. Par ailleurs, la quasi-totalité d'entre elles a été sensibilisée à l'utilisation d'autres méthodes contraceptives.

Pour les injectables, c'est plus de la moitié des utilisatrices qui a reçu des informations sur les effets secondaires liés à leur utilisation et la majorité d'entre elles savent ce qu'il faut faire en cas de problème lors de l'utilisation de cette méthode. La quasi-totalité d'entre elles a été sensibilisée à l'utilisation de méthodes contraceptives alternatives.

Environ 40% des utilisatrices de pilule ont été informées des effets secondaires liés à leur utilisation. La grande majorité d'entre elles sait ce qu'il faut faire en cas de problème. Par contre si la majorité des utilisatrices de pilule ont été informées sur d'autres méthodes contraceptives, cela n'est pas le cas au niveau des utilisatrices des contraceptifs d'urgence.

En ce qui concerne les utilisatrices des préservatifs (masculin et féminin), ce n'est qu'une infime proportion qui a reçu des informations sur les effets secondaires. Aussi moins du tiers de ces utilisatrices sont sensibilisées sur d'autres méthodes contraceptives lors de l'achat.

Tableau 27: Information sur les effets secondaires et sur d'autres méthodes contraceptives aux femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural			
		Nombre	(%)	Nombre	(%)	Nombre	(%)
<b>DIU</b>							
Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'effets secondaires ou de problèmes que vous pourriez avoir en utilisant cette méthode ?	Non	25	80,10	1	62,80	26	79,20
	Oui	6	19,90	1	37,20	7	20,80
Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé des effets secondaires ou des problèmes que vous pourriez avoir à cause de l'utilisation de la méthode ?	Non	21	84,90	1	100,00	22	85,60
	Oui	4	15,10	0	0,00	4	14,40
Vous a-t-on dit ce qu'il fallait faire si vous aviez ces effets secondaires ou ces problèmes ?	Non	2	17,00	0	0,00	2	15,90
	Oui	8	83,00	1	100,00	9	84,10
Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pourriez utiliser ?	Non	18	58,80	2	100,00	20	61,10
	Oui	13	41,20	0	0,00	13	38,90
Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pouviez utiliser ?	Non	4	33,70	26	100,00	30	78,10
	Oui	8	66,30	0	0,00	8	21,90
<b>IMPLANTS</b>							
Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'effets secondaires ou de problèmes que vous pourriez avoir en utilisant cette méthode ?	Non	58	48,20	45	59,70	103	52,60
	Oui	62	51,80	30	40,30	92	47,40
Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé des effets secondaires ou des problèmes que vous pourriez avoir à cause de l'utilisation de la méthode ?	Non	47	81,00	39	88,20	86	84,10
	Oui	11	19,00	5	11,80	16	15,90
Vous a-t-on dit ce qu'il fallait faire si vous aviez ces effets secondaires ou ces problèmes ?	Non	4	5,00	2	5,20	6	5,10
	Oui	70	95,00	34	94,80	103	94,90
Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pourriez utiliser ?	Non	53	43,70	41	54,80	94	48,00
	Oui	68	56,30	34	45,20	102	52,00
Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pouviez utiliser ?	Non	7	10,40	1	3,40	8	8,00
	Oui	61	89,60	33	96,60	93	92,00
<b>INJECTABLES</b>							
Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on	Non	60	50,80	28	40,40	88	47,00

parlé d'effets secondaires ou de problèmes que vous pourriez avoir en utilisant cette méthode ?	Oui	58	49,20	41	59,60	99	53,00
Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé des effets secondaires ou des problèmes que vous pourriez avoir à cause de l'utilisation de la méthode ?	Non	53	89,10	21	75,80	74	84,90
	Oui	7	10,90	7	24,20	13	15,10
Vous a-t-on dit ce qu'il fallait faire si vous aviez ces effets secondaires ou ces problèmes ?	Non	0	0,70	2	5,00	3	2,50
	Oui	64	99,30	45	95,00	109	97,50
Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pourriez utiliser ?	Non	53	44,70	19	27,40	71	38,40
	Oui	65	55,30	50	72,60	115	61,60
Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pouviez utiliser ?	Non	2	3,60	3	6,60	6	4,90
	Oui	63	96,40	46	93,40	109	95,10
<b>PILULE</b>							
Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'effets secondaires ou de problèmes que vous pourriez avoir en utilisant cette méthode ?	Non	100	69,60	20	46,50	119	64,40
	Oui	43	30,40	22	53,50	66	35,60
Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé des effets secondaires ou des problèmes que vous pourriez avoir à cause de l'utilisation de la méthode ?	Non	99	99,50	19	95,60	118	98,90
	Oui	0	0,50	1	4,40	1	1,10
Vous a-t-on dit ce qu'il fallait faire si vous aviez ces effets secondaires ou ces problèmes ?	Non	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Oui	44	100,00	23	100,00	67	100,00
Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pourriez utiliser ?	Non	93	64,70	19	28,30	112	53,00
	Oui	51	35,30	42	62,90	93	44,20
Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pouviez utiliser ?	Non	6	12,30	0	0,00	6	6,70
	Oui	44	87,70	23	54,00	67	72,30
<b>CONTRACEPTION D'URGENCE</b>							
Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'effets secondaires ou de problèmes que vous pourriez avoir en utilisant cette méthode ?	Non	31	78,80	14	77,40	44	78,30
	Oui	8	21,20	4	22,60	12	21,70
Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé des effets secondaires ou des problèmes que vous pourriez avoir à cause de l'utilisation de la méthode ?	Non	31	100,00	18	100,00	48	100,00
	Oui	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vous a-t-on dit ce qu'il fallait faire si vous aviez ces effets secondaires ou ces problèmes ?	Non	0	0,00	12	74,50	12	48,60
	Oui	8	100,00	4	25,50	12	51,40
Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pourriez utiliser ?	Non	30	77,80	18	100,00	48	84,70
	Oui	9	22,20	0	0,00	9	15,30

Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pouviez utiliser ?	Non	5	59,30	16	100,00	21	85,50
	Oui	4	40,70	0	0,00	4	14,50
<b>PRESERVATIF MASCULIN</b>							
Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'effets secondaires ou de problèmes que vous pourriez avoir en utilisant cette méthode ?	Non	57	94,60	18	100,00	75	95,80
	Oui	3	5,40	0	0,00	3	4,20
Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé des effets secondaires ou des problèmes que vous pourriez avoir à cause de l'utilisation de la méthode ?	Non	56	98,90	18	100,00	74	99,10
	Oui	1	1,10	0	0,00	1	0,90
Vous a-t-on dit ce qu'il fallait faire si vous aviez ces effets secondaires ou ces problèmes ?	Non	0	0,00	14	87,20	14	69,70
	Oui	4	100,00	2	12,80	6	30,30
Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pourriez utiliser ?	Non	47	77,50	18	100,00	64	82,60
	Oui	14	22,50	0	0,00	14	17,40
Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pouviez utiliser ?	Non	4	26,40	16	100,00	19	65,70
	Oui	10	73,60	0	0,00	10	34,30
<b>PRESERVATIF FEMININ</b>							
Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'effets secondaires ou de problèmes que vous pourriez avoir en utilisant cette méthode ?	Non	0	0,00	16	100,00	16	100,00
	Oui	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé des effets secondaires ou des problèmes que vous pourriez avoir à cause de l'utilisation de la méthode ?	Non	0	0,00	16	100,00	16	100,00
	Oui	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vous a-t-on dit ce qu'il fallait faire si vous aviez ces effets secondaires ou ces problèmes ?	Non	0	0,00	16	100,00	16	100,00
	Oui	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pourriez utiliser ?	Non	0	0,00	16	96,40	16	96,40
	Oui	0	0,00	1	3,60	1	3,60
Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pouviez utiliser ?	Non	0	0,00	16	96,40	16	96,40
	Oui	0	0,00	1	3,60	1	3,60

#### 6.3.4. Marques les plus utilisées

Au niveau des pilules, la marque *Confiance*® est largement la plus souvent utilisée avec une proportion de 92,3% des utilisatrices.

Pour les injectables, la majorité des utilisatrices se retrouve au niveau de la marque *Harmonia*® soit 54,1%.

Pour ce qui est des implants, deux marques se dégagent, il s'agit de *Jadelle*® (34,5%) et *Implanon NXT*® (18%).

Au niveau des préservatifs, trois marques sont régulièrement citées. La première est *Complice*® (31%) suivie de *Prudence*® (18,5%) puis de *Manix*® (16,8%).

Enfin, en ce qui concerne les contraceptifs d'urgence, *Pregnon1*® ressort comme la marque la plus largement utilisée avec plus de 76,4% des utilisatrices de contraceptif d'urgence.

Tableau 28: Marques de contraceptifs modernes les plus souvent utilisées par les femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural			
		Nombre	(%)	Nombre	(%)	Nombre	(%)
Quelle marque de contraceptif pilule utilisez-vous le plus souvent ?	Confiance	139	95,20	40	83,50	179	92,30
	Miniphase	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Minidril	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Depal	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Triella	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Diane 35	2	1,70	0	0,00	2	1,30
	Autre	1	0,70	2	4,10	3	1,60
	NSP/SR	3	2,30	6	12,30	9	4,80
	<b>Total</b>	146	100,00	48	100,00	194	100,00
Quelle marque de contraceptif injectable utilisez-vous le plus souvent ?	Harmonia	80	67,60	24	32,50	104	54,10
	Depo-provera	8	6,80	12	16,30	20	10,40
	Noristerat	0	0,00	6	7,70	6	3,00
	Sayana press	9	7,70	2	3,30	11	6,00
	Autre	0	0,30	1	1,90	2	0,90
	NSP/SR	21	17,60	28	38,30	49	25,60
Quelle marque de contraceptif implant utilisez-vous le plus souvent ?	Implanon	24	19,80	12	15,40	36	18,00
	Jadelle	53	44,20	16	20,00	69	34,50
	Autre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	NSP/SR	43	36,00	52	64,70	95	47,50
Quelle marque de contraceptif préservatif utilisez-vous le plus souvent ?	Prudence	13	20,80	0	2,10	13	18,50
	Fresh feeling	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Kama soutra	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Manix	11	18,20	1	6,80	12	16,80
	Présa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Gtm	2	3,20	0	0,00	2	2,80
	Condom générique	4	6,50	0	0,00	4	5,70
	Autre	8	13,20	0	0,00	8	11,60
	Complice	21	34,40	1	12,00	22	31,60
	NSP/SR	2	3,70	7	79,10	9	13,10

**Tableau 29: Marques de contraceptifs d'urgence les plus souvent utilisées par les femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
<b>Quelle marque de pilule de lendemain avez-vous utilisé le plus souvent ?</b>	<b>Lornevo</b>	10	14,70	0	0,00	10	12,80
	<b>Pregnon</b>	55	79,00	6	59,10	62	76,40
	<b>Levopred</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>LevoBD</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>Autre (préciser)</b>	4	6,30	4	40,90	9	10,80
	<b>Total</b>	70	100,00	11	100,00	81	100,00

### 6.3.5. Autres prestations reçues

Une faible proportion (12,7%) des utilisatrices de DIU ont bénéficié d'autres prestations lors de l'acquisition de cette méthode. Ces prestations complémentaires ont porté en particulier sur des examens d'urine et des consultations post-natales.

Pour les utilisatrices d'implants, seulement 11,6% d'entre elles ont bénéficié de prestations complémentaires notamment pour les conseils et dépistage du VIH et pour les consultations post-natales.

En ce qui concerne les injectables, 17,6% des utilisatrices ont bénéficié d'autres prestations dont les Conseils et dépistage du VIH et des consultations post-natales.

Sur les l'ensemble des utilisatrices des pilules, 13,2% ont bénéficié de prestations complémentaires notamment des examens de sang et test de grossesse et des conseils et dépistage du VIH.

Enfin, une très faible part (1,7%) des utilisatrices de contraceptifs d'urgence ont reçu d'autres prestations. Il s'agit en particulier de conseils et dépistage du VIH.

**Tableau 30: Autres prestations reçues par les femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence, utilisatrices de méthodes contraceptives modernes**

DIU	Milieu de résidence		Ensemble
	Périurbain	Rural	Ensemble
	Périurbain (N=14)	Rural (N=3)	Ensemble (N=17)
Lorsque vous avez obtenu votre méthode actuelle, avez-vous reçu en même temps d'autres services de la part du prestataire ?	14,0	0,0	12,7
Conseils et dépistage du VIH	0,0	100,0	7,7
Dépistage et traitement des IST	0,0	0,0	0,0
Dépistage de la tuberculose	0,0	22,2	9,5
Vaccination des enfants	0,0	7,2	3,9
Service d'avortement/soins post-avortement	0,0	7,7	4,0
Dépistage nutritionnel pour les enfants	0,0	0,0	0,0
Autre (examen d'urine)	100,0	43,9	67,9
Consultations post-natales	0,0	100,0	57,2
<b>Implants</b>	<b>Périurbain (N=67)</b>	<b>Rural (N=79)</b>	<b>Ensemble (N=146)</b>
Lorsque vous avez obtenu votre méthode actuelle, avez-vous reçu en même temps d'autres services de la part du prestataire ?	10,9	12,6	11,6

Conseils et dépistage du VIH	44,4	87,6	67,0
Dépistage et traitement des IST	0,0	36,8	19,2
Dépistage de la tuberculose	0,0	28,7	15,0
Vaccination des enfants	0,0	34,4	17,9
Service d'avortement/soins post-avortement	0,0	28,7	15,0
Dépistage nutritionnel pour les enfants	0,0	34,4	17,9
Autre	36,1	31,5	33,7
Consultations post-natales	34,3	49,1	42,1
<b>Injectables</b>	<b>Périurbain (N=90)</b>	<b>Rural (N=75)</b>	<b>Ensemble (N=165)</b>
Lorsque vous avez obtenu votre méthode actuelle, avez-vous reçu en même temps d'autres services de la part du prestataire ?	16,6	20,3	17,6
Conseils et dépistage du VIH	61,8	81,8	69,1
Dépistage et traitement des IST	2,9	19,8	9,0
Dépistage de la tuberculose	0,0	22,6	8,2
Vaccination des enfants	13,3	22,6	16,7
Service d'avortement/soins post-avortement	0,0	25,5	9,2
Dépistage nutritionnel pour les enfants	8,6	25,5	14,7
Autre	24,6	20,8	23,2
Consultations post-natales	30,6	41,8	34,7
<b>Pilule</b>	<b>Périurbain (N=101)</b>	<b>Rural (N=64)</b>	<b>Ensemble (N=165)</b>
Lorsque vous avez obtenu votre méthode actuelle, avez-vous reçu en même temps d'autres services de la part du prestataire ?	13,1	13,7	13,2
Conseils et dépistage du VIH	26,4	77,7	41,1
Dépistage et traitement des IST	7,5	47,2	18,9
Dépistage de la tuberculose	3,2	34,9	12,3
Vaccination des enfants	9,5	49,8	21,1
Service d'avortement/soins post-avortement	0,0	26,1	7,5
Dépistage nutritionnel pour les enfants	0,0	12,5	2,7
Autre (examen de sang et test de grossesse)	43,0	29,4	40,0
Consultations post-natales	23,6	50,7	29,5
<b>Contraception d'urgence</b>	<b>Périurbain (N=23)</b>	<b>Rural (N=3)</b>	<b>Ensemble (N=26)</b>
Lorsque vous avez obtenu votre méthode actuelle, avez-vous reçu en même temps d'autres services de la part du prestataire ?	1,7	0,0	1,7
Conseils et dépistage du VIH	100,0	0,0	84,2
Dépistage et traitement des IST	0,0	0,0	39,2
Dépistage de la tuberculose	0,0	0,0	26,1
Vaccination des enfants	0,0	0,0	32,7
Service d'avortement/soins post-avortement	0,0	0,0	26,1
Dépistage nutritionnel pour les enfants	0,0	0,0	45,7
Autre	0,0	0,0	26,1
Consultations post-natales	0,0	0,0	32,7

## 6.4. Méthodes de contraception utilisées dans le passé

### 6.4.1. Chez les femmes de 25 à 35 ans en union

Dans l'ensemble, un peu moins d'une femme de 25 à 35 ans en union sur deux affirme avoir utilisé une méthode contraceptive dans le passé. Les méthodes les plus utilisées dans le passé

par les femmes de 25 à 35 ans en union font partie des méthodes modernes. Il s'agit notamment des pilules (31,3%), des injectables (28,3%) et des préservatifs masculins (17,5%).

Tableau 31: Méthodes de contraception utilisées dans le passé par les femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural			
		Nombre	(%)	Nombre	(%)	Nombre	(%)
Toute méthode	Non	527	45,00	406	66,30	933	52,30
	Oui	644	55,00	207	33,70	851	47,70
Stérilisation Féminine	Non	644	100,00	207	100,00	851	100,00
	Oui	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Stérilisation Masculine	Non	644	100,00	207	95,40	851	98,80
	Oui	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DIU	Non	641	99,50	205	99,10	845	99,40
	Oui	3	0,50	2	0,90	5	0,60
Implants	Non	594	92,30	243	94,80	837	93,00
	Oui	50	7,70	13	5,20	63	7,00
Injectables	Non	457	71,00	188	73,30	645	71,70
	Oui	187	29,00	68	26,70	255	28,30
Pilule	Non	437	67,90	181	70,60	618	68,70
	Oui	207	32,10	75	29,40	282	31,30
Contraception d'urgence	Non	571	88,60	201	78,30	771	85,70
	Oui	73	11,40	56	21,70	129	14,30
Préservatif masculin	Non	518	80,40	183	88,80	701	82,50
	Oui	126	19,60	23	11,20	149	17,50
Préservatif féminin	Non	630	97,80	207	100,00	836	98,30
	Oui	14	2,20	0	0,00	14	1,70
Mousse/gelée spermicide	Non	644	100,00	207	100,00	851	100,00
	Oui	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Méthode des jours fixes/collier du cycle	Non	608	94,30	193	93,30	800	94,10
	Oui	36	5,70	14	6,70	50	5,90
MAMA	Non	644	100,00	205	99,30	849	99,80
	Oui	0	0,00	1	0,70	1	0,20
Abstinence périodique (méthode rythmique)	Non	609	94,50	189	91,60	798	93,80
	Oui	35	5,50	17	8,40	53	6,20
Retrait	Non	635	98,70	207	100,00	842	99,00
	Oui	9	1,30	0	0,00	9	1,00
Autre méthode moderne	Non	639	99,20	206	99,80	845	99,30
	Oui	5	0,80	1	0,20	6	0,70
Autre méthode traditionnelle	Non	617	95,70	201	77,80	817	90,60
	Oui	27	4,30	57	22,20	85	9,40

#### 6.4.2. Chez leurs conjoints

Chez les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union, l'analyse montre que 42% des conjoints était favorable à l'utilisation de méthodes contraceptives par le passé. Ce qui montre

une baisse du désir d'utilisation des méthodes contraceptives dans leur couple relativement à la situation actuelle où la proportion se situe autour de 22%.

La méthode la plus prisée dans le passé par les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union et leurs partenaires est largement le préservatif masculin avec plus de 72% d'utilisation.

**Tableau 32: Méthodes de contraception utilisées dans le passé dans le couple par les femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence**

	Milieu de résidence		Ensemble (N=529)
	Périurbain(N=318)	Rural(N=211)	
Toute méthode	43,1	40,7	42,3
Stérilisation Féminine	0,0	0,3	0,1
Stérilisation Masculine	0,9	0,0	0,7
DIU	0,0	0,0	0,0
Implants	4,5	4,2	4,4
Injectables	13,4	9,6	12,2
Pilule	12,2	13,7	12,7
Contraception d'urgence	5,4	2,0	4,3
Préservatif masculin	73,8	69,0	72,3
Préservatif féminin	0,7	0,7	0,7
Mousse/gelée spermicide	0,5	0,8	0,6
Méthode des jours fixes/collier du cycle	6,5	7,0	6,6
MAMA	0,5	0,0	0,3
Abstinence périodique (méthode rythmique)	12,9	27,8	17,5
Retrait	4,1	2,5	3,6
Autre méthode moderne	0,0	0,0	0,0
Autre méthode traditionnelle	0,1	0,3	0,2

## 6.5. Raisons de non utilisation des méthodes contraceptives

### 6.5.1. Chez les femmes de 25 à 35 ans en union

Cette partie est consacrée aux femmes de 25 à 35 ans en union qui ne sont pas enceintes et qui n'utilisent aucune méthode actuellement et qui ne veulent pas tomber enceinte dans un futur proche.

L'analyse des raisons qui justifient leur non utilisation des méthodes contraceptives fait ressortir des raisons liées à la fécondité notamment le fait d'allaiter (17,3%) et la faible fréquence des rapports sexuels (7,4%). Par contre, les raisons liées à l'opposition à l'utilisation des moyens contraceptifs, le manque de connaissances sur ces moyens et les raisons liées aux moyens contraceptifs, sont faiblement évoquées. Les raisons de non utilisation semblent être des raisons spécifiques et personnelles à chacune des femmes qui se manifestent par une proportion élevée de la modalité autre (10,5%).

**Tableau 33: Raisons de non utilisation des méthodes contraceptives chez les femmes de 25 à 35 ans en union qui ne souhaitent pas avoir un enfant dans un futur proche selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural			
		Nombre	(%)	Nombre	(%)	Nombre	(%)
Pas mariée	Non	623	95,90	286	87,20	909	93,00
	Oui	26	4,10	42	12,80	68	7,00
<b>Raisons liées à la fertilité</b>							
N'a pas de rapports sexuels	Non	638	98,20	323	98,50	961	98,30
	Oui	12	1,80	5	1,50	17	1,70
Rapports sexuels peu fréquents	Non	598	92,00	304	80,50	902	87,80
	Oui	52	8,00	24	6,40	76	7,40
Ménopausée/hystérectomie	Non	649	99,90	327	86,60	976	95,00
	Oui	1	0,10	1	0,20	2	0,20
Ne peut pas tomber enceinte	Non	650	100,00	326	86,20	975	94,90
	Oui	0	0,00	2	0,60	2	0,20
N'a pas eu de règles depuis la naissance de son dernier enfant	Non	636	97,80	324	85,70	959	93,40
	Oui	14	2,20	4	1,10	18	1,80
Allaite	Non	545	83,90	263	80,30	808	82,70
	Oui	105	16,10	65	19,70	169	17,30
Dépend de dieu/fatalisme	Non	607	93,40	295	77,80	902	87,70
	Oui	43	6,60	33	8,60	76	7,30
<b>Opposition à leur utilisation</b>							
Opposition de la personne interrogée	Non	627	96,50	314	82,90	941	91,50
	Oui	23	3,50	39	10,40	62	6,10
Opposition du mari/partenaire	Non	626	96,30	303	92,40	929	95,00
	Oui	24	3,70	25	7,60	49	5,00
Opposition de la belle-mère	Non	629	96,90	311	94,80	940	96,20
	Oui	20	3,10	17	5,20	37	3,80
Opposition d'autres personnes	Non	648	99,80	326	99,40	975	99,70
	Oui	1	0,20	2	0,60	3	0,30
Interdiction religieuse	Non	650	100,00	328	100,00	978	100,00
	Oui	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Manque de connaissances</b>							
Ne connaît aucune méthode	Non	650	100,00	326	99,30	975	99,80
	Oui	0	0,00	2	0,70	2	0,20
Ne connaît aucune source	Non	645	99,30	327	99,70	972	99,40
	Oui	5	0,70	1	0,30	6	0,60
<b>Raisons liées à la méthode</b>							
Effets secondaires/problèmes de santé	Non	621	95,50	318	96,90	939	96,00
	Oui	29	4,50	10	3,10	39	4,00
Manque d'accès/trop éloigné	Non	649	99,90	324	98,90	973	99,60
	Oui	1	0,10	4	1,10	4	0,40
Coût trop élevé	Non	648	99,80	325	99,00	973	99,50
	Oui	1	0,20	3	1,00	5	0,50

<b>Méthode préférée pas disponible</b>	<b>Non</b>	650	100,00	328	100,00	978	100,00
	<b>Oui</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Aucune méthode disponible</b>	<b>Non</b>	650	100,00	327	99,60	976	99,90
	<b>Oui</b>	0	0,00	1	0,40	1	0,10
<b>Pas pratique à utiliser</b>	<b>Non</b>	647	99,50	328	100,00	975	99,70
	<b>Oui</b>	3	0,50	0	0,00	3	0,30
<b>Entrave les processus naturels de l'organisme</b>	<b>Non</b>	633	97,40	327	99,70	960	98,20
	<b>Oui</b>	17	2,60	1	0,30	18	1,80
<b>Autre</b>	<b>Non</b>	590	90,80	285	86,90	875	89,50
	<b>Oui</b>	60	9,20	43	13,10	103	10,50
<b>Ne sait pas</b>	<b>Non</b>	637	98,10	320	97,50	957	97,90
	<b>Oui</b>	13	1,90	8	2,50	21	2,10

### 6.5.2. Chez leurs conjoints

Les conjoints concernés par cette partie sont ceux dont la femme n'est pas enceinte actuellement, qui ne veulent pas avoir un enfant bientôt mais n'utilisent aucune méthode contraceptive actuellement.

Il ressort que, dans la même veine que leurs conjointes, les hommes évoquent en particulier des raisons très spécifiques à chaque répondant d'où un choix relativement élevé de la modalité autre, soit plus de 28%. Par ailleurs, ceux-ci évoquent, à un degré moindre (8,6%), que le fait que des rapports sexuels aboutissent à une grossesse dépend uniquement de Dieu.

**Tableau 34: Raisons de non utilisation des méthodes contraceptives dans le couple selon les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union qui ne souhaitent pas avoir un enfant dans un futur proche selon le milieu de résidence**

	Milieu de résidence		Ensemble(N=85)
	Périurbain (N=46)	Rural(N=39)	
Pas marié	0,0	7,2	2,2
<b>Raisons liées à la fertilité</b>			
N'a pas de rapports sexuels	0,0	0,0	0,0
Rapports sexuels peu fréquent	5,2	0,0	3,6
Ménopausée/hystérectomie	0,0	0,0	0,0
Ne peut pas enceinter	0,0	0,0	0,0
N'a pas eu de règles depuis la naissance de son dernier enfant	0,0	0,0	0,0
Allaite	1,9	0,0	1,3
Dépend de dieu/fatalisme	10,1	5,2	8,6
<b>Opposition à leur utilisation</b>			
Opposition de la personne interrogée	0,3	5,0	1,8
Opposition du mari/partenaire	0,0	0,9	0,3
Opposition de la belle-mère	0,0	0,0	0,0
Opposition d'autres personnes	0,0	5,0	1,5
Interdiction religieuse	0,0	0,0	0,0
<b>Manque de connaissances</b>			
Ne connaît aucune méthode	0,0	2,2	0,7
Ne connaît aucune source	0,0	0,0	0,0
<b>Raisons liées à la méthode</b>			
Effets secondaires/problèmes de santé	1,2	3,2	1,8
Manque d'accès/trop éloigné	0,0	2,2	0,7

Coût trop élevé	1,2	0,0	0,8
Méthode préférée pas disponible	0,0	0,0	0,0
Aucune méthode disponible	0,0	0,6	0,2
Pas pratique à utiliser	0,0	0,0	0,0
Entrave les processus naturels de l'organisme	0,0	1,3	0,4
Autre	28,2	27,9	28,1
Ne sait pas	0,0	0,0	0,0

## 6.6. Intentions d'utilisation des méthodes contraceptives dans le futur

### 6.6.1. Chez les femmes de 25 à 35 ans en union

Plus de la moitié des femmes de la population cible ont l'intention d'utiliser une méthode contraceptive dans le futur. Deux tiers de celles qui ont l'intention d'en utiliser dans le futur affirment qu'elles le feront dans les 12 prochains mois. Ainsi, dans les 12 prochains mois, les méthodes que ces femmes ont le plus l'intention d'utiliser sont respectivement les implants (26,7%), les injectables (26,4%) et la pilule (25,6%).

Tableau 35: Intention d'utilisation des méthodes contraceptives chez les femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence dans le futur

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	()
		Nombre	()	Nombre	()		
<b>Pensez-vous que vous utiliserez une méthode contraceptive dans le futur ?</b>	<b>Non</b>	375	29,30	273	39,80	649	33,00
	<b>Oui</b>	703	54,90	295	42,90	997	50,70
	<b>Ne sait pas</b>	203	15,80	119	17,30	322	16,40
<b>Pensez-vous que vous utiliserez une méthode contraceptive dans les 12 prochains ?</b>	<b>Non</b>	179	25,40	61	20,70	240	24,00
	<b>Oui</b>	495	70,40	223	75,70	718	72,00
	<b>Ne sait pas</b>	30	4,20	10	3,50	40	4,00
<b>Quelles méthodes pensez-vous que vous utiliserez ?</b>							
<b>Stérilisation Féminine</b>	<b>Non</b>	493	99,70	223	100,00	716	99,80
	<b>Oui</b>	2	0,30	0	0,00	2	0,20
<b>Stérilisation Masculine</b>	<b>Non</b>	495	100,00	223	100,00	718	100,00
	<b>Oui</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>DIU</b>	<b>Non</b>	464	93,90	222	99,40	686	95,60
	<b>Oui</b>	30	6,10	1	0,60	32	4,40
<b>Implants</b>	<b>Non</b>	383	77,40	143	64,10	526	73,30
	<b>Oui</b>	112	22,60	80	35,90	192	26,70
<b>Injectables</b>	<b>Non</b>	376	76,00	152	68,10	528	73,60
	<b>Oui</b>	118	24,00	71	31,90	190	26,40
<b>Pilule</b>	<b>Non</b>	362	73,10	172	77,20	534	74,40
	<b>Oui</b>	133	26,90	51	22,80	184	25,60
<b>Contraception d'urgence</b>	<b>Non</b>	462	93,30	221	99,20	683	95,10
	<b>Oui</b>	33	6,70	2	0,80	35	4,90
<b>Préservatif masculin</b>	<b>Non</b>	453	91,60	221	99,20	674	93,90
	<b>Oui</b>	42	8,40	2	0,80	43	6,10
<b>Préservatif féminin</b>	<b>Non</b>	495	100,00	223	99,70	717	99,90

	<b>Oui</b>	0	0,00	1	0,30	1	0,10
<b>Mousse/gelée spermicide</b>	<b>Non</b>	495	100,00	223	100,00	718	100,00
	<b>Oui</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Méthode des jours fixes/collier du cycle</b>	<b>Non</b>	468	94,60	221	99,10	689	96,00
	<b>Oui</b>	27	5,40	2	0,90	29	4,00
<b>MAMA</b>	<b>Non</b>	495	100,00	223	100,00	718	100,00
	<b>Oui</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Abstinence périodique (méthode rythmique)</b>	<b>Non</b>	477	96,40	212	95,00	689	96,00
	<b>Oui</b>	18	3,60	11	5,00	29	4,00
<b>Retrait</b>	<b>Non</b>	490	99,00	221	99,20	711	99,10
	<b>Oui</b>	5	1,00	2	0,80	7	0,90
<b>Autre méthode moderne</b>	<b>Non</b>	494	99,80	222	99,40	716	99,70
	<b>Oui</b>	1	0,20	1	0,60	2	0,30
<b>Autre méthode traditionnelle</b>	<b>Non</b>	492	99,40	222	99,60	714	99,50
	<b>Oui</b>	3	0,60	1	0,40	4	0,50

### 6.6.2. Chez leurs conjoints

Chez les conjoints, environ trois sur dix désirent que leurs conjointes utilisent une méthode contraceptive dans le couple, dans le futur. Parmi ceux-ci, 72,5% estiment que leurs conjointes utiliseront une méthode contraceptive dans les 12 prochains mois. Leur choix se porte pour l'essentiel sur le préservatif masculin (50,3%).

**Tableau 36: Intention d'utilisation des méthodes contraceptives dans le couple chez les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence dans le futur**

	Milieu de résidence		Ensemble (N=1 297)
	Périurbain(N=698)	Rural(N=599)	
<b>Pensez-vous que vous utiliserez une méthode contraceptive dans le futur ?</b>			
Oui	28,9	30,4	29,4
<b>Pensez-vous que vous utiliserez une méthode contraceptive dans les 12 prochains mois ?</b>			
Oui	72,8	71,9	72,5
<b>Quelles méthodes pensez-vous que vous utiliserez ?</b>			
DIU	2,1	1,7	1,9
Implants	9,7	21,4	13,5
Injectables	13,6	15,4	14,2
Pilule	13,7	18,8	15,3
Contraception d'urgence	2,7	0,0	1,8
Préservatif masculin	57,0	36,4	50,3
Préservatif féminin	0,0	1,0	0,3
Mousse/gelée spermicide	0,0	0,0	0,0
Méthode des jours fixes/collier du cycle	4,0	0,0	2,7
MAMA	0,0	0,0	0,0
Abstinence périodique (méthode rythmique)	5,9	14,3	8,7
Autre	0,9	0,0	0,6

## 6.7. Derniers rapports sexuels chez les hommes et utilisation de préservatifs

Les conjoints des femmes de notre population cible ont été très actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois. Ainsi, neuf conjoints sur dix ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois. La majorité d'entre eux (73,8%) ont déclaré avoir eu leurs rapports sexuels des 12 derniers mois avec une partenaire. Toutefois, on note près de 23% qui ont eu au moins deux partenaires au cours des 12 derniers mois en particulier en milieu rural où la proportion est autour du tiers d'entre eux. En outre, seulement 8,9% de ceux qui ont eu au moins un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois ont utilisé un condom. De plus, la proportion de ceux qui ont au moins deux partenaires au cours des 12 derniers mois et qui ont utilisé un condom au cours du dernier rapport sexuel s'élève à 16,2% et est encore plus faible en milieu rural avec 11%. Le faible recours au condom peut cependant s'expliquer par le fait que l'essentiel des rapports ont eu lieu soit avec les épouses (74,6%) ou des partenaires vivant avec eux (20,6%).

D'un autre côté, moins de 20% des conjoints ont eu un autre rapport sexuel en dehors du dernier et parmi ceux-ci le recours à l'utilisation du condom est relativement plus élevé avec une proportion de plus de 42%. Ils présentent également la spécificité d'avoir eu comme partenaire une proportion plus élevée soit plus de la moitié avec des petites amies ne résidant pas avec eux soit des partenaires occasionnelles.

**Tableau 37: Dernier rapport au cours des 12 derniers mois chez les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence**

	Milieu de résidence		Ensemble (N=1 305)
	Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
<b>Temps depuis le dernier rapport</b>			
Moins d'un an	98,8	98,3	98,6
1 an et plus	1,2	1,7	1,4
<b>En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ?</b>			
0	6,8	2,3	5,3
1	78,1	64,9	73,8
2	13,5	28,7	18,4
3 et plus	1,7	4,1	2,4
<b>Un condom a été utilisé la dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois</b>			
Oui	10,1	6,6	8,9
Non	89,7	93,4	90,9
Ne sait pas	0,2	0,0	0,1
<b>Conjoint ayant au moins deux partenaires sexuelles au cours des 12 derniers mois et ayant utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel</b>			
Oui	21,5	11,0	16,2
<b>Quelle était votre relation avec cette personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels lors du dernier rapport sexuel des 12 derniers mois</b>			
Épouse	73,4	77,2	74,6
Partenaire vivant avec enquêté	22,0	17,8	20,6
Petite amie ne vivant pas avec l'enquêté	3,4	4,1	3,6
Rencontre occasionnelle	1,3	0,9	1,2
Professionnel du sexe/ cliente	0,0	0,0	0,0
Autres à préciser	0,0	0,0	0,0

**Tableau 38: Avant dernier rapport au cours des 12 derniers mois chez les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence**

	Milieu de résidence		Ensemble (N=1 305)
	Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
<b>À part cette personne (partenaire) avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre au cours des 12 derniers mois</b>			
Oui	15,4	27,6	19,3
Non	84,6	72,4	80,7
<b>Un condom a été utilisé ?</b>			
Oui	49,4	34,7	42,7
Non	50,6	65,3	57,3
Ne sait pas	0,0	0,0	0,0
<b>Quelle était votre relation avec cette seconde personne ?</b>			
Épouse	37,2	40,7	38,8
Partenaire vivant avec enquêté	2,5	10,3	6,1
Petite amie ne vivant pas avec l'enquêté	37,0	40,8	38,7
Rencontre occasionnelle	21,6	4,4	13,7
Professionnel du sexe/ cliente	0,4	0,0	0,2
Autres à préciser	1,2	3,8	2,4

---

## **CHAPITRE 7 : OPPORTUNITES, CAPACITES ET MOTIVATIONS EN MATIERE D'UTILISATION DE CONTRACEPTIFS**

---

### **7.1. Facteurs d'opportunités et disponibilité**

Les facteurs d'opportunité se rapportent à la disponibilité des produits contraceptifs, des conseils et des personnes ressources en matière de PF dans l'environnement immédiat des populations.

Ainsi dans les zones d'intervention 74,6% des femmes en union de 25-35 ans ont affirmé qu'on peut trouver facilement les pilules. En milieu péri-urbain, cette proportion est de 82,1% contre 59,2% en milieu rural.

Pour les contraceptifs injectables 71,4% des femmes en union de 25-35 ans dans les zones d'intervention ont affirmé qu'on peut les trouver facilement. En milieu peri-urbain cette proportion est 77,7%, largement supérieur à la proportion des femmes en union de 25-35 ans, en milieu rural qui est de 57,7%.

Dans l'ensemble, la proportion de femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et peri-urbain dans les zones d'intervention qui ont affirmé qu'on peut trouver facilement les DIU, est de 65,6%. Cette proportion est légèrement supérieure en milieu péri-urbain et est de 70,7%. En milieu rural par contre, ce sont 46,5% des femmes en union de 25-35 qui ont affirmé qu'il est facile de trouver les DIU dans leur environnement.

Tableau 39: Disponibilité des méthodes contraceptives selon les femmes de 25 à 35 ans en union et selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
<b>Je connais un endroit dans ma communauté/village/quartier où l'on peut se procurer des contraceptifs</b>	<b>Non</b>	235	18,50	240	36,70	475	24,70
	<b>Oui</b>	1004	79,10	407	62,20	1411	73,30
	<b>NSP</b>	31	2,40	7	1,10	38	2,00
	<b>Total</b>	1270	100,00	655	100,00	1924	100,00
<b>Il est facile de trouver des contraceptifs dans ma communauté.</b>	<b>Non</b>	225	17,70	275	42,00	500	26,00
	<b>Oui</b>	983	77,40	358	54,60	1341	69,70
	<b>NSP</b>	61	4,80	22	3,30	83	4,30
<b>Il est facile de trouver des condoms dans ma communauté/village/quartier</b>	<b>Non</b>	130	10,50	206	33,50	336	18,20
	<b>Oui</b>	1067	86,30	387	62,80	1454	78,50
	<b>NSP</b>	39	3,20	23	3,70	62	3,40
<b>Il est facile de trouver des pilules dans ma communauté/village/quartier</b>	<b>Non</b>	174	14,10	233	39,20	407	22,30
	<b>Oui</b>	1014	82,10	352	59,20	1365	74,60
	<b>NSP</b>	47	3,80	10	1,60	57	3,10
<b>Il est facile de trouver des Injectables dans ma communauté/village/quartier</b>	<b>Non</b>	204	17,90	212	40,10	416	24,90
	<b>Oui</b>	886	77,70	306	57,70	1192	71,40
	<b>NSP</b>	51	4,40	11	2,20	62	3,70
<b>Il est facile de trouver des Contraceptif d'Urgence (CU) dans ma communauté/village/quartier</b>	<b>Non</b>	105	13,90	78	45,00	184	19,70
	<b>Oui</b>	615	81,10	88	50,40	703	75,40
	<b>NSP</b>	38	5,00	8	4,60	46	4,90
<b>Il est facile de trouver des stérilets (DIU) dans ma communauté/village/quartier</b>	<b>Non</b>	93	20,50	60	50,10	153	26,70
	<b>Oui</b>	319	70,70	56	46,50	375	65,60
	<b>NSP</b>	39	8,70	4	3,50	44	7,60
<b>Il est facile de trouver des condoms Prudence dans ma communauté/village/quartier</b>	<b>Non</b>	148	12,00	216	35,00	364	19,70
	<b>Oui</b>	1024	82,80	366	59,40	1390	75,00
	<b>NSP</b>	64	5,20	35	5,60	99	5,30
<b>Il est facile de trouver la pilule Confiance dans ma communauté/village/quartier</b>	<b>Non</b>	189	15,30	237	39,80	425	23,20
	<b>Oui</b>	966	78,20	329	55,30	1295	70,80
	<b>NSP</b>	80	6,50	29	4,90	109	6,00
<b>Il est facile de trouver l'injectables Harmonia dans ma communauté/village/quartier</b>	<b>Non</b>	232	20,30	237	44,80	469	28,10
	<b>Oui</b>	765	67,10	241	45,60	1006	60,30
	<b>NSP</b>	144	12,60	51	9,60	195	11,70
<b>Il est facile de trouver le Contraceptif d'Urgence (CU) Pregnon dans ma communauté/village/quartier</b>	<b>Non</b>	114	15,00	78	44,60	192	20,60
	<b>Oui</b>	599	79,00	85	48,70	684	73,30
	<b>NSP</b>	45	6,00	12	6,60	57	6,10

## 7.2. Connaissances en matière d'utilisation des méthodes contraceptives

Le niveau de connaissance d'une méthode contraceptive est un gage de son utilisation appropriée. Dans l'optique de mesurer le niveau de connaissance des femmes en union de 25-35 ans au sujet des méthodes contraceptives modernes, il leur a été demandé, pour chaque type de méthode, si elles en avaient entendu parler.

Dans l'ensemble, 97,6% des femmes en union de 25-35 ans ont entendu parler de n'importe quelles méthodes contraceptives, qu'elles soient traditionnelles ou moderne. Cette proportion est de 98,9% en milieu péri-urbain contre 95,3% en milieu rural.

Pour ce qui concerne spécifiquement les méthodes contraceptives modernes, ce sont 97,5% des femmes en union de 25-35 ans qui en ont entendu parler. En milieu péri-urbain, cette proportion est de 98,9% contre 95% en milieu rural. Parmi les méthodes contraceptives modernes, le préservatif masculin (93,4%), les pilules (92,8%), les implants (84%) et les contraceptifs injectables (84,8%) sont les plus connus par les femmes en union de 25-35 ans qui ont été interrogées et cela quel que soit le milieu (péri-urbain ou rural).

Tableau 40: Connaissance en matière d'utilisation des méthodes contraceptives des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
Connaissance de n'importe quelle méthode de contraception	Non	14	1,10	35	4,70	49	2,40
	Oui	1270	98,90	704	95,30	1974	97,60
	Total	1284	100,00	739	100,00	2023	100,00
Connaissance d'une méthode moderne de contraception	Non	14	1,10	37	5,00	51	2,50
	Oui	1270	98,90	702	95,00	1972	97,50
Avez-vous entendu parler de Stérilisation féminine	Non	935	72,80	630	85,20	1565	77,40
	Oui	349	27,20	109	14,80	458	22,60
Avez-vous entendu parler de Stérilisation masculine	Non	1071	83,40	667	90,30	1738	85,90
	Oui	213	16,60	71	9,70	285	14,10
Avez-vous entendu parler de DIU	Non	833	64,80	605	81,90	1437	71,10
	Oui	451	35,20	134	18,10	586	28,90
Avez-vous entendu parler de Injectables	Non	144	11,20	164	22,20	308	15,20
	Oui	1141	88,80	575	77,80	1715	84,80
Avez-vous entendu parler de Implants	Non	142	11,10	181	24,50	323	16,00
	Oui	1142	88,90	558	75,50	1699	84,00
Avez-vous entendu parler de Pilule	Non	49	3,80	97	13,10	146	7,20
	Oui	1235	96,20	642	86,90	1876	92,80
Avez-vous entendu parler de Préservatif masculin	Non	49	3,80	84	11,40	134	6,60
	Oui	1235	96,20	654	88,60	1889	93,40
Avez-vous entendu parler de Préservatif féminin	Non	387	30,20	376	51,00	764	37,80
	Oui	897	69,80	362	49,00	1259	62,20
Avez-vous entendu parler de Méthode des Jours Fixes (Collier du Cycle)	Non	835	65,00	632	85,50	1467	72,50
	Oui	449	35,00	107	14,50	556	27,50
Avez-vous entendu parler de Méthode de Contraception d'urgence/Pilule du lendemain	Non	526	41,00	550	74,50	1076	53,20
	Oui	758	59,00	188	25,50	946	46,80
Connaissance d'une méthode traditionnelle de contraception	Non	357	27,80	407	55,00	764	37,80
	Oui	927	72,20	332	45,00	1259	62,20

<b>Avez-vous entendu parler d'Abstinence périodique</b>	<b>Non</b>	518	40,30	483	65,40	1001	49,50
	<b>Oui</b>	766	59,70	256	34,60	1022	50,50
<b>Avez-vous entendu parler de Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée</b>	<b>Non</b>	1008	78,50	659	89,20	1666	82,40
	<b>Oui</b>	276	21,50	80	10,80	356	17,60
<b>Avez-vous entendu parler de Méthode de Retrait (coït interrompu)</b>	<b>Non</b>	625	48,70	548	74,10	1173	58,00
	<b>Oui</b>	659	51,30	191	25,90	850	42,00
<b>Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes que les femmes ou les homme</b>	<b>Non</b>	1229	95,70	712	96,40	1941	96,00
	<b>Oui</b>	55	4,30	27	3,60	81	4,00



### **7.3. Facteurs de Capacité**

La capacité se rapporte au pouvoir, à l'aptitude à accomplir une tâche nécessitant une compétence nécessaire, qu'elle soit physique ou abstraite. Dans le cadre de cette étude, les facteurs de capacité sont relatifs aux aptitudes et compétences nécessaires à un individu pour utiliser une méthode moderne de contraception. Il s'agira donc de mettre en exergue la connaissance, l'efficacité personnelle et le soutien social.

- Efficacité personnelle
  1. des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et peri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'elles sont capables d'utiliser une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée
  2. des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et peri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'elles peuvent parler de l'utilisation d'une méthode moderne de planification familiale à leur conjoint pour éviter une grossesse non désirée
- Soutien social
  3. des conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et périurbain dans les zones d'intervention qui sont d'accord pour encourager leurs épouses dans la décision d'adopter une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée (Phase V) ;
  4. des conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et periurbain dans les zones d'intervention qui discutent de la planification familiale dans leur couple ;
  5. des femmes dans les régions du projet (PRSS) qui affirme que leur conjoint les encourageraient si elle décide de se faire suivre par un agent de santé qualifié au centre de santé pendant leur grossesse et leur accouchement.

#### **7.3.1. Connaissance approfondie des moyens de contraception**

- Chez les femmes de 25 à 35 ans en union

L'analyse des niveaux de connaissance des méthodes contraceptives montre que parmi les femmes de 25-35 ans en union qui ont entendu parlé des préservatifs, une grande proportion en ont une connaissance approfondie. Ainsi, 93,2% d'entre elles savent que le port du préservatif masculin avant des rapports sexuels permet de prévenir une grossesse contre 77,6% pour le port du préservatif féminin. Cette proportion est de 94,2% en milieu péri-urbain contre 90% en milieu rural pour ce qui concerne le préservatif masculin. En outre, une grande majorité (93%) de ces femmes ayant entendu parlé des préservatifs savent qu'ils protègent contre les infections sexuellement transmissibles lorsqu'ils sont utilisés correctement.

En ce qui concerne les injectables, les femmes de 25-35 ans en union qui en ont entendu parlé, savent entre autre qu'il doivent être prescrits par un prestataire de santé (95,1%) et qu'ils ne protègent pas des IST (72%).

Pour les femmes de la population cible, qui ont entendu parler des pilules, 89% d'entre elles ont connaissance qu'elles doivent être prescrites par un agent de santé. Sensiblement dans la même proportion, 89% des femmes de la population cible qui ont entendu parler des pilules savent que leur prise est quotidienne.

Concernant le DIU, un peu plus de la moitié des femmes de la population cible qui en ont entendu parler (58,6%), savent qu'il est presque aussi efficace que la stérilisation. 64,1% de ces femmes pensent qu'il peut prévenir les grossesses pendant une longue durée (10 ans) et être utilisé pendant l'allaitement (56,6%).

Tableau 42: Connaissance approfondie des méthodes contraceptives par les femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
<b>MÉTHODES À COURT TERME : PRÉSERVATIF</b>							
Un homme peut mettre un préservatif masculin avant d'avoir des rapports sexuels pour prévenir une grossesse	FAUX	45	3,60	73	11,90	118	6,40
	VRAI	1160	93,80	525	85,20	1685	91,00
	NSP	31	2,50	17	2,80	49	2,60
	Total	1236	100,00	616	100,00	1852	100,00
Une femme peut mettre un préservatif féminin avant d'avoir des rapports sexuels pour prévenir une grossesse	FAUX	100	8,10	120	19,60	220	11,90
	VRAI	1000	80,90	398	64,60	1398	75,50
	NSP	136	11,00	97	15,80	234	12,60
Vous n'avez pas besoin d'une ordonnance ou d'un examen médical pour obtenir des préservatifs.	FAUX	57	4,60	56	9,10	113	6,10
	VRAI	1145	92,60	530	86,00	1674	90,40
	NSP	34	2,80	30	4,90	64	3,50
Les préservatifs doivent être utilisés pendant toute la durée de la relation sexuelle pour être d'une plus grande efficacité.	FAUX	100	8,10	93	15,20	193	10,40
	VRAI	1067	86,30	465	75,50	1532	82,70
	NSP	70	5,60	58	9,30	127	6,90
Les préservatifs protègent contre les infections sexuellement transmissibles lorsqu'ils sont utilisés correctement.	FAUX	41	3,40	47	7,60	88	4,80
	VRAI	1172	94,80	549	89,20	1721	92,90
	NSP	23	1,90	20	3,20	43	2,30
<b>INJECTABLES</b>							
Le contraceptif injectable doit être prescrit par un prestataire de santé.	FAUX	15	1,30	5	0,90	20	1,20
	VRAI	1083	94,90	512	96,70	1594	95,50
	NSP	43	3,70	13	2,40	56	3,30
Les contraceptifs injectables doivent être administrés tous les 2 mois ou tous les 3 mois	FAUX	50	4,40	31	5,90	82	4,90
	VRAI	931	81,60	457	86,30	1388	83,10
	NSP	159	13,90	41	7,80	200	12,00
Les contraceptifs injectables ne protègent pas les femmes contre les IST	FAUX	149	13,10	109	20,60	258	15,50
	VRAI	850	74,50	363	68,60	1213	72,70
	NSP	141	12,40	57	10,80	198	11,90
L'effet secondaire le plus courant est un saignement irrégulier pendant les premiers mois.	FAUX	218	19,10	115	21,70	333	19,90
	VRAI	580	50,90	288	54,40	868	52,00
	NSP	342	30,00	127	23,90	469	28,10
Les femmes peuvent de nouveau tomber enceintes quelques mois après la dernière injection	FAUX	144	12,60	86	16,20	230	13,80
	VRAI	854	74,90	390	73,70	1244	74,50
	NSP	142	12,50	54	10,10	196	11,70
<b>CONTRACEPTION ORALE REGULIERE</b>							
La première prescription de pilule doit être faite par un prestataire de santé.	FAUX	105	8,50	32	5,40	137	7,50
	VRAI	1100	89,10	539	90,80	1639	89,60
	NSP	30	2,40	23	3,90	53	2,90
La pilule doit être prise chaque jour.	FAUX	62	5,00	36	6,10	99	5,40
	VRAI	1106	89,50	509	85,60	1614	88,30
	NSP	67	5,40	49	8,30	116	6,30
La fertilité revient habituellement dans les trois mois après l'arrêt de la pilule	FAUX	124	10,00	86	14,50	210	11,50
	VRAI	978	79,20	444	74,80	1423	77,80
	NSP	133	10,80	64	10,70	197	10,70
Après la première consultation auprès d'un agent de santé, les femmes peuvent se réapprovisionner en pilules dans	FAUX	56	4,50	57	9,60	113	6,20
	VRAI	1127	91,30	487	82,00	1614	88,20

les centres de santé/Pharmacie/dépôt de leur localité sans avoir à revenir à la clinique chaque mois.	NSP	52	4,20	50	8,40	102	5,60
	FAUX	137	11,10	112	18,80	248	13,60
La pilule ne protège pas les femmes contre les IST.	VRAI	994	80,50	424	71,30	1418	77,50
	NSP	104	8,40	59	9,90	163	8,90
<b>MÉTHODES À LONG TERME : DIU</b>							
Le DIU peut être utilisé pendant l'allaitement.	FAUX	46	10,30	23	18,80	69	12,10
	VRAI	277	61,40	55	45,60	332	58,10
	NSP	128	28,30	43	35,60	171	29,80
Le DIU peut prévenir les grossesses pendant une longue durée (10 ans).	FAUX	40	8,90	17	14,20	57	10,00
	VRAI	295	65,30	78	65,10	373	65,30
	NSP	116	25,80	25	20,70	141	24,70
Après le retrait du DIU, la femme peut à nouveau tomber enceinte et avoir des enfants	FAUX	38	8,30	17	13,90	54	9,50
	VRAI	361	80,00	81	67,70	443	77,40
	NSP	52	11,60	22	18,50	75	13,10
Le DIU est inséré dans l'utérus par un agent de santé	FAUX	15	3,40	10	8,60	26	4,50
	VRAI	403	89,30	90	74,70	493	86,20
	NSP	33	7,30	20	16,70	53	9,30
Le DIU est presque aussi efficace que la stérilisation.	FAUX	68	15,10	21	17,80	90	15,70
	VRAI	276	61,10	64	53,10	340	59,40
	NSP	107	23,80	35	29,10	142	24,90

- Chez leurs conjoints

Parmi les conjoints des femmes de 25-35 ans qui ont entendu parlé des préservatifs, 95,3% d'entre eux savent que mettre un préservatif masculin avant d'avoir des rapports sexuels permet de prévenir une grossesse. Ils sont dans une proportion d'environ 92% à savoir que les préservatifs protègent contre les infections sexuellement transmissibles lorsqu'ils sont utilisés correctement.

En ce qui concerne les injectables, environ 78% des conjoints des femmes de 25-35 ans qui en ont entendu parler savent qu'ils ne protègent pas les femmes contre les IST. Cependant, moins de la moitié des conjoints des femmes de 25-35 ans (41,1%) ont une connaissance approfondie des effets secondaires les plus courants des injectables notamment un saignement irrégulier pendant les premiers mois.

Pour la contraception orale régulière, dans l'ensemble, 86,3% des conjoints des femmes de 25-35 ans qui ont entendu parler des pilules savent que la première prescription doit être faite par un prestataire de santé. Un peu plus de la moitié (65,1%) savent que la fertilité revient habituellement dans les trois mois après l'arrêt de la pilule chez les femmes. Concernant la source de réapprovisionnement en pilule, 82,3% des conjoints savent qu'il peut se faire dans les centres de santé, les pharmacies et les dépôts. En outre, une grande proportion (83,2%) des conjoints des femmes de 25 à 35 ans sait que la pilule ne protège pas les femmes contre les IST.

Au sujet des méthodes à long terme, les conjoints des femmes de la population cible qui ont entendu parler des DIU, ont dans l'ensemble, dans une grande proportion (83,7%) connaissance que le DIU est inséré dans l'utérus par un agent de santé. Un conjoint sur deux sait que le DIU peut être utilisé pendant l'allaitement et qu'il est presque aussi efficace que la stérilisation.

**Tableau 43: Connaissance approfondie des méthodes contraceptives par les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence**

	Milieu de résidence		Ensemble
	Périurbain	Rural	
<b>MÉTHODES À COURT TERME : PRÉSERVATIF</b>	<b>Périurbain (N=681)</b>	<b>Rural (N=574)</b>	<b>Ensemble (N=1255)</b>
Un homme peut mettre un préservatif masculin avant d'avoir des rapports sexuels pour prévenir une grossesse.	96,3	93,2	95,3
Une femme peut mettre un préservatif féminin avant d'avoir des rapports sexuels pour prévenir une grossesse.	92,3	85,2	90,3
Vous n'avez pas besoin d'une ordonnance ou d'un examen médical pour obtenir des préservatifs.	92,4	91,3	92,0
Les préservatifs doivent être utilisés pendant toute la durée de la relation sexuelle pour être d'une plus grande efficacité.	86,8	90,3	87,9
Les préservatifs protègent contre les infections sexuellement transmissibles lorsqu'ils sont utilisés correctement.	91,7	94,4	92,6
<b>INJECTABLES</b>	<b>Périurbain (N=491)</b>	<b>Rural (N=355)</b>	<b>Ensemble (N=846)</b>
Le contraceptif injectable doit être prescrit par un prestataire de santé	90,7	96,4	92,2
Les contraceptifs injectables doivent être administrés tous les 2 mois ou tous les 3 mois.	66,3	68,2	66,8
Les contraceptifs injectables ne protègent pas les femmes contre les IST	76,6	85,2	78,9
L'effet secondaire le plus courant est un saignement irrégulier pendant les premiers mois.	38,6	48,0	41,1
Les femmes peuvent de nouveau tomber enceintes quelques mois après la dernière injection	66,2	73,8	68,2
<b>CONTRACEPTION ORALE REGULIERE</b>	<b>Périurbain (N=562)</b>	<b>Rural (N=433)</b>	<b>Ensemble (N=995)</b>
La première prescription de pilule doit être faite par un prestataire de santé	85,8	87,5	86,3
La pilule doit être prise chaque jour (à la même heure).	80,1	77,4	79,3
La fertilité revient habituellement dans les trois mois après l'arrêt de la pilule	63,7	68,4	65,1
Après la première consultation auprès d'un agent de santé, les femmes peuvent se réapprovisionner en pilules dans les centres de santé/Pharmacie/dépôt de leur localité sans avoir à revenir à la clinique chaque mois.	81,1	85,1	82,3
La pilule ne protège pas les femmes contre les IST.	80,7	89,0	83,2
<b>MÉTHODES À LONG TERME : DIU</b>	<b>Périurbain (N=146)</b>	<b>Rural (N=62)</b>	<b>Ensemble (N=208)</b>
Le stérilet (DIU) peut être utilisé pendant l'allaitement.	57,5	50,3	56,4
Le DIU peut prévenir les grossesses pendant une longue durée (jusqu'à 10 ans).	69,5	57,0	67,5
Après le retrait du DIU, la femme peut à nouveau tomber enceinte et avoir des enfants	74,7	71,8	74,2
Le DIU est inséré dans l'utérus par un agent de santé	89,3	76,4	87,3
Le DIU est presque aussi efficace que la stérilisation.	59,7	59,1	59,6

### 7.3.2. Connaissance des avantages liés à l'assistance d'agent de santé qualifié

- Chez les femmes de 25 à 35 ans en union

Globalement, les femmes dans les régions du projet connaissent les avantages d'être assistées par un agent de santé qualifié pendant la grossesse. Ces avantages sont entre autres la prévention et les soins de certaines maladies liées à la grossesse (97%), la santé du bébé (97,6%) et de la mère (98%), et la réduction des décès liés à la grossesse (96,2%).

En ce qui concerne le fait d'être assistée par un agent de santé qualifié pendant l'accouchement, la majorité des femmes de 25 à 35 ans en union savent qu'il permet entre autres de détecter et traiter rapidement les complications liées à l'accouchement (96,1%), prévenir la contamination par le VIH/SIDA de l'enfant (94,2%) et prévenir les décès maternels (95,4%) et infantiles (95,3%).

**Tableau 44: Connaissance par les femmes de 25 à 35 ans en union des avantages de l'assistance par un agent de santé qualifié pendant la grossesse et l'accouchement selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
<b>Quels sont les avantages d'être assisté par un agent de santé qualifié pendant la grossesse ?</b>							
<b>a. Prévention et soins de certaines maladies liées à la grossesse</b>	<b>FAUX</b>	18	1,40	25	3,60	43	2,20
	<b>VRAI</b>	1253	97,60	660	96,00	1913	97,00
	<b>NSP</b>	13	1,00	3	0,40	15	0,80
<b>b. Bébé bien portant à la naissance</b>	<b>FAUX</b>	19	1,50	23	3,30	41	2,10
	<b>VRAI</b>	1262	98,30	663	96,50	1925	97,60
	<b>NSP</b>	4	0,30	1	0,20	5	0,30
<b>c. Maman bien portante à l'accouchement</b>	<b>FAUX</b>	13	1,00	16	2,30	29	1,50
	<b>VRAI</b>	1268	98,70	670	97,50	1938	98,30
	<b>NSP</b>	3	0,20	2	0,30	5	0,20
<b>d. Eviter les décès liés à la grossesse</b>	<b>FAUX</b>	29	2,30	37	5,30	66	3,30
	<b>VRAI</b>	1246	97,10	650	94,60	1896	96,20
	<b>NSP</b>	8	0,70	1	0,10	9	0,50
<b>e. Faire un suivi nutritionnel</b>	<b>FAUX</b>	36	2,80	37	5,40	73	3,70
	<b>VRAI</b>	1236	96,20	632	91,90	1867	94,70
	<b>NSP</b>	12	1,00	19	2,80	31	1,60
<b>Quels sont les avantages d'être assisté par un agent de santé qualifié pendant l'accouchement ?</b>							
<b>a. Détecter et traiter rapidement les complications liées à l'accouchement</b>	<b>FAUX</b>	19	1,50	36	5,20	55	2,80
	<b>VRAI</b>	1251	97,40	644	93,60	1894	96,10
	<b>NSP</b>	14	1,10	8	1,20	22	1,10
<b>b. Prévenir la contamination par le VIH/SIDA de l'enfant</b>	<b>FAUX</b>	28	2,10	25	3,70	53	2,70
	<b>VRAI</b>	1222	95,20	634	92,30	1857	94,20
	<b>NSP</b>	34	2,70	27	4,00	62	3,10
<b>c. Avoir un certificat de naissance pour la déclaration de l'enfant.</b>	<b>FAUX</b>	20	1,50	25	3,60	44	2,30
	<b>VRAI</b>	1254	97,70	652	94,90	1906	96,70
	<b>NSP</b>	10	0,80	10	1,50	21	1,00
<b>d. Prévenir les décès maternels</b>	<b>FAUX</b>	38	2,90	36	5,20	74	3,70
	<b>VRAI</b>	1235	96,20	646	94,00	1881	95,40
	<b>NSP</b>	11	0,90	5	0,80	16	0,80
<b>e. Prévenir les décès infantiles</b>	<b>FAUX</b>	38	3,00	36	5,20	74	3,80
	<b>VRAI</b>	1230	95,80	649	94,40	1880	95,30
	<b>NSP</b>	15	1,20	3	0,40	18	0,90

- Chez leurs conjoints

Tout comme leurs conjointes, les hommes, dans une très grande proportion (environ 90%), connaissent les avantages, pour une femme, d'être assistée par un agent de santé qualifié pendant la grossesse et l'accouchement.

Ceux-ci savent que l'assistance par un agent de santé qualifié pendant la grossesse contribue à la prévention aux de certaines maladies (97%). Aussi, environ 94% des conjoints des femmes de la population cible savent que l'assistance d'un agent de santé qualifié permet d'avoir un bébé et une mère bien portants à l'accouchement et permet d'éviter les décès liés à la grossesse.

Dans l'ensemble, plus de 90% des conjoints des femmes de la population cible connaissent les avantages de l'assistance par un agent de santé qualifié pendant l'accouchement. C'est la même proportion quel que soit le milieu de résidence des conjoints des femmes de la population cible.

**Tableau 45: Connaissance par les conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union des avantages de l'assistance par un agent de santé qualifié pendant la grossesse et l'accouchement selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence		Ensemble (N=1305)
		Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
<b>Quels sont les avantages, pour une femme, d'être assistée par un agent de santé qualifié pendant la grossesse ?</b>				
Prévention et soins de certaines maladies liées à la grossesse	FAUX	3,1	2,4	2,9
	VRAI	96,8	97,5	97,0
	NSP	0,1	0,1	0,1
Bébé bien portant à la naissance	FAUX	5,1	4,8	5,0
	VRAI	94,7	95,1	94,8
	NSP	0,3	0,0	0,2
Maman bien portante à l'accouchement	FAUX	5,1	2,5	4,3
	VRAI	94,8	97,5	95,6
	NSP	0,1	0,0	0,1
Eviter les décès liés à la grossesse	FAUX	5,4	6,1	5,6
	VRAI	94,4	93,7	94,2
	NSP	0,2	0,2	0,2
Faire un suivi nutritionnel	FAUX	7,2	3,6	6,1
	VRAI	91,0	95,0	92,3
	NSP	1,8	1,3	1,6
<b>Quels sont les avantages, pour une femme, d'être assistée par un agent de santé qualifié pendant l'accouchement ?</b>				
Détecter et traiter rapidement les complications liées à l'accouchement	FAUX	4,1	3,4	3,8
	VRAI	95,5	96,2	95,7
	NSP	0,4	0,4	0,4
Prévenir la contamination par le VIH/SIDA de l'enfant	FAUX	5,1	5,0	5,1
	VRAI	93,7	94,4	93,9
	NSP	1,3	0,6	1,0
Avoir un certificat de naissance pour la déclaration de l'enfant	FAUX	5,5	4,7	5,2
	VRAI	93,4	95,1	94,0
	NSP	1,1	0,2	0,8
Prévenir les décès maternels	FAUX	7,9	5,7	7,2
	VRAI	90,9	94,0	91,9
	NSP	1,3	0,3	1,0
Prévenir les décès infantiles	FAUX	8,0	6,1	7,4
	VRAI	90,6	93,6	91,6
	NSP	1,4	0,3	1,1

### 7.3.3. Efficacité personnelle

Concernant l'efficacité personnelle, les femmes de la population cible, dans leur majorité (83,6%), soutiennent être capables d'utiliser une méthode de contraception moderne pour prévenir les grossesses non désirées. En milieu péri-urbain, cette proportion est de 88,4% contre 75% pour le milieu rural.

Par ailleurs, dans une moindre proportion (82%), les femmes de la population cible soutiennent qu'elles sont capables de discuter avec leur conjoint de l'utilisation des moyens contraceptifs pour prévenir une grossesse non désirée. Ici également, la proportion en milieu péri-urbain (85%) est supérieure à celle du milieu rural (76,4%).

Tableau 46: Capacité des femmes de 25 à 35 ans en union à utiliser les moyens contraceptifs et à en parler avec leurs conjoints selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
Je suis capable d'utiliser une méthode de contraception moderne pour prévenir les grossesses non désirées	Pas du tout d'accord	96	7,50	118	17,20	214	10,80
	Un peu en désaccord	41	3,20	49	7,10	89	4,50
	Neutre	8	0,70	4	0,60	13	0,60
	Un peu d'accord	209	16,30	149	21,60	358	18,10
	Tout à fait d'accord	925	72,10	367	53,40	1292	65,50
	Aucune réponse	5	0,40	1	0,20	6	0,30
	Total	1284	100,00	687	100,00	1971	100,00
Je peux discuter avec mon mari/partenaire de l'utilisation de contraceptifs modernes pour prévenir une grossesse non désirée	Pas du tout d'accord	130	10,20	107	15,50	237	12,00
	Un peu en désaccord	58	4,50	49	7,10	107	5,40
	Neutre	3	0,20	0	0,10	3	0,20
	Un peu d'accord	272	21,20	187	27,20	459	23,30
	Tout à fait d'accord	819	63,80	338	49,20	1157	58,70
	Aucune réponse	2	0,20	6	0,90	8	0,40

#### 7.3.4. Soutien social

- Chez les femmes de 25 à 35 ans en union

De l'analyse des données relatives au soutien social, il ressort qu'environ 91,3% des femmes de la population cible dans les régions du projet ont affirmé que leur conjoint les encourageraient si elles décident de se faire suivre par un agent de santé qualifié au centre de santé pendant leur grossesse et leur accouchement. Par contre, environ deux femmes sur trois affirment que leurs conjoints les encourageraient à avoir recours à une méthode moderne de contraception. Cette proportion est légèrement supérieure en milieu péri-urbain (92,6%) à la différence du milieu rural où elle est de 88,8%.

Tableau 47: Proportion des femmes de 25 à 35 ans en union recevant le soutien de leurs conjoints selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
Mon mari/partenaire m'encourage à avoir recours à une méthode moderne de contraception	Pas du tout d'accord	337	26,20	258	37,50	595	30,20
	Un peu en désaccord	90	7,00	69	10,10	159	8,10
	Neutre	15	1,10	8	1,20	23	1,20
	Un peu d'accord	203	15,80	80	11,60	283	14,40
	Tout à fait d'accord	633	49,30	268	38,90	901	45,70
	Aucune réponse	6	0,50	4	0,60	10	0,50
	Total	1284	100,00	687	100,00	1971	100,00
Mon mari/partenaire m'encouragerait à me faire suivre par un agent de santé qualifié pendant la grossesse et l'accouchement	Pas du tout d'accord	44	3,40	40	5,80	84	4,20
	Un peu en désaccord	47	3,70	30	4,40	77	3,90
	Neutre	4	0,30	3	0,50	8	0,40
	Un peu d'accord	154	12,00	88	12,90	242	12,30
	Tout à fait d'accord	1035	80,60	522	75,90	1557	79,00
	Aucune réponse	0	0,00	3	0,50	3	0,20
Mon mari/partenaire et moi discutons du planning familial.	Pas du tout d'accord	276	21,50	192	27,90	468	23,80
	Un peu en désaccord	88	6,90	66	9,60	154	7,80

	<b>Neutre</b>	12	0,90	5	0,70	17	0,80
	<b>Un peu d'accord</b>	209	16,30	103	14,90	311	15,80
	<b>Tout à fait d'accord</b>	692	53,90	317	46,10	1009	51,20
	<b>Aucune réponse</b>	7	0,50	5	0,70	12	0,60
<b>Mon mari/partenaire et moi discutons des avantages pour une femme de se faire suivre par un agent de santé qualifié pendant la grossesse et l'accouchement</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	95	7,40	50	7,30	145	7,40
	<b>Un peu en désaccord</b>	66	5,10	36	5,30	102	5,20
	<b>Neutre</b>	2	0,10	5	0,70	7	0,30
	<b>Un peu d'accord</b>	177	13,80	104	15,10	281	14,20
	<b>Tout à fait d'accord</b>	941	73,30	490	71,30	1431	72,60
	<b>Aucune réponse</b>	3	0,20	3	0,40	6	0,30

- Chez leurs conjoints

Chez les conjoints des femmes de la population cible de l'étude, 75,5% d'entre eux pensent qu'un homme devrait s'impliquer dans la planification familiale avec sa femme. Les raisons avancées sont que : l'homme est le garant du bien-être familial (69%) ; il doit prendre soin de la santé de sa femme (43,6%) ; il doit contrôler le nombre de naissance (50,8%) ; pour mieux s'occuper de sa femme (38,9%) ; pour mieux s'occuper des enfants (60,8%).

Pour la proportion qui s'oppose à l'implication des hommes dans la planification familiale (22,3%), deux tiers d'entre eux pensent que la planification familiale est une affaire de femme tandis que le tiers restant pense que c'est Dieu qui donne les enfants.

En ce qui concerne le soutien social, 65,7% des conjoints sont d'accord pour encourager leur femme si elle décide d'adopter une méthode moderne de contraception pour éviter une grossesse non désirée. En outre, quand bien même un peu plus de la moitié (57,9%) discute de la planification familiale avec leur femme, ce sont moins de 18% des conjoints des femmes de la population cible qui le font très souvent.

**Tableau 48: Implication des conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union dans la planification familiale selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence		Ensemble (N=1305)
		Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
Pensez-vous qu'un homme devrait s'impliquer dans la planification familiale avec sa femme	Non	23,6	19,5	22,3
	Oui	74,9	76,8	75,5
	Ne sait pas	1,6	3,7	2,3
<b>Raison de l'implication des hommes dans la planification familiale</b>				
Il est le garant du bien-être familial		73,6	59,7	69,0
Il doit prendre soin de la santé de sa femme		46,3	38,1	43,6
Il doit contrôler le nombre de naissance		53,5	45,2	50,8
Pour mieux s'occuper de sa femme		38,8	39,2	38,9
Pour mieux s'occuper de ses enfants		58,2	66,2	60,8
<b>Raison de la non implication des hommes dans la planification familiale</b>				
C'est une affaire de femme		68,2	51,7	63,5
C'est Dieu qui donne les enfants		31,7	47,2	36,0
Seriez-vous d'accord pour encourager votre femme si elle décide d'adopter une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée ?	Non	31,4	31,6	31,5
	Oui	66,1	65,0	65,7
	Ne sait pas	2,6	3,4	2,8
Discutez-vous de la planification familiale avec votre femme ?	Oui	56,4	61,1	57,9
	Non	43,6	38,9	42,1
	Très souvent	18,1	15,4	17,2
À quelle fréquence parliez-vous du planning familial avec votre femme ?	Souvent	45,6	47,7	46,3
	Rarement	36,3	36,9	36,5

## 7.4. Facteurs de motivation

### 7.4.1. Menace

- Chez les femmes de 25 à 35 ans en union

L'analyse de la gravité des menaces met en exergue une proportion d'environ 68,8% des femmes de 25 à 35 ans en union qui sont d'accord que les grossesses non désirées constituent un problème majeur dans leur communauté ou leur entourage.

Aussi une grande majorité de ces femmes (environ 83%) sont-elles d'accord sur le fait que Les familles qui ont trop d'enfants ont beaucoup de difficultés.

Par ailleurs, environ 87% des femmes de la population cible sont d'accord que le risque de décès maternel est plus élevé si la femme a des grossesses chaque année. C'est à un degré moindre la même proportion (environ 85%) pour celles qui sont d'accord que le risque de décès du nourrisson est plus élevé si la femme a des enfants chaque année.

Tableau 49: Proportion des femmes de 25 à 35 ans en union ayant une conscience des risques liés aux grossesses non désirées selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
Les grossesses non désirées problème majeur dans ma communauté / entourage	Pas du tout d'accord	200	15,60	140	20,40	340	17,30
	Un peu en désaccord	158	12,30	57	8,30	215	10,90
	Neutre	30	2,30	14	2,00	44	2,20
	Un peu d'accord	350	27,30	173	25,10	523	26,50
	Tout à fait d'accord	542	42,30	292	42,50	834	42,30
	Aucune réponse	2	0,10	12	1,80	14	0,70
Les familles qui ont trop d'enfants ont beaucoup de difficultés	Pas du tout d'accord	92	7,20	69	10,10	161	8,20
	Un peu en désaccord	99	7,70	53	7,60	151	7,70
	Neutre	11	0,90	3	0,50	14	0,70
	Un peu d'accord	347	27,00	195	28,30	541	27,50
	Tout à fait d'accord	729	56,90	367	53,40	1096	55,70
	Aucune réponse	5	0,40	1	0,10	5	0,30
Les femmes qui ont des grossesses trop rapprochées souffrent habituellement de problèmes de santé	Pas du tout d'accord	60	4,70	38	5,50	98	5,00
	Un peu en désaccord	79	6,10	40	5,90	119	6,00
	Neutre	5	0,40	2	0,30	7	0,40
	Un peu d'accord	321	25,00	150	21,80	471	23,90
	Tout à fait d'accord	814	63,50	453	65,90	1267	64,30
	Aucune réponse	4	0,30	4	0,60	9	0,40
Le risque de décès du nourrisson est plus élevé si la femme a des enfants chaque année.	Pas du tout d'accord	90	7,00	34	4,90	123	6,30
	Un peu en désaccord	108	8,50	37	5,50	146	7,40
	Neutre	11	0,80	2	0,30	12	0,60
	Un peu d'accord	276	21,50	170	24,70	446	22,60
	Tout à fait d'accord	794	61,90	443	64,40	1237	62,80
	Aucune réponse	4	0,30	2	0,30	6	0,30
Le risque de décès maternel est plus élevé si la femme a des grossesses chaque année	Pas du tout d'accord	82	6,40	24	3,50	106	5,40
	Un peu en désaccord	96	7,50	37	5,30	132	6,70
	Neutre	10	0,70	1	0,20	11	0,60
	Un peu d'accord	281	21,90	167	24,30	448	22,80
	Tout à fait d'accord	812	63,40	458	66,60	1270	64,50
	Aucune réponse	1	0,10	0	0,00	2	0,10

- Chez leurs conjoints

Concernant les conjoints des femmes de la population cible, environ 77% d'entre eux sont d'accord que les femmes qui ont des enfants à des intervalles trop rapprochés souffrent habituellement de problèmes de santé. C'est la même proportion pour ceux qui sont d'accord que le risque de décès maternel est plus élevé si la femme a des grossesses chaque année. Dans cette même proportion (77%) les conjoints des femmes de la population cible sont d'accord que le risque de décès du nouveau-né ou du bébé est plus élevé si la femme a des enfants chaque année.

En outre, un peu plus de la moitié des conjoints (62%) sont d'accord que les grossesses non désirées sont un problème majeur dans leur communauté ou dans leur entourage.

Enfin dans une proportion d'environ 72%, ceux-ci sont d'accord que les familles qui ont trop d'enfants ont beaucoup de difficultés.

**Tableau 50: Proportion des conjoints des femmes de 25 à 35 ans ayant une conscience des risques liés aux grossesses non désirées selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence		Ensemble (N=1 305)
		Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
Les femmes qui ont des enfants à des intervalles trop rapprochés souffrent habituellement de problèmes de santé	Pas du tout d'accord	16,5	9,2	14,1
	Un peu en désaccord	8,4	5,7	7,5
	Neutre	0,8	0,7	0,8
	Un peu d'accord	32,1	25,5	30,0
	Tout à fait d'accord	42,2	58,9	47,6
	Aucune réponse	0,1	0,0	0,0
Les grossesses non désirées sont un problème majeur dans ma communauté/entourage	Pas du tout d'accord	14,4	9,6	12,9
	Un peu en désaccord	20,8	9,3	17,1
	Neutre	7,2	9,3	7,8
	Un peu d'accord	22,4	28,9	24,5
	Tout à fait d'accord	35,0	42,8	37,5
	Aucune réponse	0,1	0,1	0,1
Les familles qui ont trop d'enfants ont beaucoup de difficultés.	Pas du tout d'accord	14,9	9,9	13,3
	Un peu en désaccord	15,1	9,7	13,3
	Neutre	1,2	0,1	0,8
	Un peu d'accord	26,7	30,8	28,0
	Tout à fait d'accord	41,8	49,5	44,3
	Aucune réponse	0,4	0,0	0,3
Le risque de décès du nouveau-né /bébé est plus élevé si la femme a des enfants chaque année.	Pas du tout d'accord	12,2	6,3	10,3
	Un peu en désaccord	14,3	6,2	11,7
	Neutre	0,9	0,7	0,8
	Un peu d'accord	28,5	27,4	28,1
	Tout à fait d'accord	44,0	59,2	48,9
	Aucune réponse	0,1	0,2	0,1
Le risque de décès maternel est plus élevé si la femme a des grossesses chaque année.	Pas du tout d'accord	11,8	6,8	10,2
	Un peu en désaccord	13,4	5,8	11,0
	Neutre	0,8	0,4	0,6
	Un peu d'accord	27,4	26,0	26,9
	Tout à fait d'accord	46,3	60,6	50,9
	Aucune réponse	0,3	0,4	0,3

## 7.4.2. Croyances

- Chez les femmes de 25 à 35 ans en union

Chez les femmes de la population cible, dans l'ensemble, plus de 62% de celles-ci croient que l'utilisation de contraceptifs peut faire qu'il soit plus difficile pour la femme de tomber enceinte plus tard.

En ce qui concerne les contraceptifs à action prolongée, plus de la moitié des femmes de la population cible (environ 53%) croit que l'utilisation prolongée du DIU peut causer l'infertilité. Aussi, une femme sur deux croit le DIU peut provoquer des lésions à l'utérus.

Pour ce qui est des injectables, plus de 84% des femmes de la population cible croient que l'utilisation de contraceptifs injectables entraîne une prise de poids. C'est à peu près la même proportion de femmes qui croient que l'utilisation des contraceptifs oraux entraîne des variations de poids.

Tableau 51: Croyances des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
L'utilisation de contraceptifs peut faire qu'il soit plus difficile pour la femme de tomber enceinte plus tard	Pas du tout d'accord	240	18,80	143	20,80	383	19,50
	Un peu en désaccord	188	14,60	99	14,40	287	14,60
	Neutre	36	2,80	24	3,40	59	3,00
	Un peu d'accord	426	33,20	158	23,00	584	29,70
	Tout à fait d'accord	384	29,90	256	37,30	640	32,50
	Aucune réponse	9	0,70	8	1,10	16	0,80
<b>Contraceptif à action prolongée : DIU</b>							
DIU peut provoquer des lésions à l'utérus	Pas du tout d'accord	61	13,50	20	16,40	81	14,10
	Un peu en désaccord	61	13,50	14	11,40	74	13,00
	Neutre	59	13,10	32	26,30	91	15,90
	Un peu d'accord	165	36,70	14	11,60	179	31,40
	Tout à fait d'accord	77	17,20	29	24,20	106	18,70
	Aucune réponse	27	5,90	12	10,10	39	6,80
L'utilisation prolongée du DIU peut causer l'infertilité	Pas du tout d'accord	76	16,80	22	18,40	98	17,10
	Un peu en désaccord	69	15,30	17	13,80	85	15,00
	Neutre	34	7,50	24	19,90	57	10,10
	Un peu d'accord	159	35,40	23	19,00	182	31,90
	Tout à fait d'accord	94	20,80	29	23,90	122	21,50
	Aucune réponse	19	4,30	6	5,10	25	4,40
Le DIU se déplace à l'intérieur du corps.	Pas du tout d'accord	130	29,00	26	21,80	156	27,40
	Un peu en désaccord	69	15,40	14	11,30	83	14,50
	Neutre	45	10,10	27	22,60	72	12,70
	Un peu d'accord	124	27,50	23	18,80	147	25,70
	Tout à fait d'accord	66	14,60	20	17,00	86	15,10
	Aucune réponse	16	3,50	10	8,50	26	4,50
Le DIU va « tomber » pendant des travaux physiques lourds	Pas du tout d'accord	114	25,40	25	21,00	140	24,50
	Un peu en désaccord	71	15,70	11	9,40	82	14,40
	Neutre	50	11,20	25	21,00	76	13,30
	Un peu d'accord	135	30,10	23	19,20	158	27,80
	Tout à fait d'accord	66	14,60	24	19,60	89	15,60
	Aucune réponse	13	3,00	12	9,90	25	4,40
Le DIU réduit le plaisir sexuel	Pas du tout d'accord	148	32,80	28	23,70	176	30,90
	Un peu en désaccord	59	13,20	12	9,60	71	12,40
	Neutre	72	16,10	34	28,10	106	18,60

	<b>Un peu d'accord</b>	84	18,60	18	14,70	101	17,80
	<b>Tout à fait d'accord</b>	58	12,80	9	7,20	66	11,60
	<b>Aucune réponse</b>	29	6,50	20	16,80	49	8,70
<b>INJECTABLES</b>							
<b>Les contraceptifs injectables peuvent causer le cancer</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	488	42,90	241	45,60	730	43,70
	<b>Un peu en désaccord</b>	265	23,30	81	15,30	346	20,70
	<b>Neutre</b>	111	9,70	74	14,00	185	11,10
	<b>Un peu d'accord</b>	172	15,10	72	13,60	245	14,70
	<b>Tout à fait d'accord</b>	64	5,60	37	7,00	101	6,00
	<b>Aucune réponse</b>	39	3,40	23	4,40	62	3,70
<b>Les contraceptifs injectables peuvent causer l'infertilité</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	359	31,50	203	38,40	563	33,70
	<b>Un peu en désaccord</b>	208	18,30	57	10,70	265	15,90
	<b>Neutre</b>	54	4,70	21	3,90	75	4,50
	<b>Un peu d'accord</b>	361	31,70	128	24,20	489	29,30
	<b>Tout à fait d'accord</b>	150	13,20	116	21,90	266	15,90
	<b>Aucune réponse</b>	6	0,60	5	0,90	11	0,70
<b>Les contraceptifs injectables entraînent une prise de poids</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	93	8,20	30	5,70	123	7,40
	<b>Un peu en désaccord</b>	53	4,70	26	5,00	80	4,80
	<b>Neutre</b>	40	3,50	14	2,60	53	3,20
	<b>Un peu d'accord</b>	388	34,10	171	32,30	559	33,50
	<b>Tout à fait d'accord</b>	565	49,60	283	53,50	848	50,80
	<b>Aucune réponse</b>	0	0,00	5	1,00	5	0,30
<b>L'utilisation prolongée de contraceptifs injectables peut être dangereux pour la santé de la femme.</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	241	21,10	114	21,50	354	21,20
	<b>Un peu en désaccord</b>	187	16,40	57	10,80	244	14,60
	<b>Neutre</b>	53	4,70	26	4,90	79	4,80
	<b>Un peu d'accord</b>	379	33,30	134	25,30	513	30,70
	<b>Tout à fait d'accord</b>	276	24,20	194	36,70	470	28,20
	<b>Aucune réponse</b>	3	0,30	4	0,80	7	0,40
<b>Les contraceptifs injectables peuvent provoquer des lésions à l'utérus</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	502	44,10	216	40,80	718	43,00
	<b>Un peu en désaccord</b>	235	20,60	65	12,30	300	18,00
	<b>Neutre</b>	112	9,80	72	13,60	184	11,00
	<b>Un peu d'accord</b>	162	14,20	83	15,60	245	14,70
	<b>Tout à fait d'accord</b>	90	7,90	62	11,60	151	9,10
	<b>Aucune réponse</b>	39	3,40	32	6,10	71	4,30
<b>Contraception orale régulière</b>							
<b>Les contraceptifs oraux peuvent causer le cancer</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	624	50,60	267	44,90	891	48,80
	<b>Un peu en désaccord</b>	239	19,40	84	14,20	324	17,70
	<b>Neutre</b>	94	7,60	73	12,20	167	9,10
	<b>Un peu d'accord</b>	174	14,10	74	12,40	248	13,60
	<b>Tout à fait d'accord</b>	77	6,20	79	13,20	155	8,50
	<b>Aucune réponse</b>	25	2,00	18	3,00	43	2,30
<b>L'utilisation prolongée des contraceptifs oraux peut causer l'infertilité</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	393	31,90	196	33,00	589	32,20
	<b>Un peu en désaccord</b>	194	15,80	63	10,70	258	14,10
	<b>Neutre</b>	41	3,30	32	5,30	72	4,00
	<b>Un peu d'accord</b>	391	31,70	146	24,60	537	29,40
	<b>Tout à fait d'accord</b>	202	16,40	151	25,40	354	19,40
	<b>Aucune réponse</b>	11	0,90	6	1,00	17	0,90
<b>L'utilisation de la pilule réduit le plaisir pendant les relations sexuelles.</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	771	62,50	291	48,90	1062	58,10
	<b>Un peu en désaccord</b>	143	11,60	84	14,20	228	12,50
	<b>Neutre</b>	103	8,30	97	16,30	200	10,90
	<b>Un peu d'accord</b>	122	9,90	44	7,40	166	9,10

	<b>Tout à fait d'accord</b>	74	6,00	40	6,80	115	6,30
	<b>Aucune réponse</b>	19	1,60	38	6,30	57	3,10
<b>L'utilisation des contraceptifs oraux entraîne des variations de poids.</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	89	7,20	44	7,40	132	7,20
	<b>Un peu en désaccord</b>	70	5,60	28	4,70	97	5,30
	<b>Neutre</b>	50	4,00	27	4,60	77	4,20
	<b>Un peu d'accord</b>	413	33,50	195	32,80	608	33,30
	<b>Tout à fait d'accord</b>	605	49,10	291	49,00	897	49,10
	<b>Aucune réponse</b>	7	0,60	9	1,50	16	0,90
<b>L'utilisation des contraceptifs oraux cause l'acné</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	629	51,00	271	45,60	900	49,20
	<b>Un peu en désaccord</b>	230	18,70	69	11,50	299	16,40
	<b>Neutre</b>	109	8,80	88	14,80	197	10,80
	<b>Un peu d'accord</b>	171	13,90	91	15,20	262	14,30
	<b>Tout à fait d'accord</b>	62	5,10	33	5,50	95	5,20
	<b>Aucune réponse</b>	31	2,50	43	7,30	75	4,10

- Chez leurs conjoints

Chez les conjoints des femmes de 25 à 35 ans, même si plus de 80% de ceux-ci croient que l'espacement des naissances contribue à la bonne santé de la mère, plus de la moitié (66%) croit que l'utilisation de contraceptifs peut faire qu'il soit plus difficile pour la femme de tomber enceinte plus tard. En outre, environ 64% des conjoints des femmes de la population cible croient que l'utilisation de Méthodes Modernes entraîne une prise de poids chez les femmes.

**Tableau 52: Croyances des conjoints des femmes de 25 à 35 ans selon le milieu de résidence**

	Milieu de résidence		Ensemble (N=1 305)	
	Périurbain (N=699)	Rural (N=606)		
L'espacement des naissances contribue à la bonne santé de la mère.	Pas du tout d'accord	9,1	6,8	8,4
	Un peu en désaccord	6,8	3,7	5,8
	Neutre	0,4	0,9	0,5
	Un peu d'accord	18,1	19,6	18,6
	Tout à fait d'accord	65,4	68,9	66,6
	Aucune réponse	0,1	0,2	0,1
Les enfants nés de mères qui ont utilisé une méthode d'espacement des naissances peuvent avoir des problèmes de santé.	Pas du tout d'accord	31,2	24,6	29,1
	Un peu en désaccord	19,6	14,7	18,0
	Neutre	3,3	5,9	4,1
	Un peu d'accord	21,6	23,6	22,2
	Tout à fait d'accord	24,2	30,2	26,1
	Aucune réponse	0,2	1,0	0,4
L'utilisation de contraceptifs peut faire qu'il soit plus difficile pour la femme de tomber enceinte plus tard.	Pas du tout d'accord	14,5	13,6	14,2
	Un peu en désaccord	15,6	12,3	14,6
	Neutre	3,3	5,7	4,1
	Un peu d'accord	29,8	25,6	28,4
	Tout à fait d'accord	36,4	42,8	38,5
	Aucune réponse	0,3	0,1	0,2
L'utilisation de Méthodes Modernes entraîne une prise de poids chez les femmes	Pas du tout d'accord	4,1	4,3	4,2
	Un peu en désaccord	9,2	5,7	8,1
	Neutre	20,2	20,7	20,3
	Un peu d'accord	22,9	25,3	23,7
	Tout à fait d'accord	40,0	41,9	40,6
	Aucune réponse	3,6	2,1	3,1

### 7.4.3. Attentes et susceptibilités

- Attentes vis-à-vis des résultats

À propos de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes, dans l'ensemble, plus de 76% des femmes âgées de 25 à 35 ans en union sont d'accord que c'est la meilleure manière pour elles d'éviter des grossesses non désirées. En outre, plus de 80% d'entre elles sont d'accord qu'elles ont plus de chance de tomber enceinte si elles n'utilisent pas de contraceptifs. De plus, une grande proportion de ces femmes sont d'accord que l'utilisation de contraceptifs modernes est efficace pour l'espacement des naissances (environ 86%) et la limitation du nombre d'enfants (environ 85%).

Tableau 53 : Attentes des femmes de 25 à 35 ans en union vis-à-vis des résultats selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	()
		Nombre	()	Nombre	()		
L'utilisation de contraceptifs modernes est la meilleure manière pour moi d'éviter des grossesses non désirées.	Pas du tout d'accord	129	10,10	151	22,00	281	14,20
	Un peu en désaccord	92	7,20	81	11,80	173	8,80
	Neutre	8	0,60	3	0,40	11	0,60
	Un peu d'accord	213	16,60	122	17,80	336	17,00
	Tout à fait d'accord	836	65,20	326	47,40	1162	59,00
	Aucune réponse	4	0,30	4	0,60	8	0,40
J'ai plus de chances de tomber enceinte si je n'utilise pas de contraceptifs.	Pas du tout d'accord	83	6,50	119	17,30	202	10,20
	Un peu en désaccord	102	8,00	67	9,70	169	8,60
	Neutre	5	0,40	8	1,10	13	0,70
	Un peu d'accord	220	17,20	135	19,70	355	18,00
	Tout à fait d'accord	869	67,80	355	51,60	1224	62,10
	Aucune réponse	3	0,20	4	0,60	7	0,30
L'utilisation de contraceptifs modernes est efficace pour l'espacement des naissances.	Pas du tout d'accord	49	3,80	77	11,20	126	6,40
	Un peu en désaccord	35	2,80	70	10,20	106	5,40
	Neutre	9	0,70	11	1,60	20	1,00
	Un peu d'accord	253	19,80	149	21,70	402	20,40
	Tout à fait d'accord	927	72,30	378	55,00	1305	66,30
	Aucune réponse	9	0,70	2	0,30	11	0,50
L'utilisation de contraceptifs modernes me permet de limiter le nombre d'enfants que j'ai.	Pas du tout d'accord	56	4,40	91	13,30	148	7,50
	Un peu en désaccord	58	4,50	65	9,40	123	6,20
	Neutre	4	0,30	4	0,60	8	0,40
	Un peu d'accord	274	21,40	161	23,40	434	22,10
	Tout à fait d'accord	884	68,90	365	53,00	1249	63,40
	Aucune réponse	6	0,40	3	0,40	8	0,40
Les préservatifs sont efficaces pour prévenir une grossesse non désirée	Pas du tout d'accord	92	7,50	68	11,00	160	8,70
	Un peu en désaccord	161	13,00	65	10,60	226	12,20
	Neutre	7	0,50	13	2,10	20	1,10
	Un peu d'accord	339	27,40	162	26,40	501	27,10
	Tout à fait d'accord	635	51,50	306	49,80	942	50,90
	Aucune réponse	1	0,00	1	0,10	1	0,10
La contraception d'urgence est efficace pour prévenir une grossesse non désirée.	Pas du tout d'accord	28	3,70	16	9,10	44	4,70
	Un peu en désaccord	41	5,40	12	6,80	53	5,70
	Neutre	16	2,20	21	12,20	38	4,10
	Un peu d'accord	269	35,60	50	28,60	319	34,30
	Tout à fait d'accord	401	53,00	74	42,30	474	51,00
	Aucune réponse	1	0,10	2	1,00	3	0,30

<b>Les contraceptifs injectables sont efficaces pour prévenir une grossesse non désirée.</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	25	2,20	44	8,40	70	4,20
	<b>Un peu en désaccord</b>	30	2,70	21	4,00	52	3,10
	<b>Neutre</b>	18	1,60	17	3,30	35	2,10
	<b>Un peu d'accord</b>	278	24,40	141	26,60	419	25,10
	<b>Tout à fait d'accord</b>	781	68,60	306	57,70	1087	65,10
	<b>Aucune réponse</b>	6	0,50	0	0,00	6	0,40
<b>Les pilules contraceptives sont efficaces pour prévenir une grossesse non désirée.</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	30	2,50	42	7,10	73	4,00
	<b>Un peu en désaccord</b>	79	6,40	31	5,30	111	6,10
	<b>Neutre</b>	12	1,00	11	1,80	23	1,20
	<b>Un peu d'accord</b>	347	28,10	187	31,40	533	29,20
	<b>Tout à fait d'accord</b>	761	61,70	319	53,70	1080	59,10
	<b>Aucune réponse</b>	4	0,30	4	0,70	8	0,40
<b>Les DIU sont d'une grande efficacité pour prévenir les grossesses non désirées</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	12	2,80	4	3,10	16	2,80
	<b>Un peu en désaccord</b>	42	9,40	10	8,70	53	9,20
	<b>Neutre</b>	37	8,30	25	21,10	63	11,00
	<b>Un peu d'accord</b>	132	29,40	15	12,20	147	25,80
	<b>Tout à fait d'accord</b>	209	46,50	57	47,60	266	46,80
	<b>Aucune réponse</b>	16	3,60	9	7,30	25	4,40

- Susceptibilité
  - Chez les femmes de 25 à 35 ans en union

En ce qui concerne la susceptibilité, dans l'ensemble, plus de 73% des femmes de 25 à 35 ans en union sont d'accord avec l'énoncé suivante : « Si je n'utilise pas une méthode moderne de contraception, je vais tomber enceinte ». Par ailleurs, pour ce qui est de l'énoncé : « Je n'ai pas besoin d'avoir recours à une méthode moderne de contraception pour prévenir des grossesses non désirées », ce sont plus de la moitié (61,3%) de celles-ci qui ont marqué leur désaccord.

**Tableau 53: Susceptibilité des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	()
		Nombre	()	Nombre	()		
<b>Si je n'utilise pas une méthode moderne de planning familial, je vais tomber enceinte</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	77	6,00	110	15,90	186	9,50
	<b>Un peu en désaccord</b>	59	4,60	43	6,20	102	5,20
	<b>Neutre</b>	12	0,90	14	2,00	26	1,30
	<b>Un peu d'accord</b>	299	23,40	178	26,00	478	24,30
	<b>Tout à fait d'accord</b>	829	64,60	339	49,30	1167	59,30
	<b>Aucune réponse</b>	6	0,50	4	0,60	10	0,50
<b>Je n'ai pas besoin d'avoir recours à une méthode moderne de planning familial pour prévenir des grossesses non désirées.</b>	<b>Pas du tout d'accord</b>	597	46,50	224	32,60	821	41,70
	<b>Un peu en désaccord</b>	278	21,70	107	15,60	385	19,60
	<b>Neutre</b>	12	1,00	8	1,10	20	1,00
	<b>Un peu d'accord</b>	178	13,90	127	18,40	305	15,50
	<b>Tout à fait d'accord</b>	214	16,70	215	31,30	429	21,80
	<b>Aucune réponse</b>	2	0,20	7	1,00	9	0,50

- Chez leurs conjoints

Chez les conjoints des femmes de 25 à 35, un peu plus de la moitié (62%) d'entre eux sont d'accord avec l'énoncé : « Si je n'utilise pas une méthode moderne de contraception, ma femme va tomber enceinte ». Concernant l'énoncé : « Je n'ai pas besoin d'avoir recours à une méthode moderne de

contraception pour éviter une grossesse non désirée », un conjoint sur deux a marqué son désaccord.

**Tableau 54: Susceptibilité des conjoints des femmes de 25 à 35 ans en union selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence		Ensemble (N=1 305)
		Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
Si je n'utilise pas une méthode moderne de planning familial, ma femme va tomber enceinte.	Pas du tout d'accord	17,8	27,0	20,7
	Un peu en désaccord	16,9	15,6	16,5
	Neutre	0,8	1,9	1,2
	Un peu d'accord	24,3	25,2	24,6
	Tout à fait d'accord	40,2	30,3	37,0
	Aucune réponse	0,0	0,0	0,0
Je m'inquiète au sujet des effets secondaires liés à l'utilisation d'une méthode d'espacement des naissances.	Pas du tout d'accord	11,8	9,8	11,2
	Un peu en désaccord	16,2	13,6	15,4
	Neutre	2,3	2,7	2,5
	Un peu d'accord	26,9	19,8	24,6
	Tout à fait d'accord	42,2	53,7	45,9
	Aucune réponse	0,5	0,3	0,4
Je n'ai pas besoin d'avoir recours à une méthode moderne de contraception pour éviter une grossesse non désirée	Pas du tout d'accord	28,5	24,7	27,2
	Un peu en désaccord	23,9	21,6	23,2
	Neutre	0,9	3,0	1,6
	Un peu d'accord	22,8	22,7	22,7
	Tout à fait d'accord	23,5	27,8	24,9
	Aucune réponse	0,4	0,3	0,4

#### 7.4.4. Motivations d'achat des produits contraceptifs AIMAS

Ce point portera sur les perceptions des femmes de la population cible sur les prix de la pilule Confiance® et de l'injectable Harmonia® et leurs motivations à les acheter en cas d'augmentation de leurs prix.

##### - La pilule Confiance®

Concernant la pilule Confiance®, l'analyse montre que dans l'ensemble, la majorité (67,6%) des femmes ne connaissent pas le prix de la boîte de Confiance®. Cette proportion est relativement plus élevée en milieu rural avec 74,8% contre 64,2% en milieu péri-urbain.

Les femmes de la population cible qui connaissent le prix de la boîte de Confiance® le situent entre 200 et 2000 FCFA. La majorité (77,5%) des utilisatrices affirment que la boîte de Confiance coûte 500 FCFA.

En ce qui concerne leurs perceptions du prix de la boîte de Confiance®, la majorité des utilisatrices (81%) le trouve abordable. Cette proportion est relativement plus élevée en milieu rural (82,2%) qu'en milieu péri-urbain (80,6%).

Le prix le plus élevé auquel les utilisatrices seraient disposées à payer la boîte de Confiance® varie entre 50 FCFA et 5000 FCFA. Ainsi 28,10% de celles-ci sont disposées à payer la boîte de Confiance® à 1000 FCFA. Pour un prix le plus élevé fixé à 500 FCFA, elles sont 17,5% et 13,5% pour un prix le plus élevé de 2000 FCFA.

À l'opposé, 28,7% des utilisatrices affirment qu'elles n'achèteraient pas la boîte de Confiance® au prix le plus bas de 300 FCFA. Pour un prix le plus bas de 200 FCFA, elles sont 24,8%.

En réaction au cas où le prix fixé de la boîte de Confiance® est plus élevé que le prix auquel elles sont prêtes à la payer, la majorité des femmes (49,7%) a affirmé chercher la même marque à un

endroit où le produit est moins cher. En outre, pendant que 24,2% des utilisatrices préfèrent chercher une autre marque moins chère, 26% d'entre elles souhaite arrêter son utilisation.

Tableau 55: Connaissance et perceptions des prix de Confiance par les femmes de 25-35 ans selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural			
		Nombre	(%)	Nombre	(%)	Nombre	(%)
<b>Connaissance du coût de la boîte de confiance</b>	Oui	442	35,80	150	25,20	592	32,40
	Non	791	64,20	444	74,80	1236	67,60
	<b>Total</b>	<b>1233</b>	<b>100,00</b>	<b>594</b>	<b>100,00</b>	<b>1827</b>	<b>100,00</b>
<b>Prix de la boîte de confiance</b>	Ne sait pas	1	0,20	0	0,00	1	0,20
	200	0	0,00	1	0,80	1	0,20
	300	6	1,40	3	1,70	9	1,50
	400	1	0,30	3	1,90	4	0,70
	450	16	3,70	9	5,80	25	4,20
	470	3	0,70	1	0,90	4	0,70
	475	12	2,60	1	0,90	13	2,20
	480	8	1,70	0	0,00	8	1,30
	490	2	0,50	0	0,00	2	0,40
	500	353	79,90	106	70,90	459	77,60
	600	20	4,50	9	5,70	28	4,80
	650	0	0,00	1	0,70	1	0,20
	700	0	0,00	2	1,20	2	0,30
	750	0	0,00	0	0,20	0	0,10
	850	0	0,10	0	0,00	0	0,10
	1000	12	2,80	13	8,40	25	4,20
	1175	2	0,50	0	0,00	2	0,40
	1200	3	0,60	0	0,00	3	0,50
	1500	1	0,20	0	0,00	1	0,20
	2000	1	0,20	2	1,10	3	0,40
<b>Comment jugez-vous le prix de la boîte de confiance</b>	Bas	75	17,00	13	8,80	88	14,90
	Abordable	356	80,60	123	82,20	479	81,00
	Élevé	8	1,80	13	8,90	21	3,60
	Ne sait pas/Sans réponse	3	0,70	0	0,00	3	0,50
<b>Prix le plus élevé que vous seriez disposé(e) à payer confiance</b>	50	2	0,60	0	0,00	2	0,40
	Ne sait pas	5	1,20	3	1,80	8	1,40
	100	0	0,10	1	0,80	2	0,30
	200	0	0,00	4	2,50	4	0,60
	300	6	1,40	6	3,80	12	2,00
	400	2	0,40	1	0,90	3	0,50
	450	0	0,00	1	0,50	1	0,10
	475	1	0,10	0	0,00	1	0,10
	500	77	17,40	27	18,00	104	17,50
	550	5	1,20	1	0,70	6	1,10
	600	17	3,90	16	10,90	34	5,70
	700	14	3,20	4	2,80	18	3,10
	750	0	0,00	2	1,40	2	0,30
	800	7	1,70	5	3,20	12	2,10
	1000	126	28,40	41	27,10	166	28,10
1200	5	1,10	1	0,80	6	1,00	

	1500	52	11,90	16	10,80	69	11,60
	1600	2	0,50	0	0,00	2	0,40
	2000	68	15,50	12	7,80	80	13,50
	2500	9	2,00	2	1,20	11	1,80
	3000	17	3,80	5	3,10	21	3,60
	3500	4	1,00	0	0,00	4	0,70
	4000	6	1,50	0	0,00	6	1,10
	5000	14	3,30	3	1,90	17	2,90
<b>Prix le plus bas ou vous n'achèteriez pas confiance</b>	0	1	0,20	1	0,70	2	0,30
	5	0	0,00	1	0,40	1	0,10
	10	2	0,60	1	0,70	4	0,60
	20	1	0,10	0	0,00	1	0,10
	25	7	1,50	3	1,90	9	1,60
	50	18	4,10	7	4,70	25	4,30
	75	0	0,00	1	0,70	1	0,20
	Ne sait pas	12	2,70	3	2,00	15	2,50
	100	66	14,80	17	11,50	83	14,00
	150	7	1,60	3	2,10	10	1,70
	199	0	0,00	3	1,90	3	0,50
	200	98	22,20	49	32,50	147	24,80
	250	37	8,40	11	7,60	49	8,20
	300	143	32,40	26	17,70	170	28,70
	350	4	0,80	1	0,50	4	0,70
	399	0	0,00	1	0,90	1	0,20
	400	20	4,50	3	1,80	23	3,80
	450	0	0,00	0	0,20	0	0,10
	499	0	0,00	2	1,20	2	0,30
	500	22	4,90	14	9,20	35	6,00
	600	0	0,10	1	0,80	2	0,30
	800	0	0,10	0	0,00	0	0,10
1000	2	0,50	0	0,00	2	0,40	
1500	0	0,00	2	1,10	2	0,30	
2000	2	0,50	0	0,00	2	0,40	
<b>Réaction en cas de prix plus élevé que celui qu'on est prêt à payer (confiance)</b>	<b>Chercher une autre marque moins chère</b>	106	24,00	49	32,80	155	26,30
	<b>Chercher la même marque à un endroit où le produit est moins cher</b>	229	51,90	67	44,90	297	50,10
	<b>Arrêter d'utiliser</b>	106	24,00	33	22,30	140	23,60

- L'injectable Harmonia®

Pour ce qui est de l'injectable Harmonia®, 80% des femmes de la population cible ne connaissent pas le coût de la boîte. C'est la même proportion en milieu péri-urbain et en milieu rural.

Concernant, le prix de la boîte de Harmonia®, il varie entre 475 FCFA et 6000 FCFA selon les utilisatrices. Ainsi, pour la majorité d'entre elles (36,7%), le prix de la boîte de Harmonia® est de 1000 FCFA. Pour 25,3% des utilisatrices, la boîte de Harmonia® coûte 1500 FCFA.

Concernant leur perception du coût de la boîte de Harmonia®, la majorité des utilisatrices (78,4%) le jugent abordable. À l'opposé, 17% des utilisatrices pensent que le coût de la boîte de Harmonia® est élevé.

19 des utilisatrices sont prêtes à acheter la boîte de Harmonia® au prix le plus élevé de 2000 FCFA. Pour un prix le plus élevé de 1000, ce sont environ 14,3% d'utilisatrice qui sont prête à faire l'achat.

C'est sensiblement la même proportion d'utilisatrices pour l'achat au prix le plus élevé de 5000 FCFA.

Cependant, 39,6% des utilisatrices estiment que si la boîte de Harmonia® descend au prix le plus bas de 500 FCFA, elles ne l'achèteraient pas.

Quant à leur réaction en cas de prix plus élevé que celui qu'elles sont prêtes à payer pour la boîte de Harmonia®, si la majorité des utilisatrices (45,2%) affirment qu'elles chercheront la même marque à un endroit où le produit est moins cher, 27,7% des utilisatrices soutiennent qu'elles chercheront une autre marque moins chère tandis que 27,1% des utilisatrices disent qu'elles arrêteront d'utiliser Harmonia.

Tableau 56: Connaissance et perceptions des prix de Harmonia par les femmes de 25-35 ans selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
<b>Connaissance du coût de la boîte de harmonia</b>	<b>Oui</b>	242	21,20	92	17,40	334	20,00
	<b>Non</b>	897	78,80	437	82,60	1334	80,00
	<b>Total</b>	1139	100,00	529	100,00	1668	100,00
<b>Prix de la boîte de harmonia</b>	<b>475</b>	1	0,20	0	0,00	1	0,20
	<b>500</b>	2	1,00	1	1,50	4	1,10
	<b>650</b>	0	0,20	0	0,00	0	0,10
	<b>700</b>	0	0,00	2	2,40	2	0,70
	<b>1000</b>	84	34,60	39	42,20	122	36,70
	<b>1035</b>	0	0,00	1	1,50	1	0,40
	<b>1100</b>	22	9,20	3	2,80	25	7,40
	<b>1130</b>	0	0,00	1	0,70	1	0,20
	<b>1150</b>	4	1,50	1	0,70	4	1,30
	<b>1200</b>	5	2,30	2	2,60	8	2,40
	<b>1250</b>	0	0,00	1	0,60	1	0,20
	<b>1300</b>	1	0,40	0	0,00	1	0,30
	<b>1500</b>	57	23,80	27	29,50	85	25,30
	<b>1650</b>	0	0,10	0	0,00	0	0,10
	<b>1700</b>	3	1,40	0	0,00	3	1,00
	<b>1750</b>	0	0,20	0	0,00	0	0,10
	<b>2000</b>	24	10,10	7	8,10	32	9,50
	<b>2300</b>	3	1,20	0	0,00	3	0,90
	<b>2500</b>	1	0,40	1	1,00	2	0,60
	<b>3000</b>	29	11,90	6	6,30	35	10,40
<b>4500</b>	1	0,20	0	0,00	1	0,20	
<b>5000</b>	3	1,40	0	0,00	3	1,00	
<b>6000</b>	0	0,10	0	0,00	0	0,10	
<b>Comment jugez-vous le prix de la boîte de harmonia</b>	<b>Bas</b>	12	5,10	3	3,30	15	4,60
	<b>Abordable</b>	189	78,20	72	78,80	262	78,40
	<b>Élevé</b>	40	16,60	16	17,90	57	17,00
	<b>Ne sait pas/Sans réponse</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Prix le plus élevé que vous seriez disposé(e) à payer harmonia</b>	<b>500</b>	7	2,90	7	7,60	14	4,20
	<b>550</b>	0	0,00	1	0,80	1	0,20
	<b>600</b>	2	0,80	1	0,60	3	0,80
	<b>700</b>	1	0,20	2	1,80	2	0,70
	<b>800</b>	0	0,20	2	2,60	3	0,90
	<b>1000</b>	35	14,60	13	13,80	48	14,30
	<b>1050</b>	3	1,20	0	0,00	3	0,90

1100	4	1,70	1	1,10	5	1,50
1200	3	1,20	3	3,40	6	1,80
1250	0	0,00	1	0,60	1	0,20
1300	1	0,60	0	0,00	1	0,40
1500	24	10,10	16	17,40	40	12,10
1550	0	0,10	0	0,00	0	0,10
1600	0	0,00	1	0,70	1	0,20
1700	0	0,20	0	0,40	1	0,20
2000	47	19,40	16	17,90	63	19,00
2100	0	0,00	1	1,30	1	0,40
2200	1	0,30	0	0,00	1	0,20
2300	4	1,80	0	0,00	4	1,30
2500	20	8,30	11	12,00	31	9,30
3000	37	15,40	7	7,20	44	13,10
3500	4	1,60	1	1,20	5	1,50
4000	2	1,00	1	1,50	4	1,10
5000	40	16,40	7	7,40	47	14,00
6000	1	0,20	0	0,40	1	0,30
7000	2	0,80	0	0,00	2	0,60
8000	0	0,10	0	0,00	0	0,10
10000	2	0,90	0	0,00	2	0,70
<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>0,80</b>
<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1,10</b>	<b>1</b>	<b>0,30</b>
<b>25</b>	<b>1</b>	<b>0,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,20</b>
<b>50</b>	<b>5</b>	<b>2,00</b>	<b>1</b>	<b>0,90</b>	<b>6</b>	<b>1,70</b>
<b>100</b>	<b>12</b>	<b>5,10</b>	<b>7</b>	<b>8,00</b>	<b>20</b>	<b>5,90</b>
<b>150</b>	<b>1</b>	<b>0,50</b>	<b>2</b>	<b>1,90</b>	<b>3</b>	<b>0,90</b>
<b>200</b>	<b>30</b>	<b>12,30</b>	<b>9</b>	<b>9,40</b>	<b>38</b>	<b>11,50</b>
<b>250</b>	<b>9</b>	<b>3,70</b>	<b>2</b>	<b>1,80</b>	<b>11</b>	<b>3,20</b>
<b>300</b>	<b>20</b>	<b>8,40</b>	<b>13</b>	<b>14,30</b>	<b>33</b>	<b>10,00</b>
<b>350</b>	<b>3</b>	<b>1,20</b>	<b>0</b>	<b>0,40</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>
<b>400</b>	<b>14</b>	<b>5,60</b>	<b>1</b>	<b>1,60</b>	<b>15</b>	<b>4,50</b>
<b>500</b>	<b>94</b>	<b>38,90</b>	<b>38</b>	<b>41,40</b>	<b>132</b>	<b>39,60</b>
<b>600</b>	<b>1</b>	<b>0,60</b>	<b>1</b>	<b>1,10</b>	<b>2</b>	<b>0,70</b>
<b>700</b>	<b>1</b>	<b>0,50</b>	<b>5</b>	<b>5,80</b>	<b>7</b>	<b>2,00</b>
<b>750</b>	<b>2</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,70</b>
<b>800</b>	<b>10</b>	<b>4,20</b>	<b>1</b>	<b>1,20</b>	<b>11</b>	<b>3,30</b>
<b>900</b>	<b>1</b>	<b>0,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,30</b>
<b>1000</b>	<b>27</b>	<b>11,20</b>	<b>8</b>	<b>9,00</b>	<b>35</b>	<b>10,60</b>
<b>1008</b>	<b>0</b>	<b>0,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,10</b>
<b>1500</b>	<b>3</b>	<b>1,30</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>4</b>	<b>1,20</b>
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>0,80</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>0,80</b>
<b>3001</b>	<b>2</b>	<b>0,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,70</b>
<b>Réaction en cas de prix plus élevé que celui qu'on est prêt à payer (harmonia)</b>						
<b>Chercher une autre marque moins chère</b>	<b>60</b>	<b>25,00</b>	<b>32</b>	<b>35,10</b>	<b>93</b>	<b>27,70</b>
<b>Chercher la même marque à un endroit où le produit est moins cher</b>	<b>111</b>	<b>45,80</b>	<b>40</b>	<b>43,50</b>	<b>151</b>	<b>45,20</b>
<b>Arrêter d'utiliser</b>	<b>71</b>	<b>29,20</b>	<b>20</b>	<b>21,40</b>	<b>90</b>	<b>27,10</b>

## CHAPITRE 8 : EXPOSITION AUX MEDIAS ET AUX ACTIVITES DE L'AIMAS

### 8.1. Femmes de 25-35 ans en union

#### 8.1.1. Presse écrite

Les femmes de 25 à 35 ans en union dans les zones d'intervention de l'AIMAS en majorité (90%) ne lisent pas de journal ou magazine. La faible proportion d'entre elles, qui lisent un journal ou magazine, a cité les journaux Fraternité Matin, Gbich et Top Visage comme leurs favoris.

Tableau 57: Presse écrite lue par les Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
Lisez-vous un journal ou un magazine	Presque tous les jours	38	3,00	8	1,10	46	2,30
	Au moins une fois par semaine	68	5,30	15	2,10	82	4,20
	Moins d'une fois par semaine	63	4,90	6	0,80	69	3,50
	Pas du tout	1113	86,80	659	95,90	1773	90,00
	<b>Total</b>	<b>1282</b>	<b>100,00</b>	<b>687</b>	<b>100,00</b>	<b>1970</b>	<b>100,00</b>
Quel journal lisez-vous le plus souvent ?	Fraternité matin	52	30,70	8	27,30	59	30,20
	Top Visage	22	13,10	4	15,30	26	13,40
	Prestige magazine	2	0,90	0	1,70	2	1,00
	Star magazine	21	12,40	2	5,70	23	11,50
	Gbich	24	14,30	2	8,20	27	13,50
	Notre voie	6	3,60	0	0,00	6	3,10
	Le temps	7	3,90	0	0,00	7	3,40
	Patriote	6	3,70	0	0,00	6	3,10
	Nouveau réveil	2	1,50	0	0,00	2	1,30
	Autre	24	14,00	12	41,80	35	18,00
	Ne sait pas	3	2,00	0	0,00	3	1,70
	<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>100,00</b>	<b>28</b>	<b>100,00</b>	<b>197</b>	<b>100,00</b>

#### 8.1.2. Radio

La proportion des femmes de la population cible qui écoute la radio se situe à un peu plus de 39%. Ces femmes préfèrent écouter la radio nostalgie, la radio fréquence 2 et les chaînes de radios locales. Celles qui écoutent la radio le font essentiellement entre 6h et 10h (44,4%) ou entre 18h et 22h (27,4%).

Tableau 58: Moments d'écoute de la radio par les Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
Écoutez-vous la radio ...	Presque tous les jours	177	13,80	122	17,80	299	15,20
	Au moins une fois par semaine	233	18,10	86	12,50	319	16,20
	Moins d'une fois par semaine	120	9,40	40	5,80	160	8,10
	Pas du tout	753	58,70	439	63,90	1192	60,50
	<b>Total</b>	<b>1282</b>	<b>100,00</b>	<b>687</b>	<b>100,00</b>	<b>1970</b>	<b>100,00</b>
Radio Nationale : Fréquence 2		84	15,80	32	12,80	115	14,80

Quelle chaîne de radio écoutez-vous le plus souvent ?	Radio Nationale : Côte d'Ivoire	41	7,80	57	23,00	98	12,60
	Nostalgie	184	34,80	55	22,00	239	30,70
	Jam FM	19	3,60	1	0,40	20	2,60
	ONUCI FM	2	0,40	2	0,70	4	0,50
	Chaîne internationales (RFI/BBC etc.)	41	7,70	12	4,90	53	6,80
	Chaîne locale	157	29,70	85	34,30	242	31,20
	Ne sait pas	2	0,30	4	1,80	6	0,80
	<b>Total</b>	<b>530</b>	<b>100,00</b>	<b>248</b>	<b>100,00</b>	<b>778</b>	<b>100,00</b>
À quel moment de la journée écoutez-vous le plus souvent la radio ?	6h01-8h	143	27,10	78	31,50	221	28,50
	8h01-10h	101	19,00	27	11,00	128	16,40
	10h01-12h	27	5,20	13	5,20	40	5,20
	12h01-14h	21	3,90	6	2,50	27	3,50
	14h01-16h	20	3,80	5	2,00	25	3,20
	16h01-18h	38	7,30	41	16,40	79	10,20
	18h01-20h	56	10,70	29	11,80	86	11,00
	20h01-22h	95	18,00	33	13,10	128	16,40
	22h01-24h	23	4,30	12	5,00	35	4,50
	24h01-06h	5	0,90	4	1,50	8	1,10

### 8.1.3. Télévision

Contrairement à la presse écrite et à la radio, la télévision rencontre plus de succès auprès des femmes. En effet, dans l'ensemble, près de 60% d'entre elles regardent la télévision presque tous les jours. En milieu périurbain ce sont 7 femmes sur 10 de la population cible qui regarde la télévision presque tous les jours. Les chaînes de télévision les plus prisées sont la RTI 1, les chaînes de télévisions internationales (TF1, France 24) et les autres chaînes ivoiriennes (A+, Life TV, NCI, Al Bayane, La 3). La plage horaire qui rencontre la plus forte audience est entre 18h et 22h soit 56,4% des femmes qui regardent la télévision.

Tableau 59: Chaînes de télévision regardées par les Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
Regardez-vous la télévision...	Presque tous les jours	899	70,10	268	39,00	1167	59,30
	Au moins une fois par semaine	219	17,10	119	17,30	338	17,20
	Moins d'une fois par semaine	59	4,60	58	8,40	117	5,90
	Pas du tout	105	8,20	242	35,30	347	17,60
Quelle chaîne de télévision regardez-vous le plus souvent ?	RTI 1	167	14,20	135	30,40	302	18,60
	RTI 2	90	7,70	59	13,30	149	9,20
	RTI Bouaké	5	0,40	6	1,40	11	0,70
	Chaîne télé internationales (TF1, France 24 etc.)	321	27,30	66	14,80	387	23,80
	Autre chaîne ivoirienne (A+, Life TV, NCI, Al bayane, La 3)	450	38,20	83	18,60	533	32,80
	Autre	143	12,20	96	21,60	240	14,80
A quel moment de la journée regardez-vous le plus souvent la télévision ?	6h01-8h	24	2,00	5	1,00	29	1,80
	8h01-10h	49	4,20	13	2,90	62	3,80
	10h01-12h	66	5,60	12	2,80	79	4,80
	12h01-14h	77	6,50	10	2,30	87	5,40
	14h01-16h	79	6,70	25	5,60	104	6,40
	16h01-18h	222	18,90	70	15,70	292	18,00
	18h01-20h	241	20,50	119	26,60	360	22,20
	20h01-22h	379	32,20	175	39,30	554	34,20

22h01-24h	38	3,20	17	3,80	54	3,30
24h01-06h	1	0,10	0	0,00	1	0,10

#### 8.1.4. Portée des actions publicitaires

Les actions publicitaires menées par l'AIMAS au cours des trois dernières années ont touchées 44,8% des femmes de la population cible en particulier en milieu périurbain (49,3%). Plus de la moitié de celles qui ont entendu ou vu une action publicitaire de l'AIMAS ont été touchées plus de cinq fois et le principal canal par lequel elles ont eu accès à ces actions publicitaires demeurent de loin la télévision soit plus de 83%.

Tableau 60: Les actions publicitaires de l'AIMAS suivies par les Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
<b>Avez-vous vu ou entendu une publicité de la méthode « injectable ou Harmonia ou planning familiale » au cours des 3 dernières années ?</b>	Non	650	50,70	438	63,80	1088	55,20
	Oui	632	49,30	249	36,20	882	44,80
	<b>Total</b>	<b>1282</b>	<b>100,00</b>	<b>687</b>	<b>100,00</b>	<b>1970</b>	<b>100,00</b>
<b>Où avez-vous vu ou entendu cette publicité ?</b>							
<b>Télévision</b>	Non	72	11,40	77	31,10	150	17,00
	Oui	560	88,60	172	68,90	732	83,00
<b>Radio</b>	Non	563	89,00	205	82,50	768	87,20
	Oui	70	11,00	44	17,50	113	12,80
<b>Activités de sensibilisation AIMAS</b>	Non	620	98,10	244	97,90	864	98,00
	Oui	12	1,90	5	2,10	17	2,00
<b>Centre de santé</b>	Non	486	76,90	184	73,70	670	76,00
	Oui	146	23,10	66	26,30	211	24,00
<b>Pharmacie</b>	Non	605	95,70	245	98,40	850	96,40
	Oui	27	4,30	4	1,60	31	3,60
<b>Prospectus/ dépliant / affiche (hors centre de santé et pharmacie)</b>	Non	617	97,50	247	99,40	864	98,00
	Oui	16	2,50	2	0,60	18	2,00
<b>Visite/rencontre avec agents ONG</b>	Non	630	99,70	244	98,00	874	99,20
	Oui	2	0,30	5	2,00	7	0,80
<b>Autre</b>	Non	615	97,20	236	94,80	851	96,50
	Oui	18	2,80	13	5,20	31	3,50
<b>Combien de fois avez-vous entendu ou vu cette publicité ?</b>	1 ou 2 fois	140	22,20	61	24,50	201	22,80
	Entre 3 et 5 fois	178	28,10	55	22,20	233	26,40
	Plus de 5 fois (plusieurs fois)	310	49,00	132	53,20	442	50,20
	Ne sait pas	5	0,70	0	0,10	5	0,60

#### 8.1.5. Portée des actions de sensibilisation

Au niveau des actions de sensibilisation, il convient de retenir que leur portée est relativement très faible par rapport aux actions de publicité. En effet, moins d'une femme sur dix de la population cible affirme avoir été touchée par une action de sensibilisation.

Tableau 61: Participation des Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence aux actions de sensibilisation de l'AIMAS

		Milieu de résidence				Ensemble	
		Périurbain		Rural		Nombre	(%)
		Nombre	(%)	Nombre	(%)		
<b>Avez-vous participé ou suivi une activité de sensibilisation</b>							
<b>Visite à domicile</b>	<b>Non</b>	1265	98,60	679	98,70	1944	98,70
	<b>Oui</b>	18	1,40	9	1,30	26	1,30
<b>Causerie de groupe</b>	<b>Non</b>	1239	96,60	671	97,70	1910	97,00
	<b>Oui</b>	44	3,40	16	2,30	60	3,00
<b>Animation publique</b>	<b>Non</b>	1245	97,10	641	93,30	1886	95,70
	<b>Oui</b>	38	2,90	46	6,70	84	4,30
<b>Aucune</b>	<b>Non</b>	95	7,40	66	9,60	160	8,10
	<b>Oui</b>	1188	92,60	622	90,40	1809	91,90
<b>Qui a animé ou organisé ces activités ?</b>							
<b>Agent de l'ONG/association</b>	<b>Non</b>	82	85,10	58	86,40	140	85,60
	<b>Oui</b>	14	14,90	9	13,60	23	14,40
<b>Agent de l'AIMAS</b>	<b>Non</b>	75	77,70	58	85,80	133	81,00
	<b>Oui</b>	21	22,30	10	14,20	31	19,00
<b>Agent de santé</b>	<b>Non</b>	50	52,00	23	34,20	73	44,70
	<b>Oui</b>	46	48,00	44	65,80	91	55,30
<b>Autre</b>	<b>Non</b>	81	83,70	63	93,60	144	87,80
	<b>Oui</b>	16	16,30	4	6,40	20	12,20
<b>Combien de fois avez-vous suivi ou participé à ces activités de sensibilisation</b>	<b>1 à 2 fois</b>	58	60,30	32	47,10	90	54,90
	<b>Entre 3 à 5 fois</b>	20	20,70	15	22,20	35	21,30
	<b>Plus de 5 fois (plusieurs fois)</b>	18	18,80	21	30,70	39	23,70
	<b>Ne sait pas</b>	0	0,10	0	0,00	0	0,10

## 8.2. Conjoints des femmes de 25-35 ans en union

### 8.2.1. Presse écrite

La presse écrite ne rencontre également pas un grand succès auprès des conjoints des femmes de la population cible dans la mesure où trois conjoints sur quatre ne lisent pas du tout le journal. Pour ceux qui lisent les journaux, les quotidiens *Fraternité Matin* et dans une moindre mesure *le Patriote*, *le temps* et *le nouveau réveil*.

Tableau 62: Presse écrite lue par conjoints des Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence

		Milieu de résidence		Ensemble (N=1305)
		Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
Lisez-vous un journal ou un magazine ... ?	Presque tous les jours	11,7	4,4	9,3
	Au moins une fois par semaine	9,1	2,8	7,0
	Moins d'une fois par semaine	12,2	2,6	9,1
	Pas du tout	67,1	90,2	74,5
Quel journal lisez-vous le plus souvent ?	Fraternité matin	62,4	53,8	61,3
	Top Visage	0,0	0,0	0,0
	Prestige magazine	0,1	3,0	0,5
	Star magazine	0,5	0,5	0,5
	Gbich	0,8	0,0	0,7
	Notre voie	1,8	6,2	2,4
	Le temps	8,7	8,1	8,6
	Patriote	11,6	5,0	10,8
	Nouveau réveil	9,0	8,6	8,9

Autre	4,2	14,8	5,5
Ne sait pas	0,9	0,0	0,7

### 8.2.2. Radio

En ce qui concerne la Radio, elle est plus écoutée chez les conjoints que chez leurs femmes dans la mesure où trois conjoints sur quatre écoute la radio au moins une fois dans la semaine. Ceux-ci écoutent en majorité la radio nationale de Côte d'Ivoire et les radios internationales d'informations (RFI, BBC). La plage horaire la plus propice à l'écoute de la radio chez les hommes se situe entre 6h et 10h soit plus de 55% d'entre les conjoints amateurs de radio.

**Tableau 63: Moments d'écoute de la radio par les conjoints des Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence		Ensemble (N=1305)
		Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
Écoutez-vous la radio... ?	Presque tous les jours	32,6	41,4	35,4
	Au moins une fois par semaine	20,2	16,0	18,8
	Moins d'une fois par semaine	25,6	15,8	22,5
	Pas du tout	21,6	26,8	23,3
Quelle chaîne de radio écoutez-vous le plus souvent ?	Radio National : Fréquence 2	10,8	17,1	12,8
	Radio National : Côte d'Ivoire	25,1	25,4	25,2
	Nostalgie	13,2	12,9	13,1
	Jam FM	4,9	0,3	3,5
	ONUCI FM	1,3	0,7	1,1
	Chaîne internationales (RFI/BBC etc.)	31,5	22,8	28,9
	Chaîne locale	12,2	19,7	14,5
	Ne sait pas	0,9	1,1	1,0
À quel moment de la journée écoutez-vous le plus souvent la radio ?	6h01-8h	42,1	43,7	42,6
	8h01-10h	13,8	12,3	13,3
	10h01-12h	3,5	2,6	3,2
	12h01-14h	2,4	0,8	1,9
	14h01-16h	2,8	1,7	2,5
	16h01-18h	6,4	6,2	6,3
	18h01-20h	10,6	16,7	12,5
	20h01-22h	13,1	10,2	12,2
	22h01-24h	4,0	4,5	4,1
	24h01-06h	1,4	1,4	1,4

### 8.2.3. Télévision

Tout comme chez les femmes, la télévision est le média qui a le plus de succès chez les hommes avec près de 90% d'entre eux qui regardent la télévision au moins une fois par semaine en particulier en milieu périurbain (95%). Les chaînes avec une plus forte audience sont respectivement la RTI1 (en particulier en milieu rural) et les chaînes internationales (France 24, TF1, etc). Les heures où les conjoints sont devant leur petit écran se situent pour 95% d'entre eux entre 20h et 24h en particulier entre 20h et 22h pour la majorité.

**Tableau 64: Chaînes de télévision regardées par les conjoints des Femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence		Ensemble (N=1305)
		Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
Regardez-vous la télévision ... ?	Presque tous les jours	53,6	36,4	48,1
	Au moins une fois par semaine	27,0	20,9	25,1
	Moins d'une fois par semaine	14,3	23,0	17,1
	Pas du tout	5,0	19,6	9,7

Quelle chaîne de télévision regardez-vous le plus souvent ?	RTI 1	39,7	54,6	43,9
	RTI 2	2,7	5,8	3,6
	RTI Bouaké	0,0	0,1	0,0
	Chaîne télé internationales (TF1, France 24 etc.)	38,9	21,0	33,8
	Autre chaîne ivoirienne (A+, Life TV, NCI, Al Bayane, La 3)	18,0	14,4	17,0
	Autre	0,7	4,2	1,7
À quel moment de la journée regardez-vous le plus souvent la télévision ?	6h01-8h	0,0	1,4	0,4
	8h01-10h	0,4	0,0	0,3
	10h01-12h	0,7	0,4	0,6
	12h01-14h	1,2	0,7	1,0
	14h01-16h	1,0	0,7	0,9
	16h01-18h	1,3	3,1	1,8
	18h01-20h	12,1	15,7	13,1
	20h01-22h	65,7	66,6	66,0
	22h01-24h	16,6	11,0	15,0
	24h01-06h	1,0	0,4	0,8

#### 8.2.4. Portée des actions publicitaires

Les conjoints des femmes de la populations cibles ont été plus touchés que leurs femmes par les actions publicitaires de l'AIMAS avec plus de 76% qui ont affirmé avoir vu ou entendu une publicité sur les produits contraceptifs de l'AIMAS. Les principaux canaux par lesquels ils ont été touchés sont la télévision et la radio.

**Tableau 65: Les actions publicitaires de l'AIMAS suivies par les conjoints des femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence**

		Milieu de résidence		Ensemble (N=1305)
		Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
Avez-vous vu ou entendu une publicité de la méthode « injectable ou Harmonia ou planning familiale » au cours des 3 dernières années ?	Non	20,8	29,0	23,4
	Oui	79,2	71,0	76,6
Où avez-vous vu ou entendu cette publicité ?				
Télévision	Non	26,1	31,5	28,2
	Oui	73,9	68,5	71,8
Radio	Non	68,6	70,8	69,4
	Oui	31,4	29,2	30,6
Activités de sensibilisation AIMAS	Non	99,4	97,5	98,6
	Oui	0,6	2,5	1,4
Centre de santé	Non	72,8	79,9	75,6
	Oui	27,2	20,1	24,4
Pharmacie	Non	90,9	98,6	93,9
	Oui	9,1	1,4	6,1
Prospectus/ dépliant / affiche (hors centre de santé et pharmacie)	Non	95,6	90,3	93,5
	Oui	4,4	9,7	6,5
Visite/rencontre avec agents ONG	Non	98,8	100,0	99,3
	Oui	1,2	0,0	0,7
Autre	Non	99,7	90,7	96,1
	Oui	0,3	9,3	3,9
Combien de fois avez-vous entendu ou vu cette publicité ?	1 ou 2 fois	30,5	19,3	26,0
	Entre 3 et 5 fois	36,7	41,8	38,7

Plus de 5 fois (plusieurs fois)	32,8	37,5	34,7
Ne sait pas	0,0	1,5	0,6

### 8.2.5. Portée des actions de sensibilisation

Les actions de sensibilisation ont également une faible portée au niveau des conjoints des femmes de la population cible. Seulement environ 5% d'entre eux ont affirmé avoir participé à des actions de sensibilisation organisé par l'AIMAS.

**Tableau 66: Participation des conjoints des femmes de 25-35 ans en union selon le milieu de résidence aux actions de sensibilisation de l'AIMAS**

		Milieu de résidence		Ensemble (N=1305)
		Périurbain (N=699)	Rural (N=606)	
<b>Avez-vous participé ou suivi une activité de sensibilisation</b>				
Visite à domicile	Non	99,4	99,3	99,4
	Oui	0,6	0,7	0,6
Causerie de groupe	Non	96,9	98,2	97,3
	Oui	3,1	1,8	2,7
Animation publique	Non	98,6	96,0	97,8
	Oui	1,4	4,0	2,2
Aucune	Non	4,8	6,7	5,4
	Oui	95,2	93,3	94,6
Autre	Non	100,0	99,4	99,8
	Oui	0,0	0,6	0,2
<b>Qui a animé ou organisé ces activités ?</b>				
Agent de l'ONG/association	Non	95,0	91,0	93,4
	Oui	5,0	9,0	6,6
Agent de l'AIMAS	Non	94,0	75,0	86,5
	Oui	6,0	25,0	13,5
Agent de santé	Non	35,2	39,2	36,8
	Oui	64,8	60,8	63,2
Autre	Non	75,8	94,8	83,3
	Oui	24,2	5,2	16,7
Combien de fois avez-vous suivi ou participé à ces activités de sensibilisation	1 à 2 fois	66,2	54,2	61,5
	Entre 3 à 5 fois	23,2	6,0	16,4
	Plus de 5 fois	10,6	36,4	20,8
	Ne sait pas	0,0	3,5	1,4

---

## CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

---

Cette étude vise d'une manière générale à fournir des informations sur les niveaux de l'utilisation des méthodes contraceptives et des facteurs d'opportunité, de capacité et de motivation (OCM) liés à l'utilisation des méthodes modernes de contraception chez les femmes en union de 25-35 ans vivant en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS.

Elle permet d'avancer les informations suivantes sur les principaux indicateurs :

### **Indicateurs de comportement**

On note une évolution sensible de la proportion des femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention utilisant une méthode contraceptive moderne. Cette proportion est de 34,8% en 2021 contre 29,2% en 2016.

Concernant les conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain, 16,2% d'entre eux ayant eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois ont déclaré avoir utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels contre 21,7% en 2016. On note une baisse de 5,5 points

### **Déterminants d'opportunité**

En 2021, 74,6% des femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS, affirment qu'on peut trouver facilement les pilules contre 74,5% qui soutenait cette affirmation en 2016.

71,4% des femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS affirment qu'on peut trouver facilement les injectables contre 66,3% en 2016.

65,6% des femmes en union de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirment qu'on peut trouver facilement les DIU.

### **Déterminants de capacité**

#### ***Connaissance***

Les femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS, connaissent les méthodes modernes de contraception comme la pilule, le condom, l'injectable et le DIU. Dans ce groupe de femmes, 92,8% ont entendu parler de Pilule ; 84,8% de l'Injectable. Seulement 28,9% ont entendu parler du DIU et 93,4% du Condom.

Les femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention ont une connaissance approfondie des méthodes modernes de contraception : pilule, condom, injectable et DIU. Nous avons 49,8% qui ont une connaissance approfondie de la pilule et 74,1% qui ont une connaissance approfondie du condom. Les femmes ayant une connaissance approfondie de l'injectable représentent 29,8% des répondants et pour le DIU, ce sont 27,3% qui en ont une connaissance approfondie.

#### ***Efficacité personnelle***

83,9% des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirment qu'elles sont capables d'utiliser une méthode moderne de contraception pour éviter une grossesse non désirée.

82,3% des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention affirmant qu'elles peuvent parler de l'utilisation d'une méthode moderne de planification familiale à leur conjoint pour éviter une grossesse non désirée.

On note ici, une hausse des taux d'efficacité personnelle des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention AIMAS par rapport à 2016 qui se situaient aux alentours de 80%.

## **Soutien Social**

Le taux de conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et périurbain dans les zones d'intervention qui sont d'accord pour encourager leurs épouses dans la décision d'adopter une méthode moderne de contraception pour éviter une grossesse non désirée a sensiblement baissé passant de 82% en 2016 à 65% en 2021 ;

57,9% des conjoints des femmes de 25-35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS discutent de la planification familiale dans leur couple.

## **Déterminants de motivation**

### **Menace**

Les femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS, ont une conscience des risques liés aux grossesses non désirées.

88,6% des femmes interrogés reconnaissent que les femmes qui ont des grossesses trop rapprochées souffrent habituellement de problèmes de santé.

87,3% des femmes de 25-35 ans en milieu rural et périurbain dans les zones d'intervention de l'AIMAS reconnaissent que le risque de décès maternel est plus élevé si la femme a des grossesses chaque année.

84% de ces femmes reconnaissent que la non utilisation de méthodes contraceptives moderne peut favoriser la survenue d'une grossesse.

## **Évolution des indicateurs clés entre 2016 et 2021**

En somme, on note une baisse significative de 06 indicateurs sur 15 soit un score de 40%. Ces indicateurs sont :

- *Utiliser un condom au cours des derniers rapports sexuels : - 05,5 points ;*
- *Capable d'utiliser une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée : -03,8 point ;*
- *Peuvent parler de l'utilisation d'une méthode moderne de planification familiale à leur conjoint pour éviter une grossesse non désirée : -02,9 points ;*
- *D'accord pour encourager leurs épouses dans la décision d'adopter une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée : -16,3 points ;*
- *Le risque de décès maternel est plus élevé si la femme a des grossesses chaque année : - 6 points ;*
- *Si je n'utilise pas de méthode contraceptive moderne, je vais tomber enceinte : - 09,2 points.*

Cependant, une hausse est observée concernant 09 indicateurs sur 15 soit un score de 60%.

L'exposition aux médias peut être décrite de la façon suivante :

90% des femmes de 25-35 en union en zone périurbaine et 95,7% en zone urbaine ne lisent pas de journaux ;

60,5% des femmes de 25-35 en union en zone périurbaine et 61% en zone urbaine n'écoutent pas du tout la radio ;

Les chaînes de radio locales (34,3%) en zone rurale et Nostalgie (34,8%) en zone péri-urbaine sont les plus écoutées par les femmes de 25-35 en union.

Les autres chaînes de télévision ivoiriennes (32,8%) sont les chaînes les plus regardées par les enquêtées.

## **Recommandations**

Au terme de cette étude, des recommandations peuvent être formulées concernant les deux principales tendances d'évolution des indicateurs de suivi des actions de l'AIMAS :

- [1] Rendre toujours disponibles les contraceptifs injectables et le DIU pour augmenter encore et/ou maintenir le taux d'utilisation actuel ;
- [2] Intensifier la sensibilisation en vue de maintenir le niveau de connaissance et l'opportunité d'utilisation des contraceptifs, à la hausse ;
- [3] Sensibiliser d'avantage les époux à l'utilisation de condom au cours des rapports sexuels dans un contexte de multi partenariat sexuel ;
- [4] Renforcer les capacités des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain afin qu'elles puissent parler de l'utilisation d'une méthode moderne de contraception à leur conjoint pour éviter une grossesse non désirée ;
- [5] Faire des campagnes de sensibilisation à l'intention des hommes en vue d'accroître leur implication et leur soutien dans la décision d'adopter une méthode moderne de contraception pour éviter une grossesse non désirée chez leurs épouses ;
- [6] Intensifier la sensibilisation des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain sur les risques des grossesses rapprochés en vue de réduire les décès maternels ;
- [7] Élaborer de nouvelles stratégies de communication en vue de réduire les menaces et accroître la motivation des femmes en union de 25 à 35 ans en milieu rural et péri-urbain à l'utilisation des contraceptifs ;
- [8] Accroître la capacité personnelle des femmes par la réalisation de film-documentaires sur le concept "*si je n'utilise pas de méthode contraceptive moderne, je vais tomber régulièrement enceinte et je peux ainsi perdre la vie*" ;
- [9] Favoriser l'utilisation de la télévision pour les actions publicitaires à l'endroit des femmes et le couple télévision/radio pour les actions en faveur des hommes en tenant compte des heures de fortes audiences c'est-à-dire soit en 6h et 10h ou entre 20h et 22h.

---

## REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

---

Cours de formation sur l'éthique de la recherche destinée aux représentants communautaires, Family Health International,

**YAO K. Albert**, La problématique du phénomène de la grossesse des adolescentes en milieu scolaire ivoirien : étude de cas, doctorat thèse unique de l'Université Félix Houphouët Boigny de Cocody-Abidjan, Novembre 2014.

Côte d'Ivoire (2016) : étude TRAC-PF pour le suivi de l'utilisation de méthodes contraceptives modernes chez les femmes en union de 25-35ans dans les zones d'intervention de l'AIMAS, rapport d'étude de AIMAS Côte d'Ivoire, décembre 2016

UNFPA, Santé de la Reproduction des Adolescents en milieu scolaire  
-Boîte à outils pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents en situations de crise humanitaire, Document accompagnant le Manuel de terrain inter organisations sur la santé reproductive en situations de crise humanitaire

Politique nationale de sante de la reproduction, de REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, juillet 2008

Santé de la Reproduction, Ouagadougou, Population Council, Burkina Faso 2 Mai, 2011

Le Projet AgirPF. 2015. Manuel de formation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, et l'offre de services adaptés aux besoins des adolescents et des jeunes. Togo : EngenderHealth/Le Projet AgirPF.

Prof. Dr Antonio Gerbase, La santé sexuelle et reproductive : un enjeu international de santé publique, mars 2015, Direction Générale de la Santé, France

Ministère du plan et du développement : EDS-CI 2020 : Enquête Démographique et de Santé de Côte d'Ivoire, 2020

Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016, Côte d'Ivoire, 2016, UNICEF  
Institut National de la Statistique (INS), Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF)

# ANNEXES

## ANNEXE A : QUESTIONNAIRE FEMME



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE



### ETUDE SUR L'UTILISATION DE METHODES CONTRACEPTIVES MODERNES CHEZ LES FEMMES EN UNION EN CÔTE D'IVOIRE

Questionnaire Femme N° :

Ville \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | Quartier/Village \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ |

N°DR : / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /

N°MENAGE : / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / N° ligne Femme / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /

Milieu de résidence : 1=Péri-urbain      2=Rural

Date de l'interview : / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2020

Visite de l'enquêteur				
	1	2	3	
Date	----- --	-----	----- ---	Nombre total de visite  _____
Nom/Code enquêteur	----- -   __ __	-----   __ __	----- ---   __ __	
Nom / Code Superviseur	----- -   __ __	-----   __ __	----- ---   __ __	
Prochaine Visite Date Heures	----- --  ----- --	-----  ----- -----	----- ---  ----- ---	
Résultats	----- --	-----	----- ---	
Code résultats 1=Achévé 2=Absence 3=Reporté	4=Refus de répondre  5=Partiellement mené	6= Inapte  7=Autres.....		

Tableau récapitulatif

	Eligibles	Enquêtés
Nombre de femmes		
Nombre d'hommes		

**SECRET STATISTIQUE**  
Mars 2020

*Les renseignements contenus dans ce document sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous une forme anonyme conformément à la loi n°2013-537 du 30 juillet 2013 sur l'obligation de répondre et le secret statistique.*

## SECTION 1. LISTE DES MEMBRES DU MENAGE

ID DE LA PERSONNE	Q101 Veuillez nommer toutes les personnes qui vivent dans le ménage ( <i>l'ensemble des personnes ayant un lien de parenté ou non, qui reconnaissent l'autorité d'un même individu appelé chef de ménage et habitent généralement ensemble dans une même maison.</i> ). Commencez avec le chef du ménage. N'oubliez pas d'inclure les enfants et nourrissons.  <b>Faire une liste complète de tous les noms concernés avant de continuer. Ensuite poser les questions 102 à 108 pour chaque nom dans la liste.</b>	Q102 Quelle est la relation de <i>INSÉRER LE NOM</i> avec le chef du ménage ? 1=Chef 2=Epouse/Mari 3=Enfant/Enfant adopté 4=Père/Mère 5=Beau-père/Belle mère 6=Beau-fils/Belle fille 7=Petit fils/petite fille 8=Sœur/Frère 9=Neveu/Nièce 10=Beau-frère/Belle sœur 11=Grand père/Grande mère 12=Domestique/Travailleur 13=Autres	Q103  <i>INSÉRER LE NOM</i> habite-t-il/elle ici habituellement ?  1=OUI. 0=NON	Q104  Quel est le sexe de <i>INSÉRER LE NOM</i> ?  1=MASCULIN 2=FÉMININ	Q105  Quel âge a <i>INSÉRER LE NOM</i> (en années) ?  <i>S'IL S'AGIT D'UN NOURRISSON, ÉCRIRE 0.</i>	Q106  Quel est l'état matrimonial actuel de <i>INSÉRER LE NOM</i> ?  <b>si la personne interrogée a moins de 18, écrire S/O.</b> 1=Actuellement marié 2=Concubinage 3=Célibataire 4=Divorcé/Séparé 5=Veuf /Veuve 98= S/O Mettre un filtre	Q107  <i>ENTOURER LE NUMÉRO D'ID POUR LES RÉSIDENTES DE SEXE FÉMININ vivant en union (marié ou concubinage) ÂGÉES de 25-35 ans</i>	Q108  <i>ENTOURER LE NUMÉRO D'ID POUR LES RÉSIDENTS DE SEXE MASCULIN vivant en union (marié ou concubinage) avec une femme ÂGÉE de 25-35 ans qui est dans le ménage</i>
1							1	1
2							2	2
3							3	3
4							4	4
5							5	5
6							6	6
7							7	7
8							8	8
9							9	9
10							10	10
11							11	11
12							12	12
13							13	13
14							14	14

### SECTION 3. DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
Q300	Votre ménage dispose-t-il des équipements/biens suivants ? <b>Lire toutes les réponses et permettre des réponses multiples.</b> <b>Entourer les codes</b>	A=Électricité B=Radio C=Télévision D=Téléphone portable E=Téléphone fixe F=Lecteur VCD/DVD G=Ordinateur H=Aucun	
Q301	J'aimerais maintenant vous poser quelques questions portant directement sur vous. Quel âge avez-vous ?	Age en années : _____	
Q302	Quel est le niveau d'instruction le plus élevé que vous avez atteint ? <b>Choisir une réponse.</b>	1=Aucun 2=Primaire 3=Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle 4=Secondaire 2 <sup>nd</sup> cycle 5=Supérieur 98=Ne sait pas	Si 1 Aller à Q309
Q303	Quelle est l'année/classe la plus élevée que vous avez achevé à ce niveau ?	Années/classe _____	
Q309	Êtes-vous actuellement mariée ou vivez-vous avec un homme comme si vous étiez mariée ? <b>Choisir une réponse.</b>	1=Mariée 2=Concubinage 3=Célibataire 4=Divorcée/Séparée 5=Veuve	Si 3, 4, ou 5 <b>ARRETER INTERVIEW</b>
Q310	Depuis combien d'années êtes-vous en union (marié ou concubinage) avec lui ?	_____ années 98=ne sait pas	Aller à Q312 Si 98 aller à Q311
Q311	Quel âge avez-vous quand vous avez commencé à vivre avec lui ?	Age _____	
Q312	Votre mari/partenaire vit-il avec vous ou habite-t-il ailleurs ?	1=Vit avec elle 2=Habite ailleurs	
Q313	Votre mari/partenaire a-t-il d'autres femmes ou vit-il avec d'autres femmes comme s'il était marié ?	1=Oui 0=Non 98=Ne sait pas	Si 0 ou 98 aller à Q315a
Q314	Au total, combien a-t-il de femmes ou de partenaires avec qui il vit, en vous incluant ?	Nombre total : _____	
Q315	Êtes-vous la première, la deuxième, ... épouse ? VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q314, <b>et formuler la question selon le nombre de partenaires du mari.</b>	Rang : _____	
Q315a	Quel est le type d'activité ou d'emploi que vous exercez actuellement ?	_____ _____	
Q316	VÉRIFIER QUE PERSONNE N'ÉCOUTE AVANT DE CONTINUER. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre vie sexuelle afin de pouvoir mieux comprendre certains aspects importants de	Age en année _____ 93=N'a jamais eu de rapports sexuels	Si 93 aller à Q501

	votre vie. Quel âge aviez-vous quand vous avez eu des rapports sexuels pour la toute première fois ?	95=Lorsqu'elle a commencé à vivre avec son premier mari/partenaire	
--	--	--	--

## SECTION 4 : ANTECEDENTS DE FERTILITE ET PREFERENCES

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
Q401	J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur toutes les fois que vous avez donné naissance à un enfant pendant votre vie. Avez-vous déjà eu un enfant ?	1 = Oui 0 = Non →	Si non aller à Q404
Q402	Combien de vos enfants vivent avec vous ? <b>Si aucun, consigner « 00 ».</b>	Enfants à la maison _____	
Q403	Combien de vos enfants sont vivants, mais ne vivent pas avec vous ?	Enfant vivant ailleurs _____	
Q404	Avez-vous donné naissance à un enfant qui était vivant à la naissance, mais qui est décédé par la suite ? <b>Si non, insister</b> : Tout enfant qui a pleuré ou donné des signes de vie, mais qui n'a pas survécu ?	1 = Oui 0 = Non →	Si Non aller Q406
Q405	Combien de vos enfants sont décédés ? <b>Si aucun, consigner « 00 ».</b>	Enfants décédés _____	
Q406	Avez-vous déjà eu une grossesse qui s'est terminée par une fausse couche, un avortement ou par l'accouchement d'un enfant mort-né ?	1 = Oui 0 = Non →	Si Non aller Q408
Q407	Combien de grossesses avez-vous eue qui se sont terminées par une fausse couche, un avortement ou par l'accouchement d'un enfant mort-né ?	Nombre _____	
Q408	<b>Additionner les réponses aux questions Q402, Q403 et Q405 et entrer le total. Si aucun, consigner « 00 ».</b>	Total de naissances vivantes _____	
Q409	VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q408.	Si le total de naissances vivantes > 0 → Si le total de naissances vivantes = 0 →	Q410 Q412
Q410	Quel est l'âge de votre dernier enfant ?  <b>Un seul groupe de cases doit être rempli, et les autres groupes de cases doit être rempli avec le code « 00 ».</b>  <b>Si dernier enfant décédé demander l'année de naissance.</b>	Mois  _ _ _ _   Années  _ _ _ _   Année Naissance  _ _ _ _ _ _ _ _  (Si dernier enfant décédé)	
Q411	Allaitez-vous actuellement ?  VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q410. <b>si la personne interrogée a donné naissance il y a plus de 3 ans, choisir 98</b>	1 = Oui 0 = Non 98=S/O	
Q412	Êtes-vous enceinte maintenant ?	1 = Oui → 0 = Non 98=Pas sûre	Si oui aller à Q414
Q413	À quand remonte le début de vos dernières règles ?  <b>Un seul groupe de cases doit être rempli, et tous les autres groupes de cases doivent être remplis avec le code 00</b>  <b>Si la personne interrogée est ménopausée, a eu une hystérectomie (ablation de l'utérus), répond que ses dernières règles datent d'avant la naissance de son dernier enfant, n'a jamais eu de règles, la case du mois doit être remplie avec le code fourni, et tous les autres groupes de case avec le code 00</b>	A=Il y a jours  _ _ _ _  B=Il y a semaines _ _ _ _  C=Il y a moins  _ _ _ _  D=Il y a ans _ _ _ _  Consigner la date, si elle est fournie 93=Ménopausée/a eu hystérectomie 95=Avant la naissance de son dernier enfant 97=N'a jamais eu de règles	

Q414	La dernière fois que vous êtes tombée enceinte, voulez-vous tomber enceinte à ce moment-là ?  VÉRIFIER LES RÉPONSES À Q407 ET Q408. <i>Si la personne interrogée n'a jamais été enceinte, écrire S/O</i>	1 = Oui 0 = Non 98=S/O	→	Si oui ou S/O aller à Q501
Q415	Voulez-vous avoir un enfant plus tard ou ne voulez-vous pas/plus avoir d'enfants ?	1=Plus tard 2=Ne voulait plus		

## SECTION 5. UTILISATION DE LA CONTRACEPTION

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
Q501	<b>J'aimerais maintenant parler de planning familial - les différents moyens ou méthodes qu'un couple peut utiliser pour retarder ou éviter une grossesse non désirée. Avez-vous entendu parler de « insérer la méthode » lister ci-dessous ?</b>		
A.	<b>Stérilisation féminine (ligature des trompes). Insister :</b> Les femmes peuvent avoir une opération pour ne plus tomber enceinte	1 = OUI 0 = NON	
B.	<b>Stérilisation masculine (vasectomie). Insister :</b> Les hommes peuvent avoir une opération pour éviter que leur femme tombe enceinte lorsqu'ils ont des rapports sexuels.	1 = OUI 0 = NON	
C.	<b>DIU. Insister :</b> Les femmes peuvent se faire installer à l'intérieur de l'utérus un objet par un médecin ou agent de santé pour éviter de tomber enceinte.	1 = OUI 0 = NON	
D.	<b>Injectables. Insister :</b> Les femmes peuvent recevoir une injection administrée par un agent de santé pour éviter de tomber enceintes pendant 2 ou 3 mois ou plusieurs mois.	1 = Oui 0 = Non	
E.	<b>Implants Insister :</b> Les femmes peuvent se faire insérer un ou plusieurs bâtonnets dans la partie supérieure du bras par un agent de santé pour éviter de tomber enceinte pendant une ou	1 = Oui 0 = Non	
F.	<b>Pilule. Insister :</b> Les femmes peuvent prendre un comprimé chaque jour pour éviter de tomber enceinte.	1 = Oui 0 = Non	
G.	<b>Préservatif masculin. Insister :</b> Les hommes peuvent mettre un caoutchouc sur leur pénis avant d'avoir des rapports sexuels pour prévenir une grossesse non désirée.	1 = Oui 0 = Non	
H.	<b>Préservatif féminin. Insister :</b> Les femmes peuvent placer un caoutchouc dans leur vagin avant d'avoir des rapports sexuels pour prévenir une grossesse non désirée.	1 = Oui 0 = Non	
I.	<b>Méthode des Jours Fixes (Collier du Cycle). Insister :</b> La femme utilise un collier de perles de couleur pour savoir quels sont les jours où elle peut tomber enceinte. Ces jours-là, elle utilise un préservatif ou évite d'avoir des rapports sexuels.	1 = Oui 0 = Non	
J.	<b>Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA). Insister :</b> Pendant la période de 6 mois suivant la naissance d'un enfant, les femmes qui allaitent exclusivement au sein peuvent éviter une grossesse non désirée	1 = Oui 0 = Non	
K.	<b>Abstinence périodique (Méthode rythmique) Insister :</b> Pour éviter une grossesse non désirée, les femmes n'ont pas de rapports sexuels les jours du mois où elles pensent qu'elles	1 = Oui 0 = Non	

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
L.	<b>Retrait (coït interrompu). Insister :</b> Les hommes ont des rapports sexuels sans préservatif et se retirent du vagin de la femme avant d'éjaculer.	1 = Oui 0 = Non	
M.	<b>Contraception d'urgence/Pilule du lendemain. Insister :</b> Comme mesure d'urgence, dans les trois jours suivant un rapport sexuel non protégé, les femmes peuvent prendre des comprimés spéciaux pour prévenir une grossesse non désirée.	1 = Oui 0 = Non	
N.	Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes que les femmes ou les hommes peuvent utiliser pour éviter une grossesse non désirée ? <b>Si oui est choisi, la ou les réponses qualitatives sur les autres méthodes doivent être consignées.</b>	1 = Oui Préciser _____  0 = Non	
Q502	VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q316.	Si elle a eu des rapports sexuels  Si elle n'a jamais eu de rapports sexuels	→ Q503  Section suivante
Q503	VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q412.	Si elle n'est pas enceinte ou n'est pas sûre  Si elle est enceinte	→ Q504  → Q515
Q504	À l'heure actuelle, faites-vous quelque chose ou utilisez-vous une méthode pour retarder ou éviter une grossesse non désirée ?	1 = Oui  0 = Non	→ Q512
Q505	Quelles méthodes utilisez-vous ? <b>Laisser la personne interrogée parler librement, et permettre des réponses multiples. Si elle donne une seule réponse, insister avec « autre chose ? » si plus d'une méthode est sélectionnée, choisir le saut la méthode la plus haut placée dans la liste.</b>	A=Stérilisation Féminine B=Stérilisation Masculine C=DIU D=Implants E=Injectables F=Pilule G=Contraception d'urgence H=Préservatif masculin I=Préservatif féminin J=Diaphragme K=Mousse/gelée spermicide L=Méthode des jours fixes/collier du cycle M=MAMA N=Abstinence périodique (méthode rythmique) O=Retrait P=Autre méthode moderne Q=Autre méthode traditionnelle  _____	Si A à L Aller  Q506  Si M à Q Aller à Q512
Q506	VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q505.	<b>Secteur public</b> 1=Hôpital public/centre de santé/ Clinique de planning familial 2=Clinique mobile 3=Agent de santé <b>Secteur médical privé</b>	

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
	Où avez-vous reçu/obtenu votre <b>insérer méthode actuelle utilisée ?</b>	4=Hôpital/clinique privé(e) 5=Pharmacie 6=Clinique mobile 7=Agent de terrain 8=Clinique franchisée/du réseau 9=Agent de terrain de réseau ou de franchise <b>Autre source</b> 10=Magasin/boutique/kiosque 11=Eglise 12=Ami/parent 13=Clinique d'une ONG 96=Autre	
Q507	Combien avez-vous payé pour <b>insérer méthode actuelle utilisée ?</b>	Montant en FCFA _____  98=Ne sait pas	
Q508	Quel est le nom de la marque de votre méthode actuelle <b>utilisée ?</b>	_____ Le nom de la marque 98=Ne sait pas	
Q508A	Quelle marque de contraceptif pilule utilisez-vous le plus souvent ? <b>Enquêteur : demandez au répondant de décrire la marque ou l'emballage</b> Pilule <b>Poser cette question que si F est sélectionné à Q505</b>	1=Confiance 2=Miniphase 3= Minidril 4=Depal 5=Triella 6=Diane 35 7=Autre ..... 98=NSP/SR	
Q508B	Quelle marque de contraceptif Injectable utilisez-vous le plus souvent ? Injectable <b>Poser cette question que si E est sélectionné à Q505</b>	1=Harmonia 2=Depo-provera 3=Noristerat 4=Sayana press 5=Autre ..... 98=NSP/SR	
Q508C	Quelle marque de contraceptif Implant utilisez-vous le plus souvent ? Implant <b>Poser cette question que si D est sélectionné à Q505</b>	1=Implanon 2=Jadelle 3=Autre ..... 98=NSP/SR	
Q508D	Quelle marque de contraceptif préservatif utilisez-vous le plus souvent ? Préservatif <b>Poser cette question que si H est sélectionné à Q505</b>	1=Prudence 2=Fresh feeling 3=Kama soutra 4=Manix 5=Présa 6=Gtm 7=Condom générique 9=Autre ..... 98=NSP/SR	
Q509	Depuis combien de temps utilisez-vous <b>insérer méthode actuelle</b> pour prévenir une grossesse non désirée <b>un seul</b>	A= Mois  _ _ _ _ _   B=Années  _ _ _ _ _	

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
	<b>groupe de case doit être rempli et l'autre groupe de case doit être remplie avec le code « 00 ».</b>		
<b>Q50 9a</b>	Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'effets secondaires ou de problèmes que vous pourriez avoir en utilisant cette méthode ?	1 = Oui → 0 = Non	<b>Q509c</b>
<b>Q50 9b</b>	Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé des effets secondaires ou des problèmes que vous pourriez avoir à cause de l'utilisation de la méthode ?	1 = Oui 0 = Non →	<b>Q509d</b>
<b>Q50 9c</b>	Vous a-t-on dit ce qu'il fallait faire si vous aviez ces effets secondaires ou ces problèmes ?	1 = Oui 0 = Non	
<b>Q50 9d</b>	Au moment où vous avez obtenu votre méthode actuelle, vous a-t-on parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pourriez utiliser ?	1 = Oui 0 = Non →	<b>Q510</b>
<b>Q50 9e</b>	Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pouviez utiliser ?	1 = Oui 0 = Non	
<b>Q510</b>	Lorsque vous avez obtenu votre méthode actuelle, avez-vous reçu en même temps d'autres services de la part du prestataire ? <b>VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q506. Si la réponse était 10 à 12, choisir 98.</b>	1=Oui 0=Non 98=S/O	} <b>Q512</b>
<b>Q511</b>	Quel(s) autre(s) service(s) avez-vous reçu(s) ? <b>Lire toutes les réponses et permettre des réponses multiples.</b> <b>Entourer les codes</b>	A=Conseils et dépistage du VIH B=Dépistage et traitement des IST C=Dépistage de la tuberculose D=Vaccination des enfants E=Service d'avortement/soins post-avortement F=Dépistage nutritionnel pour les enfants G=Autre I= Consultations post-natales	
<b>Q512</b>	Avez-vous utilisé quelque chose par le passé pour éviter de tomber enceinte ou essayé d'une quelconque manière de retarder ou éviter une grossesse non désirée	1=Oui 0=Non →	<b>Q515</b>
<b>Q513</b>	Quelle(s) méthode(s) avez-vous utilisée(s) ? <b>Lire toutes les réponses et permettre des réponses multiples.</b> <b>Entourer les codes</b>	A=Stérilisation Féminine B=Stérilisation Masculine C=DIU D=Implants E=Injectables F=Pilule G=Contraception d'urgence H=Préservatif masculin I=Préservatif féminin J=Diaphragme K=Mousse/gelée spermicide L=Méthode des jours fixes/collier du cycle	

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
		M=MAMA N=Abstinence périodique (méthode rythmique) O=Retrait P=Autre méthode moderne Q=Autre méthode traditionnelle _____	
Q514	Quel âge aviez-vous quand vous avez utilisé pour la première fois une méthode pour retarder ou éviter une grossesse non désirée ?	Age en années _____	
Q515	VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q412. <b><i>Si elle est actuellement enceinte, demander</i></b> Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le futur. Après la naissance de l'enfant que vous attendez actuellement aimeriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ? <b><i>Si elle n'est pas actuellement enceinte ou n'est pas sûre, demander</i></b> Aimeriez-vous avoir un enfant dans le futur ?	1=Avoir un (un autre) enfant 2=Ne Plus avoir d'enfants/aucun 3=Dit ne pas pouvoir tomber enceinte 98=Indécise/ne sait pas	→ Q518 Section suivante → Q518a
Q516	VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q412 <b><i>Si elle est actuellement enceinte, demander</i></b> : Après la naissance de l'enfant que vous attendez actuellement, combien de temps aimeriez-vous attendre avant d'avoir un autre enfant ? <b><i>Si elle n'est pas actuellement enceinte ou n'est pas sûre, demander</i></b> : Combien de temps aimeriez-vous attendre avant d'avoir un enfant ? <b><i>Un seul groupe de case doit être rempli, et l'autre groupe de case doit être rempli avec le code « 00 ». si la personne interrogée répond « bientôt » ou « après le mariage », le mois doit être rempli avec le code fourni, et tous les autres groupes de cases doivent être remplis avec le code « 00 ».</i></b>	A= Mois  _ _ _ _  B= Année  _ _ _ _ _ _ _ _  93=Bientôt/maintenant 95=Après le mariage 98=Ne sait pas 96=Autre	→ Q518a } Q518
Q517	VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q516. <b><i>Si le temps d'attente souhaité est ≥ 2 ans</i></b> <b><i>Aller à Q518</i></b> <b><i>Si le temps d'attente souhaité est &lt; 2 ans</i></b> <b><i>Aller à Q519</i></b>		
Q518	VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q412. <b><i>Si elle est enceinte, entourer S/O.</i></b> VÉRIFIER ENSUITE LA RÉPONSE À Q504. <b><i>Si elle utilise une méthode, entourer S/O.</i></b> <b><i>Les seules personnes interrogées qui devraient répondre à cette question sont les femmes qui ne sont pas enceintes, qui n'utilisent aucune méthode actuellement, et qui ne veulent pas avoir un enfant bientôt.</i></b>  POUR FINIR, VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q515.	A=Pas mariée <b><i>Raisons liées à la fertilité</i></b> B=N'a pas de rapports sexuels. C=Rapports sexuels peu fréquent D=Ménopausée/hystérectomie E=Ne peut pas tomber enceinte F=N'a pas eu de règles depuis la naissance de son dernier enfant G>Allaite H=Dépend de dieu/fatalisme <b><i>Opposition à leur utilisation</i></b>	

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
	<p><b>Si elle souhaite avoir un (autre) enfant dans le futur, demander :</b> Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas avoir un (autre) enfant bientôt. Pourriez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez aucune méthode pour prévenir une grossesse non désirée ?</p> <p><b>Si elle ne souhaite plus avoir d'enfants, demander :</b> Vous avez dit que vous ne vouliez plus avoir d'enfants. Pourriez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez aucune méthode pour prévenir une grossesse non désirée ?</p> <p><b>Laisser la personne interrogée parler librement, et permettre des réponses multiples.</b> VERIFIER LA REPONSE DE Q501 <b>Si la personne choisit la réponse N ou O</b></p>	<p>I=Opposition de la personne interrogée J=Opposition du mari/partenaire K=Opposition de la belle-mère L=Opposition. d'autres personnes M=Interdiction religieuse</p> <p><b>MANQUE DE CONNAISSANCES</b> N=Ne connaît aucune méthode O=Ne connaît aucune source</p> <p><b>RAISONS LIÉES À LA MÉTHODE</b> P=Effets secondaires/problèmes de santé Q=Manque d'accès/trop éloigné R=Coût trop élevé S=Méthode préférée pas disponible T=Aucune méthode disponible U=Pas pratique à utiliser V=Entrave les processus naturels de l'organisme W=Autre</p> <hr/> <p>X=Ne sait pas Y= S/O</p>	
Q518a	Avez-vous utilisé une Pilule du lendemain (CU) au cours des 12 derniers mois ?	<p>Oui.....1</p> <p>Non.....2</p>	Sinon aller à Q519
Q518b	Si oui, Combien de fois avez-vous utilisé la pilule du lendemain au cours des 12 derniers mois	_ _ _	
Q518c	Quelle marque de pilule de lendemain avez-vous utilisé le plus souvent ?	<p>Norlevo.....1</p> <p>Pregnon.....2</p> <p>Levopred.....3</p> <p>LevoBD.....4</p> <p>Autre (préciser).....5</p>	
Q519	Pensez-vous que vous utiliserez une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse non désirée à un quelconque moment dans le futur ?	<p>1=Oui</p> <p>0=Non</p> <p>98=Ne sait pas</p>	} Section suivante
Q520	Pensez-vous que vous utiliserez une méthode contraceptive dans les 12 prochains mois ?	<p>1=Oui</p> <p>0=Non</p> <p>98=Ne sait pas/pas sûre</p>	} Section suivante

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
Q521	<p>Quelles méthodes pensez-vous que vous utiliserez ?</p> <p><b><i>Laisser la personne interrogée parler librement, et permettre des réponses multiples.</i></b></p> <p><b><i>Entourer les codes</i></b></p>	<p>A=Stérilisation Féminine  B=Stérilisation Masculine  C=DIU  D=Implants  E=Injectables  F=Pilule  G=Contraception d'urgence  H=Préservatif masculin  I=Préservatif féminin  J=Diaphragme  K=Mousse/gelée spermicide  L=Méthode des jours fixes/collier du cycle  M=MAMA  N=Abstinence périodique (méthode rythmique)  O=Retrait  P=Autre méthode moderne  Q=Autre méthode traditionnelle</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

## SECTION 6 : OPPORTUNITE

Disponibilité			
<p><b>J'aimerais maintenant vous poser des questions au sujet des facteurs qui facilitent ou rendent difficile l'utilisation d'une méthode de contraception. Pour les énoncés suivants, veuillez répondre « oui » si vous êtes d'accord, ou « non » si vous n'êtes pas d'accord.</b></p>			
<p>VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q501 : <b>A entendu parler de :</b>  <b>Préservatif</b>            1=Oui    0=Non  <b>Pilule</b>                    1=Oui    0=Non  <b>Injectable</b>              1=Oui    0=Non  <b>Contraceptif d'Urgence (CU)</b>    1=Oui    0=Non  <b>Des stérilets (DIU) dans ma communauté/village/quartier</b>  <b>1=Oui    0=Non</b>  <b>Pour les questions qui suivent, si l'enquêté ne connaît pas la méthode ne pas poser les questions y afférentes</b></p>			
<b>Q60 1A</b>	Je connais un endroit dans ma communauté/village/quartier où l'on peut se procurer des contraceptifs.	1=Oui 0=Non 98=NSP	
<b>Q60 5</b>	Il est facile de trouver des contraceptifs dans ma communauté.	1=Oui 0=Non 98=NSP	
<b>Q60 5A</b>	<p>a. Il est facile de trouver des condoms dans ma communauté/village/quartier</p> <p>b. Il est facile de trouver des pilules dans ma communauté/village/quartier</p> <p>c. Il est facile de trouver des Injectables dans ma communauté/village/quartier</p> <p>d. Il est facile de trouver des Contraceptif d'Urgence (CU) dans ma communauté/village/quartier</p> <p>e. Il est facile de trouver des stérilets (DIU) dans ma communauté/village/quartier</p>	<p>1=Oui 0=Non 98=NSP</p>	
<b>Q60 5B</b>	<p>a. Il est facile de trouver des condoms Prudence dans ma communauté/village/quartier</p> <p>b. Il est facile de trouver la pilule Confiance dans ma communauté/village/quartier</p> <p>c. Il est facile de trouver l'injectables Harmonia dans ma communauté/village/quartier</p> <p>d. Il est facile de trouver le Contraceptif d'Urgence (CU) Pregnon dans ma communauté/village/quartier</p>	<p>1=Oui 0=Non 98=NSP</p> <p>1=Oui 0=Non 98=NSP</p> <p>1=Oui 0=Non 98=NSP</p> <p>1=Oui 0=Non 98=NSP</p>	

## SECTION 7 : CAPACITE

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
<b>CONNAISSANCES</b>			
<b>Q70 2</b>	Un espacement de 2 ans entre les naissances réduit le risque de décès pour la mère et l'enfant.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
<b>Q70 2 a</b>	<p>Quels sont les avantages d'être assisté par un agent de santé qualifié pendant la grossesse ?</p> <p>a. Prévention et soins de certaines maladies liées à la grossesse ;</p> <p>b. Bébé bien portant à la naissance ;</p> <p>c. Maman bien portante à l'accouchement ;</p> <p>d. Eviter les décès liés à la grossesse ;</p> <p>e. Faire un suivi nutritionnel</p>	<p>1= Vrai ; 0=Faux ;98 NSP</p>	
<b>Q70 2 b</b>	Quels sont les avantages d'être assisté par un agent de santé qualifié pendant l'accouchement ?		

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
	a. Détecter et traiter rapidement les complications liées à l'accouchement ; b. Prévenir la contamination par le VIH/SIDA de l'enfant ; c. Avoir un certificat de naissance pour la déclaration de l'enfant. d. Prévenir les décès maternels e. Prévenir les décès infantiles.	1= Vrai ; 0=Faux ;98 NSP 1= Vrai ; 0=Faux ;98 NSP	
	<b>MÉTHODES À COURT TERME : PRÉSERVATIF</b>		
Q71 7	VÉRIFIER LES RÉPONSES À Q501G ET Q501H. <i>La personne interrogée a-t-elle entendu parler de ces méthodes ? Si non, écrire « non » et sauter les questions Q718-722 pour passer à la Q723, ou à la question sélectionnée suivante.</i>	1= Oui  0 = Non →	Q72 9
Q71 8	Un homme peut mettre un préservatif masculin avant d'avoir des rapports sexuels pour prévenir une grossesse. <i>(Vérifier Q501, Si G=1 poser cette question)</i>	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q71 9	Une femme peut mettre un préservatif féminin avant d'avoir des rapports sexuels pour prévenir une grossesse. <i>(Vérifier Q501, Si H=1 poser cette question)</i>	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q72 0	Vous n'avez pas besoin d'une ordonnance ou d'un examen médical pour obtenir des préservatifs.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q72 1	Les préservatifs doivent être utilisés pendant toute la durée de la relation sexuelle pour être d'une plus grande efficacité.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q72 2	Les préservatifs protègent contre les infections sexuellement transmissibles lorsqu'ils sont utilisés correctement.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
	<b>INJECTABLES</b>		
Q72 9	VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q501D. <i>La personne interrogée a-t-elle entendu parler de cette méthode ? si non, entourer « 0 » et sauter les questions Q730-734 pour passer à la Q735 ou à la question sélectionnée suivante.</i>	1= Oui  0 = Non →	Q73 5
Q73 0	Le contraceptif injectable doit être prescrit par un prestataire de santé.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q73 1	Les contraceptifs injectables doivent être administrés tous les 2 mois ou tous les 3 mois.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q73 2	Les contraceptifs injectables ne protègent pas les femmes contre les IST.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q73 3	L'effet secondaire le plus courant est un saignement irrégulier pendant les premiers mois.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q73 4	Les femmes peuvent de nouveau tomber enceintes quelques mois après la dernière injection	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
	<b>CONTRACEPTION ORALE REGULIERE</b>		
Q73 5	VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q501F. <i>La personne interrogée a-t-elle entendu parler de cette méthode ? si non, entourer « 0 » et sauter les questions Q736-740 pour passer à la Q747 ou à la question sélectionnée suivante.</i>	1= Oui  0 = Non →	Q74 7
Q73 6	La première prescription de pilule doit être faite par un prestataire de santé	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q73 7	La pilule doit être prise chaque jour.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q73 8	La fertilité revient habituellement dans les trois mois après l'arrêt de la pilule.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
Q739	Après la première consultation auprès d'un agent de santé, les femmes peuvent se réapprovisionner en pilules dans les centres de santé/Pharmacie/dépôt de leur localité sans avoir à revenir à la clinique chaque mois.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q740	La pilule ne protège pas les femmes contre les IST.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
	<b>MÉTHODES À LONG TERME : DIU</b>		
Q747	VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q501C. <i>La personne interrogée a-t-elle entendu parler de cette méthode ? si non, entourer « 0 » et sauter les questions Q748-752 pour passer à la Q774, ou à la question sélectionnée suivante.</i>	1=Oui 0 = Non →	Q774
Q748	Le DIU peut être utilisé pendant l'allaitement.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q749	Le DIU peut prévenir les grossesses pendant une longue durée (10 ans).	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q750	Après le retrait du DIU, la femme peut à nouveau tomber enceinte et avoir des enfants	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q751	Le DIU est inséré dans l'utérus par un agent de santé	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q752	Le DIU est presque aussi efficace que la stérilisation.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	

### Capacité (suite)

	Questions et filtres	Réponses						
		Pas du tout d'accord	Un peu en désaccord	Neutre	Un peu d'accord	Tout à fait d'accord	Aucune réponse	
	<b>SOUTIEN SOCIAL</b>							
Q774	Mon mari/partenaire m'encourage à avoir recours à une méthode moderne de planning familial.	1	2	3	4	5	99	
Q774a	Mon mari/partenaire m'encouragerait à me faire suivre par un agent de santé qualifié pendant la grossesse et l'accouchement :	1	2	3	4	5	99	
Q775	Mon mari/partenaire et moi discutons du planning familial.	1	2	3	4	5	99	
Q775a	Mon mari/partenaire et moi discutons des avantages pour une femme de se faire suivre par un agent de santé qualifié pendant la grossesse et l'accouchement	1	2	3	4	5	99	
	<b>EFFICACITÉ PERSONNELLE</b>							
Q788	Je suis capable d'utiliser une méthode de contraception moderne pour prévenir les grossesses non désirées	1	2	3	4	5	99	

Questions et filtres		Réponses						
		Pas du tout d' accord	Un peu en désaccord	Neutre	Un peu d' accord	Tout à fait d' accord	Aucune réponse	
<b>Q79</b> <b>4</b>	Je peux discuter avec mon mari/partenaire de l'utilisation de contraceptifs modernes pour prévenir une grossesse non désirée.	1	2	3	4	5	99	

**SECTION 8 : MOTIVATION**

	Questions et filtre	Réponses						
		Pas du tout d' accord	Un peu en désaccord	Neutre	Un peu d' accord	Tout à fait d' accord	Aucune	
	<b>CROYANCE</b>							
Q809	L'utilisation de contraceptifs peut faire qu'il soit plus difficile pour la femme de tomber enceinte plus tard.	1	2	3	4	5	9 9	
	<b>À ACTION PROLONGÉE : DIU (Vérifier Q501, Si C=0 aller à Q834)</b>							
Q814	Le DIU peut provoquer des lésions à l'utérus.	1	2	3	4	5	9 9	
Q815	L'utilisation prolongée du DIU peut causer l'infertilité.	1	2	3	4	5	9 9	
Q817	Le DIU va se déplacer à l'intérieur du corps.	1	2	3	4	5	9 9	
Q818	Le DIU va « tomber » pendant des travaux physiques lourds.	1	2	3	4	5	9 9	
Q819	L'utilisation du DIU réduit le plaisir sexuel.	1	2	3	4	5	9 9	
	<b>INJECTABLES (Vérifier Q501, Si D=0 aller à Q841)</b>							
Q834	Les contraceptifs injectables peuvent causer le cancer.	1	2	3	4	5	9 9	
Q835	Les contraceptifs injectables peuvent causer l'infertilité.	1	2	3	4	5	9 9	
Q836	L'utilisation de contraceptifs injectables entraîne une prise de poids.	1	2	3	4	5	9 9	
Q837	L'utilisation prolongée de contraceptifs injectables peut être dangereux pour la santé de la femme.	1	2	3	4	5	9 9	
Q838	Les contraceptifs injectables peuvent provoquer des lésions à l'utérus.	1	2	3	4	5	9 9	
	<b>CONTRACEPTION ORALE REGULIERE (Vérifier Q501, Si F=0 aller à Q853)</b>							
Q841	Les contraceptifs oraux peuvent causer le cancer.	1	2	3	4	5	9 9	
Q842	L'utilisation prolongée des contraceptifs oraux peut causer l'infertilité.	1	2	3	4	5	9 9	
Q843	L'utilisation de la pilule réduit le plaisir pendant les relations sexuelles.	1	2	3	4	5	9 9	
Q844	L'utilisation des contraceptifs oraux entraîne des variations de poids.	1	2	3	4	5	9 9	
Q845	L'utilisation des contraceptifs oraux cause l'acné.	1	2	3	4	5	9 9	
	<b>ATTENTES VIS-À-VIS DES RÉSULTATS</b>							
Q853	L'utilisation de contraceptifs modernes est la meilleure manière pour moi d'éviter des grossesses non désirées.	1	2	3	4	5	9 9	
Q854	J'ai plus de chances de tomber enceinte si je n'utilise pas de contraceptifs.	1	2	3	4	5	9 9	

	Questions et filtre	Réponses						
		Pas du tout d' accord	Un peu en désaccord	Neutre	Un peu d' accord	Tout à fait d' accord	Aucune	
Q855	L'utilisation de contraceptifs modernes est efficace pour l'espacement des naissances.	1	2	3	4	5	9 9	
Q856	L'utilisation de contraceptifs modernes me permet de limiter le nombre d'enfants que j'ai.	1	2	3	4	5	9 9	
	<b>MÉTHODES À COURT TERME</b>							
Q857	Les <b>préservatifs</b> sont efficaces pour prévenir une grossesse non désirée. ( <b>Vérifier Q501, Si G=0 et H=0 Ne pas poser</b> )	1	2	3	4	5	9 9	
Q858	La <b>contraception d'urgence</b> est efficace pour prévenir une grossesse non désirée. ( <b>Vérifier Q501, Si M=0 Ne pas poser</b> )	1	2	3	4	5	9 9	
Q859	Les <b>contraceptifs injectables</b> sont efficaces pour prévenir une grossesse non désirée. ( <b>Vérifier Q501, Si D=0 Ne pas poser</b> )	1	2	3	4	5	9 9	
Q860	Les <b>pilules contraceptives</b> sont efficaces pour prévenir une grossesse non désirée. ( <b>Vérifier Q501, Si F=0 Ne pas poser</b> )	1	2	3	4	5	9 9	
	<b>MÉTHODES À LONG TERME : DIU</b>							
Q862	Les DIU sont d'une grande efficacité pour prévenir les grossesses non désirées. ( <b>Vérifier Q501, Si C=0 Ne pas poser</b> )	1	2	3	4	5	9 9	
	<b>MENACE</b>							
	<b>GRAVITÉ</b>							
Q871	Les grossesses non désirées sont un problème majeur dans ma communauté / entourage.	1	2	3	4	5	9 9	
Q872	Les familles qui ont trop d'enfants ont beaucoup de difficultés.	1	2	3	4	5	9 9	
Q873	Les femmes qui ont des grossesses trop rapprochées souffrent habituellement de problèmes de santé.	1	2	3	4	5	9 9	
Q875	Le risque de décès du nourrisson est plus élevé si la femme a des enfants chaque année.	1	2	3	4	5	9 9	
Q876	Le risque de décès maternel est plus élevé si la femme a des grossesses chaque année.	1	2	3	4	5	9 9	
	<b>SUSCEPTIBILITÉ</b>							
Q879	Si je n'utilise pas une méthode moderne de planning familial, je vais tomber enceinte	1	2	3	4	5	9 9	
Q882	Je n'ai pas besoin d'avoir recours à une méthode moderne de planning familial pour prévenir des grossesses non désirées.	1	2	3	4	5	9 9	

MOTIVATION : (Volonté de payer Confiance)			
Questions et filtres			Renvois
886	Savez-vous combien coûte une boîte de Confiance ?	Oui .....1 Non..... 2	Si Code 2 → Allez à Q886a
887	Combien coûte une boîte de Confiance ? <b>Précisez le type de boîte</b> (boîte de 3 plaquettes)	Montant / ___/___/___/ Frs CFA NSP .....98	
888	Comment jugez-vous ce prix ? Diriez-vous que c'est bas, abordable ou élevé ? <b>Une seule réponse</b>	Bas .....1 Abordable .....2 Elevé.....3 Ne sait pas/Sans réponse.....4	
892	Quel est le prix le plus élevé d'une boîte que vous serez disposé(e) à payer ?	Montant / ___/___/___/ Frs CFA NSP .....98	
892 a	En dessous de quel prix n'achèteriez-vous ce produit car vous le jugerez de mauvaise qualité ?	Montant / ___/___/___/ Frs CFA NSP .....98	
893	Que feriez-vous si le prix dépassait le prix le plus élevé que vous serez disposé à payer ? Iriez-vous chercher une marque moins chère, Chercher la même marque à un endroit où le produit est moins cher ou arrêter d'utiliser ? <b>Une seule réponse</b>	Chercher une autre marque moins chère ..... 1 Chercher la même marque à un endroit où le produit est moins cher... .....2 Arrêter d'utiliser..... 3	

MOTIVATION : (Volonté de payer Harmonia)			
Questions et filtres			Renvois
886a	Savez-vous combien coûte (injectable) de Harmonia ?	Oui .....1 Non..... 2	Si Code 2 → Allez à Q901
887a	Combien coûte une boîte de Harmonia ? <b>Précisez le type de boîte</b> (boîte de 3 plaquettes)	Montant / ___/___/___/ Frs CFA NSP .....98	
888a	Comment jugez-vous ce prix ? Diriez-vous que c'est bas, abordable ou élevé ? <b>Une seule réponse</b>	Bas .....1 Abordable .....2 Elevé.....3 Ne sait pas/Sans réponse.....4	
892a	Quel est le prix le plus élevé d'une boîte que vous serez disposé(e) à payer ?	Montant / ___/___/___/ Frs CFA	

		NSP .....98	
<b>892 b</b>	En dessous de quel prix n'achèteriez-vous ce produit car vous le jugerez de mauvaise qualité ?	Montant / ___/___/___/ Frs CFA NSP .....98	
<b>893a</b>	Que feriez-vous si le prix dépassait le prix le plus élevé que vous serez disposé à payer ?  Iriez-vous chercher une marque moins chère,  Chercher la même marque à un endroit où le produit est moins cher ou arrêter d'utiliser ?  <b>Une seule réponse</b>	Chercher une autre marque moins chère ..... 1  Chercher la même marque à un endroit où le produit est moins cher... .....2  Arrêter d'utiliser..... 3	

## SECTION 9 : EXPOSITION AUX MEDIAS ET AUX ACTIVITES DE L'AIMAS

	Questions et filtres	Réponses	Sauts												
<b>Q901</b>	Lisez-vous un journal ou un magazine presque tous les jours, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine, ou pas du tout ?	1=Presque tous les jours 2=Au moins une fois par semaine 3=Moins d'une fois par semaine 4=Pas du tout	→ <b>Q903</b>												
<b>Q902</b>	Quel journal lisez-vous le plus souvent ?	1=Fraternité matin 2=Top Visage 3=Prestige magazine 4=Star magazine 5=Gbich 6=Notre voie 7=Le temps 8=Patriote 9=Nouveau réveil 98=Ne sait pas 96=Autre  _____													
<b>Q903</b>	Écoutez-vous la radio presque tous les jours, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine, ou pas du tout ?	1=Presque tous les jours 2=Au moins une fois par semaine 3=Moins d'une fois par semaine 4=Pas du tout	→ <b>Q906</b>												
<b>Q904</b>	Quelle chaîne de radio écoutez-vous le plus souvent ?	1=Radio National : Fréquence 2 2=Radio National : Côte d'Ivoire 3=Nostalgie 4=Jam FM 5=ONUCI FM 6=Chaîne internationales (RFI/BBC etc.) 8=Chaîne locale  _____	98=Ne sait pas												
<b>Q905</b>	A quel moment de la journée écoutez-vous le plus souvent la radio ?  <b>(Indiquer une plage horaire de 2 heures maximum)</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Matin</u></th> <th><u>Après midi</u></th> <th><u>Soir</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6h01-8h.....1</td> <td>14h01-16h....5</td> <td>18h0</td> </tr> <tr> <td>8h01-10h...2</td> <td>16h01-18h....6</td> <td>20h0</td> </tr> <tr> <td>10h01-12h....3</td> <td></td> <td>22h0</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Matin</u>	<u>Après midi</u>	<u>Soir</u>	6h01-8h.....1	14h01-16h....5	18h0	8h01-10h...2	16h01-18h....6	20h0	10h01-12h....3		22h0	
<u>Matin</u>	<u>Après midi</u>	<u>Soir</u>													
6h01-8h.....1	14h01-16h....5	18h0													
8h01-10h...2	16h01-18h....6	20h0													
10h01-12h....3		22h0													

		12h01-14h...4		24h01-06h...10	
<b>Q906</b>	Regardez-vous la télévision presque tous les jours, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine, ou pas du tout ?	1=Presque tous les jours 2=Au moins une fois par semaine 3=Moins d'une fois par semaine 4=Pas du tout			→ <b>Q909</b>
<b>Q907</b>	Quelle chaîne de télévision regardez-vous le plus souvent ?	1=RTI 1 2=RTI2 3=RTI Bouaké 4=Chaîne de télé internationales (TF1, France 24 etc. 5=Chaîne de télé ivoiriennes (life Tv, NCI, RTI 3) 96=Autre_____			
<b>Q908</b>	A quel moment de la journée regardez-vous le plus souvent la télévision ?  <i>(Indiquer une plage horaire de 2 heures maximum)</i>	<u>Matin</u> 6h01-8h.....1 8h01-10h.....2 10h01-12h.....3 12h01-14h.....4	<u>Après midi</u> 14h01-16h.....5 16h01-18h.....6	<u>Soir</u> 18h01-20h.....7 20h01-22h.....8 22h01-24h.....9 24h01-06h...10	
<b>Q909</b>	Avez-vous vu ou entendu une publicité de la méthode « injectable ou Harmonia ou planning familiale » au cours des 3 dernières années ?	1=Oui 0=Non			→ <b>Q920</b>
<b>Q910</b>	Où avez-vous vu ou entendu cette publicité ?  <i>(Plusieurs réponses possibles)</i>	A=Télévision B=Radio C= Activités de sensibilisation AIMAS D=Centre de santé E=Pharmacie F=Prospectus/ dépliant / affiche (hors centre de santé et pharmacie) H=Visite/rencontre avec agents ONG (nom ONG _____) 96=Autre_____			
<b>Q911</b>	Combien de fois avez-vous entendu ou vu cette publicité ?	1=1 ou 2 fois 2=Entre 3 et 5 fois 3=Plus de 5 fois (plusieurs fois) 98=Ne sait pas			
<b>Q912</b>	Qu'avez-vous retenu de cette publicité ?	_____ _____ _____ _____			
<b>Q920</b>	Avez-vous participé ou suivi une activité de sensibilisation (visite à domicile, causerie de groupe, animation publique) sur le planning familial dans votre localité au cours des 3 dernières années ?  <i>(Plusieurs réponses possibles)</i>	A=Visite à domicile B=Causerie de groupe C=Animation publique D=Aucune			→ <b>Q924</b>

<b>Q921</b>	Qui a animé ou organisé ces activités ?  <i>(Plusieurs réponses possibles)</i>	A=Agent de l'ONG/association _____ - B=Agent de l'AIMAS C=Agent de santé 96=Autre _____ _____	
<b>Q922</b>	Combien de fois avez-vous suivi ou participé à ces activités de sensibilisation au cours des 3 dernières années ?	1=1 à 2 fois 2=Entre 3 à 5 fois 3=Plus de 5 fois (plusieurs fois) 98=Ne sait pas	
<b>Q923</b>	Qu'avez-vous retenu de ces activités ?	_____ _____	

## ETUDE SUR L'UTILISATION DE METHODES CONTRACEPTIVES MODERNES CHEZ LES HOMMES EN UNION EN CÔTE D'IVOIRE

Questionnaire Homme N° :

Ville \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | Quartier/Village \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ |

N°DR : / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /

N°MENAGE : / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /

N° ligne Femme / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /

Milieu de résidence : 1=Péri-urbain

2=Rural

N° ligne Homme / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /

Date de l'interview :

/ \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2020

Visite de l'enquêteur				Nombre total de visite
	1	2	3	
Date	-----	-----	-----	-----
Nom/Code enquêteur	-----	-----	-----	
Nom / Code Superviseur	-----	-----	-----	
Prochaine Visite Date Heures	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	
Résultats	-----	-----	-----	
Code résultats :	4=Refus de répondre	6= Inapte		
1=Achévé	5=Partiellement	7=Autres		
2=Absence	mené			
3=Reporté				

Tableau récapitulatif

	Eligibles	Enquêtés
Nombre de femmes		
Nombre d'hommes		

Mars 2020

**SECRET STATISTIQUE**

Les renseignements contenus dans ce document sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous une forme anonyme conformément au décret 68-147 sur l'obligation de répondre et le secret statistique.

## SECTION 1. DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
Q101	J'aimerais maintenant vous poser quelques questions portant directement sur vous. Quel âge avez-vous ?	Age en années : _____	
Q102	Quel est le niveau d'instruction le plus élevé que vous avez atteint ? <b>Choisir une réponse.</b>	1=Aucun 2=Primaire 3=Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle 4=Secondaire 2 <sup>nd</sup> cycle 5=Supérieur 98=Ne sait pas	Si 1 Aller à Q104
Q103	Quelle est l'année/classe la plus élevée que vous avez achevé à ce niveau ?	Années/classe _____ _____	
Q106	Êtes-vous actuellement marié ou vivez-vous avec une femme comme si vous étiez marié ? <b>Choisir une réponse.</b>	1=Marié monogame 2=Marié polygame 3=Concubinage 4=Célibataire 5=Divorcé/Séparé 6=Veuf 98= S/O	Si 4 ou 5 ou 6 Fin interview
Q107	Depuis combien d'années êtes-vous marié ou vivez-vous avec cette femme ? <b>Si moins d'un an écrire 00</b>	Années :  __ __  98=Ne sait pas	
Q108	Vivez-vous avec d'autres femmes comme si vous étiez marié ?	1=Oui 0=Non 98=Ne sait pas	Si 0 ou 98 aller à Q110
Q109	Au total, avec combien de femmes vivez-vous comme si vous étiez marié ?	Nombre total :  __ __  98=Ne sait pas	
Q110	Quel est le type d'activité ou d'emploi que vous exercez actuellement ?	_____ _____	

## SECTION 2. UTILISATION DE LA CONTRACEPTION

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
Q201	<b>J'aimerais maintenant parler de planning familial - les différents moyens ou méthodes qu'un couple peut utiliser pour retarder ou éviter une grossesse non désirée. Avez-vous entendu parler « insérer la méthode » de la liste ci-dessous ?</b>		
O.	Stérilisation féminine. <b>Insister</b> : Les femmes peuvent avoir une opération pour éviter d'avoir plus d'enfants	1 = Oui 0 = Non	
P.	Stérilisation masculine. <b>Insister</b> : Les hommes peuvent avoir une opération pour éviter d'avoir plus d'enfants	1 = Oui 0 = Non	
Q.	DIU. <b>Insister</b> : Les femmes peuvent se faire installer à l'intérieur de l'utérus un objet par un médecin ou agent de santé pour éviter de	1 = Oui 0 = Non	
R.	Injectables. <b>Insister</b> : Les femmes peuvent recevoir une injection administrée par un agent de santé pour éviter de tomber enceintes pendant un ou plusieurs mois.	1 = Oui 0 = Non	
S.	Implants. <b>Insister</b> : Les femmes peuvent se faire insérer un ou plusieurs bâtonnets dans la partie supérieure du bras par un agent de santé pour éviter de tomber enceinte pendant une ou plusieurs années.	1 = Oui 0 = Non	
T.	Pilule. <b>Insister</b> : Les femmes peuvent prendre un comprimé chaque jour pour éviter de tomber enceinte.	1 = Oui 0 = Non	
U.	Préservatif masculin. <b>Insister</b> : Les hommes peuvent mettre un caoutchouc sur leur pénis avant d'avoir des rapports sexuels pour prévenir une grossesse non désirée.	1 = Oui 0 = Non	
V.	Préservatif féminin. <b>Insister</b> : Les femmes peuvent placer un caoutchouc dans leur vagin avant d'avoir des rapports sexuels pour prévenir une grossesse non désirée.	1 = Oui 0 = Non	
W.	Méthode des Jours Fixes (Collier du Cycle). <b>Insister</b> : La femme utilise un collier de perles de couleur pour savoir quels sont les jours où elle peut tomber enceinte. Ces jours-là, elle utilise un préservatif ou évite d'avoir des rapports sexuels.	1 = Oui 0 = Non	
X.	Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA). <b>Insister</b> : Pendant la période de 6 mois suivant la naissance d'un enfant, les femmes qui allaitent exclusivement au sein peuvent éviter	1 = Oui 0 = Non	
Y.	Abstinence périodique (Méthode rythmique). <b>Insister</b> : Pour éviter une grossesse non désirée, les femmes n'ont pas de rapports sexuels les jours du mois où elles pensent qu'elles peuvent tomber enceintes.	1 = Oui 0 = Non	
Z.	Retrait (coït interrompu). <b>Insister</b> : L'homme a des rapports sexuels sans préservatif et se retire du vagin de la femme avant d'éjaculer.	1 = Oui 0 = Non	
AA.	Contraception d'urgence. <b>Insister</b> : Comme mesure d'urgence, dans les trois jours suivant un rapport sexuel non protégé, les femmes peuvent prendre des comprimés spéciaux pour prévenir une grossesse non désirée.	1 = Oui 0 = Non	
BB.	Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes que les femmes ou les hommes peuvent utiliser pour éviter une grossesse non désirée ?  <b>Si oui est choisi, la ou les réponses qualitatives sur les autres méthodes doivent être consignées.</b>	1 = Oui Préciser _____ _____ 0 = Non	

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
Q202	Votre femme est –elle actuellement enceinte ?	1=Oui 0=Non 98= Ne sait pas	→Q206 Q203
Q203	Au moment où votre femme/partenaire/épouse était enceinte la dernière fois, vouliez-vous qu'elle tombe enceinte à ce moment-là, ou le vouliez-vous plus tard, ou vouliez-vous ne plus voir d'enfant ?	1=A ce moment là 2=Plus tard 3=Ne plus avoir d'enfant 4=N'est jamais tomber enceinte 98=Ne sait pas	
Q204	À l'heure actuelle, faites-vous quelque chose ou utilisez-vous une méthode pour retarder ou éviter une grossesse non désirée avec votre femme ?	1 = Oui 0 = Non	→Q206
Q205	Quelles méthodes utilisez-vous ? <b>Laisser la personne interrogée parler librement, et permettre des réponses multiples. Si elle donne une seule réponse, insister avec « autre chose ? »</b>	A=Stérilisation Féminine B=Stérilisation Masculine C=DIU D=Implants E=Injectables F=Pilule G=Contraception d'urgence H=Préservatif masculin I=Préservatif féminin J=Diaphragme K=Mousse/gelée spermicide L=Méthode des jours fixes/collier du cycle M=MAMA N=Abstinence périodique (méthode rythmique) O=Retrait P=Autre méthode moderne Q=Autre méthode traditionnelle _____ _____	
Q206	Avez-vous utilisé quelque chose par le passé pour éviter d'enceinter ou essayer d'une quelconque manière de retarder ou éviter une grossesse non désirée avec votre femme	1=Oui 0=Non	→ Q208
Q207	Quelle(s) méthode(s) vous ou votre partenaire avez utilisée(s) ? <b>Lire toutes les réponses et permettre des réponses multiples.</b>	A=Stérilisation Féminine B=Stérilisation Masculine C=DIU D=Implants E=Injectables F=Pilule	

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
		G=Contraception d'urgence H=Préservatif masculin I=Préservatif féminin J=Diaphragme K=Mousse/gelée spermicide L=Méthode des jours fixes/collier du cycle M=MAMA N=Abstinence périodique (méthode rythmique) O=Retrait P=Autre méthode moderne Q=Autre méthode traditionnelle _____ ____	
Q208	(VERIFIER LA REPONSE A Q202) <b>Poser cette question seulement aux hommes dont la femme est enceinte</b> En ce moment où votre femme/partenaire/épouse est enceinte, voulez-vous qu'elle tombe enceinte à ce moment-là, ou le voulez-vous plus tard, ou voulez-vous ne plus avoir d'enfant ?	1=En ce moment là 2=Plus tard 3=Ne plus avoir d'enfant	
Q209	VERIFIER LA REPONSE A Q202. <b>S'il est actuellement auteur d'une grossesse, demander</b> Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le futur. Après la naissance de l'enfant que vous attendez actuellement aimeriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ? <b>S'il n'est pas actuellement auteur d'une grossesse ou n'est pas sûr, demander</b> Aimeriez-vous avoir un enfant dans le futur ?	1=Avoir un (un autre) enfant 2=Plus d'enfants/aucun 3=Dit ne pas pouvoir enceinter 98=Indécise/ne sait pas	→ Q212 } Sect Suivante → Q212a
Q210	VÉRIFIER LA RÉPONSE À 202 <b>S'il est actuellement auteur d'une grossesse, demander :</b> Après la naissance de l'enfant que vous attendez actuellement, combien de temps aimeriez-vous attendre avant d'avoir un autre enfant ? <b>S'il n'est pas actuellement auteur d'une grossesse ou n'est pas sûr</b> Combien de temps aimeriez-vous attendre avant d'avoir un enfant ? <b>Un seul groupe de cases doit être rempli, et l'autre groupe de cases doit être rempli avec le code « 00 ». Si la personne interrogée répond « bientôt » ou « après le mariage », la case du mois doit être remplie avec le code fourni, et tous les autres groupes de cases doivent être remplis avec le code « 00 ».</b>	Mois  _ _ _ _  Années  _ _ _ _ _ _ _ _  93=Bientôt/maintenant 95=Après le mariage 98=Ne sait pas 96=Autre	→ Q212a } Si 95 ou 98 ou 96 Q212

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
Q211	<p>VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q210.</p> <p><i>Si le temps d'attente souhaité est ≥ 2 ans</i> → <i>Aller à Q212</i></p> <p><i>Si le temps d'attente souhaité est &lt; 2 ans</i> → <i>Aller à Q212a</i></p>		
Q212	<p>VERIFIER LA REPONSE A Q202. <b>S'il est auteur d'une grossesse, entourer s/o.</b></p> <p>VERIFIER ENSUITE LA REPONSE A Q204. <b>S'il utilise une méthode, entourer s/o.</b></p> <p><b>Les seules personnes interrogées qui devraient répondre à cette question sont les hommes dont la femme n'est pas enceinte, qui n'utilisent aucune méthode actuellement, et qui ne veulent pas avoir un enfant bientôt.</b></p> <p>POUR FINIR, VERIFIER LA REPONSE A Q209.</p> <p><b>S'il souhaite avoir un (autre) enfant dans le futur, demander :</b> Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas avoir un (autre) enfant bientôt. Pourriez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez aucune méthode pour prévenir une grossesse ?</p> <p><b>S'il ne souhaite plus avoir d'enfants, demander :</b> Vous avez dit que vous ne vouliez plus avoir d'enfants. Pourriez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez aucune méthode pour prévenir une grossesse ?</p> <p><b>Laisser la personne interrogée parler librement, et permettre des réponses multiples.</b></p> <p>VERIFIER LA REPONSE Q201</p> <p><b>Si la personne interrogée choisit la réponse N ou O</b></p>	<p>A=Pas mariée</p> <p><b>Raisons liées à la fertilité</b></p> <p>B=N'a pas de rapports sexuels.</p> <p>C=Rapports sexuels peu fréquent</p> <p>D=Ménopausée/hystérectomie</p> <p>E=Ne peut pas enceinter</p> <p>F=N'a pas eu de règles depuis la naissance de son dernier enfant</p> <p>G=Allaite</p> <p>H=Dépend de Dieu/fatalisme</p> <p><b>Opposition à leur utilisation</b></p> <p>I=Opposition de la personne interrogée</p> <p>J=Opposition du partenaire</p> <p>K=Opposition de la belle-mère</p> <p>L=Opposition d'autres personnes</p> <p>M=Interdiction religieuse</p> <p><b>Manque de connaissances</b></p> <p>N=Ne connaît aucune méthode</p> <p>O=Ne connaît aucune source</p> <p><b>Raisons liées à la méthode</b></p> <p>P=Effets secondaires/problèmes de santé</p> <p>Q=Manque d'accès/trop éloigné</p> <p>R=Coût trop élevé</p> <p>S=Méthode préférée pas disponible</p>	

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
		T=Aucune méthode disponible U=Pas pratique à utiliser V=Entrave les processus naturels de l'organisme W=Autre _____ X=Ne sait pas Y= S/O	
Q212 a	Avez-vous (ou votre partenaire a-t-il) utilisé une pilule du lendemain (CU) au cours des 12 derniers mois ?	1=Oui 2=Non 98=Ne sait pas	Si 2 ou 98 aller à Q213
Q212 b	Si oui, combien de fois avez-vous (ou votre partenaire a-t-il) utilisé la pilule du lendemain au cours des 12 derniers mois (avant covid)	_ _ _	
Q212 c	Quelle marque de pilule de lendemain (Contraceptif d'Urgence) avez-vous utilisé le plus souvent ?	1=Norlevo 2=Pregnon 3=Levopred 4=LevoBD 5=Autre (préciser .....	
Q213	Pensez-vous que vous utiliserez une méthode contraceptive pour retarder ou éviter toute grossesse à un quelconque moment dans le futur ?	1=Oui 0=Non 98=Ne sait pas	} Q216
Q214	Pensez-vous que vous utiliserez la méthode contraceptive dans les 12 prochains mois ?	1=Oui 0=Non 98=Ne sait pas/pas sûre	} Q216
Q215	Quelles méthodes pensez-vous que vous utiliserez ? <b>Laisser la personne interrogée parler librement, et permettre des réponses multiples.</b>	A=DIU B=Implants C=Injectables D=Pilule E=Contraception d'urgence F=Préservatif masculin G=Préservatif féminin H=Diaphragme I=Mousse/gelée spermicide J=Méthode des jours fixes/collier du cycle K=MAMA L=Abstinence périodique (méthode rythmique) M=Autre	

### Utilisation de préservatifs aux derniers rapports sexuels

Maintenant, je vais vous poser quelques questions concernant votre sexualité. Rappelez-vous que je ne cherche pas à vous juger, que votre nom n'est pas inscrit sur le questionnaire et que ce questionnaire sera mélangé à d'autres questionnaires. Ainsi, personne ne saura ce que vous avez fourni comme réponse aux questions. Comme je vous l'ai déjà dit, nous avons besoin de réponses honnêtes. Merci.

Q216	<p>Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ?</p> <p><i>Si plus d'une année aller à section suivante</i></p>	<p>1=en jour : -----</p> <p>2=en semaine : -----</p> <p>3=en mois : -----</p> <p>4=en année : -----</p>	<p>Si &gt;1 an Alors aller à section 3</p>
Q217	<p>Un condom a été utilisé la dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne (partenaire) ?</p>	<p>1=Oui 2=Non 98=Ne sait pas</p>	
Q218	<p>Quelle était votre relation avec cette personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels</p>	<p>1=Epouse 2=Partenaire vivant avec enquêté 3=Petite amie ne vivant pas avec l'enquêté 4= Rencontre occasionnelle 5=professionnel du sexe/ cliente 6= Autres à préciser _____</p>	
Q219	<p>À part cette personne (partenaire) avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?</p>	<p>1=Oui 2=Non</p>	<p>Si non aller à Q227</p>
Q220	<p>Quand avez-vous eu des rapports sexuels avec cette seconde personne la dernière fois ?</p>	<p>1=en jour : -----</p> <p>2=en semaine : -----</p> <p>3=en mois : -----</p>	
Q221	<p>Un condom a été utilisé la dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette seconde personne ?</p>	<p>1=Oui 2=Non 98=Ne sait pas</p>	
Q222	<p>Quelle était votre relation avec cette seconde personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels</p>	<p>1=Epouse 2=Partenaire vivant avec enquêté 3=Petite amie ne vivant pas avec l'enquêté 4= Rencontre occasionnelle 5=professionnel du sexe/ cliente 6= Autres à préciser _____</p>	
Q223	<p>À part ces 2 personnes, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?</p>	<p>1=Oui 2=Non</p>	<p>Si non aller Q227</p>
Q224	<p>Quand avez-vous eu des rapports sexuels avec cette troisième personne la dernière fois ?</p>	<p>1=en jour : -----</p> <p>2=en semaine : -----</p> <p>3=en mois : -----</p>	

Q225	Un condom a été utilisé la dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette troisième personne ?	1=Oui 2=Non 98=Ne sait pas	
Q226	Quelle était votre relation avec cette troisième personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels	1=Epouse 2=Partenaire vivant avec enquêté 3=Petite amie ne vivant pas avec l'enquêté 4= Rencontre occasionnelle 5=professionnel du sexe/ cliente 6= Autres à préciser_____	
Q227	En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ?	_ _  personnes	

### SECTION 3 : CAPACITE ET MOTIVATION

CAPACITE			
N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
<b>SOUTIENT SOCIAL</b>			
Q301	Pensez-vous qu'un homme devrait s'impliquer dans la planification familiale avec sa femme ?	1=Oui 0=Non → 98=Ne sait pas →	Q303 Q304
Q302	Si oui, pourquoi ?	1=Il est le garant du bien-être familial 2=Il doit prendre soin de la santé de sa femme 3=Il doit contrôler le nombre de naissance 4=Pour mieux s'occuper de sa femme 5=Pour mieux s'occuper de ses enfants 98=Autre	
Q303	Si non pourquoi ?	1=C'est une affaire de femme 2=C'est Dieu qui donne les enfants 3=Autre (préciser) _____ _____	
Q304	Seriez-vous d'accord pour encourager votre femme si elle décide d'adopter une méthode moderne de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée ?	1=Oui 0=non 98=Ne sait pas	
Q305	Discutez-vous de la planification familiale avec votre femme ?	1=Oui 0=Non →	Q307
Q306	A quelle fréquence parliez-vous du planning familial avec votre femme ? <i>(Lire les modalités)</i>	1=Très souvent 2=Souvent 3=Rarement	

### SECTION 7 : CAPACITE

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
<b>CONNAISSANCES</b>			
Q307	Un espacement de 2 ans entre les naissances réduit le risque de décès pour la mère et l'enfant.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q307 A	Quels sont les avantages, pour une femme, d'être assisté par un agent de santé qualifié pendant la grossesse ? a. Prévention et soins de certaines maladies liées à la grossesse ; b. Bébé bien portant à la naissance ; c. Maman bien portante à l'accouchement ; d. Eviter les décès liés à la grossesse ; e. Faire un suivi nutritionnel	1= Vrai ; 0=Faux ;98 NSP 1= Vrai ; 0=Faux ;98 NSP	
Q307 B	Quels sont les avantages, pour une femme, d'être assisté par un agent de santé qualifié pendant l'accouchement ?		

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
	a. Détecter et traiter rapidement les complications liées à l'accouchement ; b. Prévenir la contamination par le VIH/SIDA de l'enfant ; c. Avoir un certificat de naissance pour la déclaration de l'enfant. d. Prévenir les décès maternels e. Prévenir les décès infantiles	1= Vrai ; 0=Faux ;98 NSP 1= Vrai ; 0=Faux ;98 NSP	
<b>Q308</b>	Les méthodes modernes de contraception, autre que le préservatif, entraînent une augmentation du poids	1= Vrai 0= Faux 98=Ne sait pas	
	<b>MÉTHODES À COURT TERME : PRÉSERVATIF</b>		
<b>Q517</b>	VÉRIFIER LES RÉPONSES À Q201G ET Q201H. <i>La personne interrogée a-t-elle entendu parler de ces méthodes ? Si non, écrire « non » et sauter les questions Q518-522 pour passer à la Q523, ou à la question sélectionnée suivante.</i>	1= Oui  0 = Non →	<b>Q523</b>
<b>Q518</b>	Un homme peut mettre un préservatif masculin avant d'avoir des rapports sexuels pour prévenir une grossesse. ( <i>Vérifier Q201, Si G=1 poser cette question</i> )	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
<b>Q519</b>	Une femme peut mettre un préservatif féminin avant d'avoir des rapports sexuels pour prévenir une grossesse. ( <i>Vérifier Q201, Si H=1 poser cette question</i> )	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
<b>Q520</b>	Vous n'avez pas besoin d'une ordonnance ou d'un examen médical pour obtenir des préservatifs.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
<b>Q521</b>	Les préservatifs doivent être utilisés pendant toute la durée de la relation sexuelle pour être d'une plus grande efficacité.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
<b>Q522</b>	Les préservatifs protègent contre les infections sexuellement transmissibles lorsqu'ils sont utilisés correctement.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
	<b>INJECTABLES</b>		
<b>Q529</b>	VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q201D. <i>La personne interrogée a-t-elle entendu parler de cette méthode ? si non, écrire « non » et sauter les questions Q530-534 pour passer à la Q535 ou à la question sélectionnée suivante.</i>	1= Oui  0 = Non →	<b>Q535</b>
<b>Q530</b>	Le contraceptif injectable doit être prescrit par un prestataire de santé.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
<b>Q531</b>	Les contraceptifs injectables doivent être administrés tous les 2 mois ou tous les 3 mois.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
<b>Q532</b>	Les contraceptifs injectables ne protègent pas les femmes contre les IST.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
<b>Q533</b>	L'effet secondaire le plus courant est un saignement irrégulier pendant les premiers mois.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
<b>Q534</b>	Les femmes peuvent de nouveau tomber enceintes quelques mois après la dernière injection	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
	<b>CONTRACEPTION ORALE REGULIERE</b>		
<b>Q535</b>	VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q201F. <i>La personne interrogée a-t-elle entendu parler de cette méthode ? si non, écrire « non » et sauter les questions Q536-540 pour passer à la Q547 ou à la question sélectionnée suivante.</i>	1= Oui  0 = Non →	<b>Q547</b>
<b>Q536</b>	La première prescription de pilule doit être faite par un prestataire de santé	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
<b>Q537</b>	La pilule doit être prise chaque jour (à la même heure).	1 = Vrai 0 = Faux	

N°	Questions et filtres	Réponses	Sauts
		98=NSP	
Q538	La fertilité revient habituellement dans les trois mois après l'arrêt de la pilule.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q539	Après la première consultation auprès d'un agent de santé, les femmes peuvent se réapprovisionner en pilules dans les centres de santé/Pharmacie/dépôt de leur localité sans avoir à revenir à la clinique chaque mois.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q540	La pilule ne protège pas les femmes contre les IST.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
	<b>MÉTHODES À LONG TERME : DIU</b>		
Q547	VÉRIFIER LA RÉPONSE À Q201C. <i>La personne interrogée a-t-elle entendu parler de cette méthode ? si non, écrire « non » et sauter les questions Q548-552 pour passer à la Q571, ou à la question sélectionnée suivante.</i>	1=Oui  0 = Non →	Q309
Q548	Le stérilet (DIU) peut être utilisé pendant l'allaitement.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q549	Le DIU peut prévenir les grossesses pendant une longue durée (jusqu'à 10 ans).	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q550	Après le retrait du DIU, la femme peut à nouveau tomber enceinte et avoir des enfants	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q551	Le DIU est inséré dans l'utérus par un agent de santé	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	
Q552	Le DIU est presque aussi efficace que la stérilisation.	1 = Vrai 0 = Faux 98=NSP	

### Section 3 (suite)

MOTIVATION							
N°	Questions et filtres	Réponses					
		Pas du tout d' accord	Un peu en désaccord	Neutre	Un peu d' accord	Tout à fait d' accord	Aucune réponse
	<b>MENACE</b>						
	<b>GRAVITÉ</b>						
Q309	Les femmes qui ont des enfants à des intervalles trop rapprochés souffrent habituellement de problèmes de santé.	1	2	3	4	5	99
Q310	Les grossesses non désirées sont un problème majeur dans ma communauté / entourage	1	2	3	4	5	99
Q311	Les familles qui ont trop d'enfants ont beaucoup de difficultés.	1	2	3	4	5	99

Q312	Le risque de décès du nouveau-né /bébé est plus élevé si la femme a des enfants chaque année.	1	2	3	4	5	99
Q313	Le risque de décès maternel est plus élevé si la femme a des grossesses chaque année.	1	2	3	4	5	99
	<b>SUSCEPTIBILITÉ</b>						
Q314	Si je n'utilise pas une méthode moderne de planning familial, ma femme va tomber enceinte.	1	2	3	4	5	99
Q315	Je m'inquiète au sujet des effets secondaires liés à l'utilisation d'une méthode d'espacement des naissances.	1	2	3	4	5	99
Q315 a	Je n'ai pas besoin d'avoir recours à une méthode moderne de contraception pour éviter une grossesse non désirée	1	2	3	4	5	99
	<b>CROYANCE</b>						
Q316	L'espacement des naissances contribue à la bonne santé de la mère.	1	2	3	4	5	99
Q317	Les enfants nés de mères qui ont utilisé une méthode d'espacement des naissances peuvent avoir des problèmes de santé.	1	2	3	4	5	99
Q318	L'utilisation de contraceptifs peut faire qu'il soit plus difficile pour la femme de tomber enceinte plus tard.	1	2	3	4	5	99
Q319	L'utilisation de Méthodes Modernes entraîne une prise de poids chez les femmes	1	2	3	4	5	99

## SECTION 4 : EXPOSITION AUX MEDIAS ET AUX ACTIVITES DE L'AIMAS

Questions et filtres	Réponses	Sauts															
<b>Q401</b> Lisez-vous un journal ou un magazine presque tous les jours, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine, ou pas du tout ?	1=Presque tous les jours 2=Au moins une fois par semaine 3=Moins d'une fois par semaine 4=Pas du tout →	<b>Q403</b>															
<b>Q402</b> Quel journal lisez-vous le plus souvent ?	1=Fraternité matin 2=Top Visage 3=Prestige magazine 4=Star magazine 5=Gbich 6=Notre voie 7=Le temps 8=Patriote 9=Nouveau réveil 98=Ne sait pas 96=Autre _____																
<b>Q403</b> Écoutez-vous la radio presque tous les jours, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine, ou pas du tout ?	1=Presque tous les jours 2=Au moins une fois par semaine 3=Moins d'une fois par semaine 4=Pas du tout →	<b>Q406</b>															
<b>Q404</b> Quelle chaîne de radio écoutez-vous le plus souvent ?	1=Radio National : Fréquence 2 2=Radio National : Côte d'Ivoire 3=Nostalgie 4=Jam FM 5=ONUCI FM 6=Chaîne internationales (RFI/BBC etc.) 7=Chaîne locale _____  98=Ne sait pas																
<b>Q405</b> A quel moment de la journée écoutez-vous le plus souvent la radio ? <i>(Indiquer une plage horaire de 2 heures maximum)</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>Matin</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Après midi</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Soir</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6h01-8h....1</td> <td style="text-align: center;">14h01-16h....5</td> <td style="text-align: center;">18h01-20h...7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8h01-10h...2</td> <td style="text-align: center;">16h01-18h....6</td> <td style="text-align: center;">20h01-22h...8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10h01-12h...3</td> <td></td> <td style="text-align: center;">22h01-24h....9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12h01-14h...4</td> <td></td> <td style="text-align: center;">24h01-06h...10</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Matin</u>	<u>Après midi</u>	<u>Soir</u>	6h01-8h....1	14h01-16h....5	18h01-20h...7	8h01-10h...2	16h01-18h....6	20h01-22h...8	10h01-12h...3		22h01-24h....9	12h01-14h...4		24h01-06h...10	
<u>Matin</u>	<u>Après midi</u>	<u>Soir</u>															
6h01-8h....1	14h01-16h....5	18h01-20h...7															
8h01-10h...2	16h01-18h....6	20h01-22h...8															
10h01-12h...3		22h01-24h....9															
12h01-14h...4		24h01-06h...10															
<b>Q406</b> Regardez-vous la télévision presque tous les jours, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine, ou pas du tout ?	1=Presque tous les jours 2=Au moins une fois par semaine 3=Moins d'une fois par semaine 4=Pas du tout →	<b>Q409</b>															
<b>Q407</b> Quelle chaîne de télévision regardez-vous le plus souvent ?	1=RTI 1 2=RTI2 3=RTI Bouaké 4=Chaîne télé internationales (TF1, France 24 etc.) 5=Chaîne de télé ivoiriennes (life Tv, NCI, RTI 3) 98=Autres _____																
<b>Q408</b> A quel moment de la journée regardez-vous le plus souvent la télé ?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>Matin</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Après midi</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Soir</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6h01-8h.....1</td> <td style="text-align: center;">14h01-16h....5</td> <td style="text-align: center;">18h01-20h...7</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Matin</u>	<u>Après midi</u>	<u>Soir</u>	6h01-8h.....1	14h01-16h....5	18h01-20h...7										
<u>Matin</u>	<u>Après midi</u>	<u>Soir</u>															
6h01-8h.....1	14h01-16h....5	18h01-20h...7															

Questions et filtres	Réponses			Sauts	
	<b>(Indiquer une plage horaire de 2 heures maximum)</b>	8h01-10h...2  10h01-12h...3  12h01-14h...4	16h01-18h...6	20h01-22h...8 22h01-24h...9 24h01-06h...10	
<b>Q409</b>	Avez-vous vu ou entendu une publicité de la méthode « injectable ou Harmonia ou planning familiale » au cours des 3 dernières années ?	1=Oui  2=Non <span style="float: right;">—————&gt;</span>			<b>Q413A</b>
<b>Q410</b>	Où avez-vous vu ou entendu cette publicité ?	A=Télévision B=Radio C= Activités de sensibilisation AIMAS D=Centre de santé E=Pharmacie F=Prospectus/ dépliant / affiche (hors centre de santé et pharmacie) H=Visite/rencontre avec agents ONG (nom ONG _____) 96=Autre _____			
<b>Q411</b>	Combien de fois avez-vous entendu ou vu cette publicité ?	1=1 ou 2 fois 2=Entre 3 et 5 fois 3=Plus de 5 fois (plusieurs fois) 98=Ne sait pas			
<b>Q412</b>	Qu'avez-vous retenu de cette publicité ?	_____ _____			
<b>Q420</b>	Avez-vous participé ou suivi une activité de sensibilisation (visite à domicile, causerie de groupe, animation publique) sur le planning familial dans votre localité au cours des 3 dernières années ? <b>(Plusieurs réponses possibles)</b>	A=Visite à domicile B=Causerie de groupe C=Animation publique D=Aucune <span style="float: right;">—————&gt;</span> 96=Autres _____			<b>Q424</b>
<b>Q421</b>	Qui a animé ou organisé ces activités ? <b>(Plusieurs réponses possibles)</b>	A=Agent de l'ONG/association _____ B=Agent de l'AIMAS C=Agent de santé 96=Autre _____			
<b>Q422</b>	Combien de fois avez-vous suivi ou participé à ces activités de sensibilisation au cours des 3 dernières années ?	1=1 à 2 fois 2=Entre 3 à 5 fois 3=Plus de 5 fois (plusieurs fois) 98=Ne sait pas			
<b>Q423</b>	Qu'avez-vous retenu de ces activités ?	_____ _____			

## **ANNEXE C : FICHE DE CONSENTEMENT ECLAIRE**

### **NOTICE D'INFORMATION**

#### **Introduction**

L'AIMAS est une organisation non gouvernementale qui travaille dans le domaine de la planification familiale et la prévention du VIH depuis 2002.

#### **But de l'étude**

Le but de cette étude est de recueillir des informations sur la pratique de la PF en vue d'orienter les actions en matière de PF pour le bien-être de la population. Un échantillon d'environ 1812 femmes et 1416 hommes seront interrogés au cours de cette étude. Une sélection des participants a été faite et vous avez été retenu pour participer à cette étude.

#### **Participation**

Votre participation à cette enquête va consister à répondre à des questions que nous allons vous poser. Cet entretien est individuel et se déroulera dans votre propre environnement (maison ou autre lieu que vous aurez choisi) à votre convenance pour assurer la confidentialité de vos déclarations. L'interview peut durer environ 45 minutes.

#### **Bénéfice**

Il n'y a pas de bénéfice immédiat et direct durant la réalisation de l'étude pour les participants. Cependant vous pourrez avoir l'occasion d'être sensibilisé(e) à la problématique de la planification familiale. Les bénéfices sociaux sont liés au fait que les données issues de cette étude seront utilisées pour orienter les stratégies de marketing social en matière de planification familiale pour le bien être sanitaire des populations.

#### **Risques**

Les risques potentiels pour les participants à cette étude sont la rupture de confidentialité et le malaise psychologique.

#### **Confidentialité**

Cependant, toutes les mesures ont été prises pour assurer la confidentialité de votre participation et de vos réponses. Toutes les informations que vous allez donner lors de cette étude seront traitées sans vos identifiants. Ces données seront agrégées et aucun participant à l'étude ne pourra être identifié à partir de ses réponses.

#### **Participation volontaire**

Votre participation à cette étude est libre et volontaire. Il n'y aura aucune compensation financière. Vous pouvez refuser de participer, de vous retirer de l'étude à tout moment ou de refuser de répondre à certaines questions si cela vous dérange. Dans tous les cas, on ne vous fera rien. Mais si vous décidez de participer à l'étude, à travers les résultats, vous contribuerez au développement et à l'amélioration de programme de PF en Côte d'Ivoire.

#### **Question/Contact**

Si vous avez des questions ou préoccupations concernant cette étude, vous pouvez les poser maintenant ou prendre contact plus tard avec l'équipe de l'AIMAS : **Dr Reine N'Guessan**, Chef de cellule Planification Familiale (tel : 54 969728) ou **Ogoa Goa Reine**, Assistante de Recherche, Suivi-Evaluation (tel : 46601291), ou **Mr. Lazare GOUSSOU**, Directeur Exécutif (tel 06 32 96 99).

Contact du Comité National d'Ethique des Sciences de la Vie et de la Santé (CNESVS) : 22 00 58 29/41 40 05 55



## FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE

Ville \_\_\_\_\_|\_\_|\_\_| Quartier \_\_\_\_\_|\_\_|\_\_|

**N°DR :** /\_\_/\_/\_\_/\_\_/\_/

**N°MENAGE :** /\_\_/\_/\_\_/\_\_/\_/

**Participant** : Je confirme que j'ai bien été informé(e) à propos de l'étude et que j'ai bien reçu un exemplaire du formulaire d'information. J'ai bien compris les informations. L'agent m'a fourni les informations relatives aux conditions de participation.

- ✓ ***J'ai disposé du temps nécessaire pour réfléchir aux informations et pour poser des questions.***
- ✓ ***J'ai bien compris que je peux cesser de participer à tout moment***
- ✓ ***Je comprends bien que toutes les informations rassemblées dans cette étude seront strictement anonymes et confidentielles***

Signature du participant :

Date /\_\_/\_/\_\_/\_\_/\_/ /\_2\_/0/\_2\_/0\_/

**Agent enquêteur** : je certifie que la nature et le but, les avantages et les risques possibles associés à la participation de cette étude ainsi que les conditions de participation ont été expliqués au participant de l'étude.

Signature de l'agent enquêteur:

Date /\_\_/\_/\_\_/\_\_/\_/ /\_2\_/0/\_2\_/0\_/